

Seed List No.34 AGST Seed Exchange 2017 - 2018 Dec. 9, 2017
 The Alpine Garden Society of Tokyo Tokyo, JAPAN
 種子交換リスト 34号 2017年-2018年 東京山草会種子交換委員会

番号	和名(特徴)(学名)(草丈cm、花色、原産地等)[提供者コメント、採種地等] 提供者番号
-----【アオイ科 Malvaceae】-----	
00001	トロロアオイ(<i>Abelmoschus manihot</i>) (150-、薄黄、温暖地では多年草) 2
00002	赤花ワタ(<i>Abelmoschus moschatus</i> subsp. <i>tuberosus</i>) (60-150、赤 熱帯アジア原産、多年草だが寒さに弱い) 14
00030	カラスノゴマ(<i>Corchoropsis tomentosa</i>) (40、黄、1年草) 2
00051	モミジアオイ(<i>Hibiscus coccineus</i>) (100-200、北米原産、真紅) 26
00053	ハマボウ(<i>Hibiscus hamabo</i>) (200-400、黄、木、実生4年で開花) 18,53
00058	フヨウ(<i>Hibiscus mutabilis</i>) (150-300、ピンク、白) 2,57
00059	スイフヨウ(<i>Hibiscus mutabilis</i> 'Versicolor') (150-300、白他、フヨウより寒さに弱い) 2
00062	ローゼル(<i>Hibiscus sabdariffa</i>)[100-200、アフリカ西南部原産、ハーブティーの材料] 2
00361	ヒナソウ(白花)(<i>Houstonia caerulea</i> 'Alba') 3
-----【アカバナ科 Onagraceae】-----	
00511	ウシタキソウ(<i>Circaea cordata</i>) [10-30、白] 88
00524-W	(W)ヤナギラン(<i>Epilobium angustifolium</i>) (本州以北北海道、山地亜高山帯、北半球に広く分布) [長野県]
00612	メマツヨイグサ(<i>Oenothera biennis</i>) (2年草、北アメリカ原産、帰化植物) 2
00624	アカバナユウゲシヨウ(通称ユウゲシヨウ)(<i>Oenothera rosea</i>) (20-40、ピンク、北アメリカからの帰化植物)
-----【アケビ科 Lardizabalaceae】-----	
00652	アケビ(<i>Akebia quinata</i>) (ツル500以上、淡紫、自家不結実性) 2
00652-W3	(W)アケビ(<i>Akebia quinata</i>) [愛知県] 2
00653	ミツバアケビ(<i>Akebia trifoliata</i>)[北海道から九州、山地、中国も分布] 2
00653-W	(W)ミツバアケビ(<i>Akebia trifoliata</i>) (北海道から九州、山地、中国も分布) [愛知県] 2
00660	ムベ(<i>Stauntonia hexaphylla</i>)[ツル500以上、常緑木本、耐寒性は強くない] 2
00660-W	(W)ムベ(<i>Stauntonia hexaphylla</i>)[ツル500以上、常緑木本、耐寒性は強くない][愛知県] 2
-----【アジサイ科 Hydrangeaceae】-----	
00680-W	(W)クサアジサイ(<i>Gardiandra alternifolia</i>) (30、桃、本州(宮城県以南)、四国、九州) [愛知県] 2
00732	コアジサイ(<i>Hydrangea hirta</i>) 13
00751-4	ヤマアジサイ(園芸種、日向青のセルフ)(<i>Hydrangea serrata</i>)[ピンク] 106
00751-5	ヤマアジサイ(園芸種、クレナイのセルフ)(<i>Hydrangea serrata</i>) 106
00770	キレンゲシヨウマ(<i>Kirengeshoma palmata</i>) (60-100、黄、紀伊、四国、九州の山地に分布、絶滅危惧Ⅱ類) 87,106
-----【アブラナ科 Brassicaceae】-----	
00921	ハクサンハタザオ(<i>Arabidopsis halleri</i> subsp. <i>gemmifera</i>) (10-30、白から淡紅色、山地) 46
00957	ハタザオ(<i>Arabis glabra</i> (NET)) (50、白) 2
00968	エゾハタザオ(<i>Arabis pendula</i>) (20-40、白、角果が垂れ下がる特徴) 99
00974	エゾノイワハタザオ(<i>Arabis serrata</i> var. <i>glauca</i>) (10-40、白、北海道・本州(東北)) 9,83
00975	イワハタザオ(<i>Arabis serrata</i> var. <i>japonica</i>) (10-30、白、本州(東北、関東、中部)、山地) 5
01139	エゾイヌナズナ(シロバナノイヌナズナ)(<i>Draba borealis</i>) (5-20、白、北海道、本州の中部地方) [春の交換会から持ち越し] 6
01174	シリベシナズナ(<i>Draba igarashii</i>) (10-20、白、絶滅危惧ⅠA類) 46
01180	キタダケナズナ(ハクホウナズナ)(<i>Draba kitadakensis</i>) (10-20、白、南アルプス、奥秩父、絶滅危惧ⅠB類) [春の交換会から持ち越し] 6,99
01190	イヌナズナ(<i>Draba nemorosa</i>) (10、黄) [春の交換会から持ち越し] 5
01212	モイワナズナ(<i>Draba sachalinensis</i>) (10-15、白、北海道、長野、絶滅危惧ⅠB類) 9
01213	トガクシナズナ(<i>Draba sakuraii</i>) (10、白、本州中部、絶滅危惧ⅠB類) 5
01216	シロウマナズナ(<i>Draba shiroumana</i>) (10、白、中部地方の高山、亜高山、絶滅危惧ⅠB類) 4,99
01233	オクエゾナズナ(<i>Draba ussuriensis</i> f. <i>leiocarpa</i>) (6-12、白、北海道) 86
01361	レピディウム ペルビアヌム(<i>Lepidium peruvianum</i>) (20まで、蕪の様な根をもつ、薬用「マカ」) 20
01380	オオバンソウ→ゴウダソウ(大判草、ギンセンソウ)(<i>Lunaria annua</i>)(60-120、濃バラ) 77
01381	ルナリア アンヌア「アルバ バリエガタ」(<i>Lunaria annua</i> 'Alba Variegata') (斑入り) 20
01382	オオバンソウ(白)→ゴウダソウ(白花)(<i>Lunaria annua</i> alba) (白) 2
-----【アヤメ科 Iridaceae】-----	
01601	アノマテカ ディバリカタ(<i>Anomatheca divaricata</i>) (=ラペイロウシア(<i>Lapeirousia</i>)) アヤメ科) 94
01602	ラペイロウシア(アノマテカ) グランデフローラ(<i>Anomatheca grandiflora</i>) (10-15、赤) 30
01742	キペラ プラムビア(<i>Cypella plumbea</i>) (30-40、薄紫) 92
01770	ディエテス グランディフローラ(<i>Dietes grandiflora</i>) (50、白(中・黄)) 30
01790	ヒメヒオウギ(フリーシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(<i>Freesia laxa</i>) (10-15、中央部赤、半耐寒性、南アフリカ) 2,24

- 01790-1 ヒメヒオウギ(フリーシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(色混合)(*Freesia laxa*) (10-15、中央部赤、半耐寒性、南アフリカ) 14
- 01791 フリーシア ラクサ アルバ(旧アノマテカ ラクサ アルバ)(*Freesia laxa alba*) (10-15、白、半耐寒性、南アフリカ) 2,14,24
- 01837 グラジオラス グラキリス(*Gladiolus gracilis*) (冬成長型、半耐寒性) [春の交換会から持ち越し、黄緑、実生2年で咲く] 106
- 01849-1 原種系グラジオラス トリスチス系統(*Gladiolus tristis?*) (半耐寒性) [黄] 97
- 01870 チリアヤメ(*Herbertia amoena*) (10、青紫、耐寒性は強くない、チリ、アルゼンチン) 97
- 01889 ヘスペランサ ラティフォリア(*Hesperantha latifolia*) (20-30、桃) 21
- 01911 ヒオウギ (*Iris (Belamcanda) chinensis*) (50-100、橙・赤点、耐寒性は比較ある) 28,85,106
- 01912 ダルマヒオウギ(*Iris (Belamcanda) chinensis var. cruenta f. vulgaris*) (30-60、橙・赤点、本州以南) 6
- 01948 ノハナショウブ(*Iris ensata var. spontanea*) (60-90、紫、耐寒性あり) 34,84
- 01993 アヤメ(*Iris sanguinea*) (50、青紫) 2,77,83
- 01993-W (W)アヤメ(*Iris sanguinea*) (50、青紫) [長野県] 106
- 01995 ヒオウギアヤメ(*Iris setosa*) (30-90、青紫) 22
- 01995-W (W)ヒオウギアヤメ(*Iris setosa*) (本州では高山の湿地、北海道では平地の湿地) [長野県] 92
- 02023 イチハツ(*Iris tectorum*) (30-50、青紫、原産地は中国) 2
- 02061 ラペイロウジア ヤククイニー(*Lapeirousia jacquinii*) (10、紫、半耐寒性) 96
- 02063 ヒメヒオウギ(ラペイロウシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(オレンジ)(*Lapeirousia laxa*) (40、オレンジ、南アフリカ原産) 94
- 02066 ラペイロウシア シレノイデス(*Lapeirousia silenoides*) (濃いピンク) 94
- 02206 ロムレア タブラリス(*Romulea tabularis*) (10、淡紫) [春の交換会から持ち越し] 77
- 02257 キバナニワセキショウ(*Sisyrinchium campestre f. flaviflorum*) (10、黄(俗称キバナセキショウ?))、北アメリカ、帰化植物) 8、17
- 02267 シシリンキウム アイダホエンセ(*Sisyrinchium idahoense*) (20-30、青) 105
- 02276 シシリンキウム モンタヌム(*Sisyrinchium montanum*) (10-50、青、北アメリカ北部、ロッキー) 106
- 02281 シシリンキウム スツリアツム(*Sisyrinchium striatum*) (10、黄) 20
- 【アブキ科 Meliosmaceae】-----
- 02355-W (W)ミヤマハハソ(*Meliosma tenuis*) (落葉低木) [山形県] 49
- 【イソマツ科 Plumbaginaceae】-----
- 02490 ハマサジ(*Limonium tetragonum*) (30-50、黄、本州四国九州、海岸の湿地、絶滅危惧Ⅱ類) 48
- 02491 イソマツ(*Limonium wrightii*) (10、60(花茎)、淡い紅紫、伊豆小笠原南西諸島、絶滅危惧Ⅱ類) 48
- 02491-1 ヨナグニイソマツ(*Limonium wrightii?*) 48
- 02492 キバナイソマツ(*Limonium wrightii var. luteum*) [ウコンイソマツ] 48
- 【イチイ科 Taxaceae】-----
- 02510 カヤ(*Torreya nucifera*) (針葉樹、成長は遅い、雌雄異株) 35
- 【イネ科 Poaceae】-----
- 02762 ヒメアブラスキ(*Bothriochloa parviflora*) (80) 35,36,47
- 02800 コバンソウ(*Briza maxima*) (30、黄緑、一年草、原産地はヨーロッパ、明治期に渡来) 2
- 02802 ヒメコバンソウ(*Briza minor*) 38,39
- 02880 カスマンチウム ラチフォルウム(通称:ワイルドオーツ)(*Chasmanthium latifolium*) (70、宿根草、北アメリカ原産) 24,29,31,34,37,47,56
- 02970 オガルカヤ(*Cymbopogon tortilis var. goeringii*) (100) 97
- 03041 タツノヒゲ(*Diarrhena japonica*) (40まで、北海道から九州) 5
- 03324 ムギクサ(*Hordeum murinum*) (20-50、一年草もしくは越年草、帰化植物、本州以南に分布) 35
- 03327 オオムギ(斑入りムギ)「笹の雪」(*Hordeum vulgare 'Sasanoyuki'*) 35
- 03608 パニカム ビルガツム「チョコラータ」(*Panicum virgatum 'Chocolata'*) (100-130) 35
- 03643 アオチカラシバ(*Pennisetum alopecuroides f. viridescens*) (50、素心) 5
- 03760 イタチガヤ(*Pogonatherum crinitum*) (20、日向の岩の上にはえる) 53
- 03863 ムラサキエノコロ(*Setaria viridis purple form*) (30-70、紫(花の先端)、1年草) 82,97
- 03925 メガルカヤ(*Themeda triandra var. japonica*) (100、多年草、本州から九州) 44
- 【イワウメ科 Diapensiaceae】-----
- 04209 ベニバナヤマイワカガミ(*Schizocodon ilicifolius var. interedens*) (赤) [岐阜県由来、葉は4~5cm、丸く縁に9-13対の鋸葉、革質性強い] 3
- 04228 コイワウチワ(カントウイワウチワ)(*Shortia uniflora var. kantoensis*) (関東から東北に分布) 3
- 【イワタバコ科 Gesneriaceae】-----
- 04264 キリタ タミアナ(*Chirita tamiana*) (白地に紫、常緑多年草、非耐寒性、ベトナム) 96,105
- 04270-W (W)イワタバコ(*Conandron ramondioides*) (15-30、青紫、本州(福島以南)、四国、九州) [愛知県] 2
- 04360 シンニンギア レウコトリカ(*Sinningia leucotricha*) (30、橙、塊根植物、断崖の女王とも呼ばれる) 105
- 【イワデンタ科 Woodsiaceae】-----
- 04374 キンモウウラビ(*Hypodematum crenatum subsp. fauriei*) 49
- 【ウコギ科 Araliaceae】-----

- 04495-E1 トチバニンジン(滋賀県由来)(*Panax japonicus*) (50-80、赤実、) 35
04495-E2 トチバニンジン(宮崎県由来)(*Panax japonicus*) (50-80、赤実、) 35
-----【ウマノスズクサ科 Aristolochiaceae】-----
04512 ウマノスズクサ(*Aristolochia debilis*) (ツル植物、多年草)44,55
04550 ヒメカンアオイ(*Asarum fauriei* var. *takaoui*) (10-20、日本固有種(東北~九州)、林床、カンアオイに比較して葉が丸い) 2
04632 ウスバサイシン(*Asiasarum sieboldii*) (8-15、暗紫褐色) [保湿種子] 106
-----【ウリ科 Cucurbitaceae】-----
04765 ククミス ディップサケウス(*Cucumis dipsaceus*) (果実を鑑賞、アラビア半島) 42,93
04770 オキナワスズメウリ(*Diplocyclos palmatus*) ((毒瓜)有毒) 14,42,93
04822 カラスウリ(*Trichosanthes cucumeroides*) 53
04822-W1 (W)カラスウリ(実は俵形)(*Trichosanthes cucumeroides*) (蔓性多年草、本州四国九州) [愛知県] 2
04822-W2 (W)カラスウリ(実が丸形)(*Trichosanthes cucumeroides*) (蔓性多年草、本州四国九州) [愛知県] 2
04822-W4 (W)カラスウリ(実が細長形)(*Trichosanthes cucumeroides*) (蔓性多年草、本州四国九州) [愛知県] 2
04824 キカラスウリ(*Trichosanthes kirilowii* var. *japonica*) [黄実] 53
-----【オオバコ科 Plantaginaceae】-----
04942 矮性黄花ジギタリス(*Digitalis grandiflora* 'Carillion') (20-40、黄白) 106
04950 イワカラクサ(*Erinus alpinus*) (5-20、赤紫、ヨーロッパ原産) 97,99
05053 ペンステモン カエスピトスス(*Penstemon caespitosus*) (8、薄紫) 105
05104 ペンステモン ハリー(*Penstemon hallii*) (高山の日当たりのよい稜線の岩礫地に生える。ロッキー山脈の高山帯にはごく普通に見ることができる) 20
05232 エチゴトラノオ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *kiusianum* ssp. *maritimum*) 92
05239 サンイントラノオ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *ogurae*) (15-30、青、絶滅危惧Ⅱ類、島根県) 38,91
05240 トウテイラン(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *ornatum*) (40-50、青紫、鳥取兵庫京都の海岸べり、絶滅危惧Ⅱ類) [ごく少量] 106
05241 トウテイラン(白花)(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *ornatum* white fl.) (40-50、白、絶滅危惧Ⅱ類) [ごく少量] 106
05242 ヤマトラノオ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *rotundum*) (40-90、青紫、本州から九州北部) 106
05245 キクバクワガタ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *schmidtianum*) (5-20、紫、北海道、千島) [北海道高山型]
05246 ホソバキクバクワガタ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *schmidtianum* f. *linearilobum*) (5-10、紫、高山性) 3
05250 ダイセンクワガタ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *schmidtianum* ssp. *senanense* f. *daisenense*) (10、青) 3
05252 シロバナキクバクワガタ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *schmidtianum* subsp. *schmidtianum* f. *albiflorum*) (5-20、白、北海道、千島) 3
05254 シラゲキクバクワガタ(白)(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *schmidtianum* subsp. *schmidtianum* f. *candidum* white fl.) (10、白、茎・葉に白毛多) 84
05255 エゾミヤマクワガタ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *schmidtianum* var. *yezo-alpinum*) (絶滅危惧Ⅱ類) 3
05256 アポイクワガタ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *schmidtianum* var. *yezo-alpinum* f. *exiguum*) (10、青、日高山脈、蛇紋岩地帯の高山の草地) 34
05258 ハマトラノオ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *sieboldianum*) (20-40、青、鹿児島、沖縄、絶滅危惧Ⅱ類) 77
05258-1 ヒメハマトラノオ(流通名か、矮性種)(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *sieboldianum*?)97
05320 ベロニカ セルピリフォリア(コテングクワガタ)(*Veronica* *serpyllifolia*) (5-15、薄い青、帰化種) 97
05346 クガイソウ(*Veronicastrum sibiricum* ssp. *japonicum*) (50、紫、本州、日当たりのよい草地や林の縁) 3
05350 ルリスズカケソウ(通称?)(*Veronicastrum* sp.) (小豆色) 97
-----【オシロイバナ科 Nyctaginaceae】-----
05415 オシロイバナ(黄)(*Mirabilis jalapa*) (20-60、黄) 2
05415-1 オシロイバナ(赤)(*Mirabilis jalapa*) (20-60、赤) 2
-----【オトギリソウ科 Hypericaceae】-----
05420 ヒペリクム アンドロサエムム(コボウスオトギリ(通称))(*Hypericum androsaemum*) (欧州、北米に広く分布)
05423 トモエソウ(*Hypericum ascyron*) (30-60、黄) 30,106
05435 オトギリソウ(*Hypericum erectum*) (40、黄) 2
05447 ヒメオトギリ(*Hypericum japonicum*) (15-40、黄、1年草、北海道から九州) 5
-----【オミナエシ科 Valerianaceae】-----
05500 マルバキンレイカ(*Patrinia gibbosa*) (30-70、黄、北海道から新潟まで、山地の斜面や岩場) 3
05504 オミナエシ(*Patrinia scabiosifolia*) (60-100、黄、日当たりの良い山地、北海道から九州) 2
05512 ハクサンオミナエシ(別名コキンレイカ)(*Patrinia triloba* var. *triloba*) (30-60、黄、本州(山地から亜高山))
05513-W (W)オトコエシ(*Patrinia villosa*) (50-100、白、北海道から九州、日当たりの良い草地等、) [山口県] 53
-----【カツラ科 Cercidiphyllaceae】-----
05590 カツラ(*Cercidiphyllum japonicum*) 49
-----【カバノキ科 Betulaceae】-----
05646 一寸クマシデ(流通名、別名一寸カナシデ)(*Carpinus* sp.) 56
-----【カヤツリグサ科 Cyperaceae】-----
05698 アポイタヌキラン(*Carex apoiensis*) (絶滅危惧Ⅱ類) 3
05722 ハリガネスゲ(*Carex capillacea*) 13

- 05725 ジョウロウスゲ(*Carex capricornis*) (30-60、北海道、本州(関東以北) 絶滅危惧Ⅱ類) 6,35,44
05742 ナルコスゲ(*Carex curvicolis*) 43
05771 タニガウスゲ(*Carex forficula*)44
05781 イガグリズゲ(*Carex grayi*) (湿生植物、北アメリカ東部原産) 34,47
05897 クグスゲ(*Carex pseudocyperus*) (絶滅危惧ⅠB類) 77
05900 コウボウシバ(*Carex pumila*) [10-20、海岸の砂地などに自生] 32
06176 コウキヤガラ(*Scirpus maritimus*) 4
06180 ヒメワタスゲ(*Scirpus hudsonianus*) [春の交換会から持ち越し] 6
-----【キキョウ科 Campanulaceae】-----
06257 ヒメシャジン(*Adenophora nikoensis*) (10-40、青、東北地方南部から中部地方) 98
06260 ホソバヒメシャジン(*Adenophora nikoensis* f. *linearifolia*) (10-20、青、茎葉の幅は0.8ミリ以下、高山亜高山の岩場礫地) 106
06261 ホソバヒメシャジン(白花)(*Adenophora nikoensis* f. *linearifolia* white fl.) (10-20、白、茎葉の幅は0.8ミリ以下、高山亜高山の岩場礫地) 81
06263-1 ヒメイワシャジン(ブコウイワシャジン、白花)(*Adenophora nikoensis* var. *persicaria*) (10-20、白) [純白]
06267 ミヤマシャジン(*Adenophora nikoensis* var. *stenophylla*) (10-40、青、高山亜高山の岩場礫地) 22,84,102
06270 ケモイワシャジン(*Adenophora pereskiaefolia* var. *heterotricha*) 92
06271 モイワシャジン(*Adenophora pereskiaefolia* var. *moiwana*) (40-90、薄い青、北海道本州北部) 22 106
06271-1 コバコシャジン(通称)(*Adenophora pereskiaefolia* var. *moiwana*) (小函産のモイワシャジン) [層雲峡小函、モイワシャジンの変種、固有種] 3
06279-W (W)ソバナ(*Adenophora remotiflora*) (本州四国九州、林縁など) [山梨県] 98
06285 イワシャジン(*Adenophora takedae*) (30-60、青) 106
06288 イワシャジン(白)(*Adenophora takedae* white fl.) (3-50、白) 106
06288-1 イワシャジン(白、枝垂れ性)(*Adenophora takedae* white fl.) (白) 91
06288-2 イワシャジン(白、立性)(*Adenophora takedae* white fl.) (白) 106
06288-3 イワシャジン(白、二重咲き)(*Adenophora takedae* white fl.) (白) 102
06295 サイヨウシャジン(ナガサキシヤジン)(*Adenophora triphylla*) (50、紫、立性) 92
06298 ハクサンシャジン(タカネツリガネニンジン)(*Adenophora triphylla* var. *hakusanensis*) (20-50、青、ツリガネニンジンより矮性、高山型) 3 106
06301-1 オグラヤマシャジン(ツリガネニンジンの矮性種)(*Adenophora triphylla* var. *japonica*) 102
06301-W (W)ツリガネニンジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica*) (50-100、青、北海道から九州、山野や土手) [愛知県] 2
06302 シラゲシャジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica* f. *canescens*) (40-90、青、全体に白毛が密生) 92,106
06305 ハマシャジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica* f. *rotundifolia*) 76
06305-2 マルバナハマシャジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica* f. *rotundifolia*) (40、淡青、ツリガネニンジンの海岸型、茎に毛がある) 92
06305-W (W)ハマシャジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica* f. *rotundifolia*) (40、淡青、ツリガネニンジンの海岸型) [千葉県?] 86
06312 シレットコシャジン(*Adenophora pereskiaefolia* f. *Shiretoko*) (モイワシャジンの変種とも、25、白～淡紫) [花は筒状鐘型] 3,102
06313 シライワシャジン(*Adenophora nikoensis* var. *teramotoi*) (南アルプスの石灰岩地帯、10-40、青紫) [戸台白岩(南アルプス)由来のヒメシャジンの変種] 3
06314 タテヤマシャジン(*Adenophora nikoensis* f. *Tateyama*) [10-50、立山由来のヒメシャジン] 3
06350 カンパヌラ バルバタ(*Campanula barbata*) 3
06412 ヤツシロソウ(*Campanula glomerata* var. *dahurica*) (30-90、紫、阿蘇久住地域、絶滅危惧ⅠB類) 106
06413 シロバナヤツシロソウ(*Campanula glomerata* var. *dahurica* alba) (30-90、白、絶滅危惧ⅠB類) 106
06432 イワギキョウ(*Campanula lasiocarpa*) (5-15、青) [多年草だが、栽培上は一稔草扱い] 3
06433 イワギキョウ(白)(*Campanula lasiocarpa* white fl.) (5-15、白) [純白の強健種、多年草] 3
06441 カンパヌラ ラチフォリア「マクランタ」(*Campanula latifolia* 'Macrantha') (大花) 20
06466 モモバギキョウ(*Campanula persicifolia*) (30-90、青、ヨーロッパからシベリア) 83,106
06470 モモバギキョウ(白)カンパヌラ ペルシキフォリア アルバ(*Campanula persicifolia* alba) (50、白) 106
06484 ホタルブクロ(*Campanula punctata*) (50、紫) 2,105
06484-W (W)ホタルブクロ(*Campanula punctata*) (50、紫、北海道西南部から九州、山野) [愛知県] 2
06488 ホタルブクロ(白)(*Campanula punctata* f. *albiflora*) (最大80、白) 2,28
06490 ヤマホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *hondoensis*) (20-60、薄紫、ホタルブクロの変種、ホタルブクロと違って萼と萼の間に付属片がついていない) 2
06491 イシダテホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *kurokawae*) (20、灰淡赤) 105
06493 シマホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *microdonta*) (30、白、伊豆諸島に多産、海岸に近い斜面、岩場) 96
06501 ハタザオギキョウ(カンパヌラ ラプンクロイデス)(*Campanula rapunculoides*) (50-120、青) 2,105,106
06504 カンパヌラ ロンボイダリス(*Campanula rhomboidalis*) (60、青紫色花、欧州原産、) 41
06507 イトシャジン(*Campanula rotundifolia*) (10-40、青紫、カンパヌラの仲間) 3
06601 ツルニンジン(*Codonopsis lanceolata*) (ツル性、青、根は、滋養強壮とヘルニア特効薬) 74,106

- 06601-W (W)ツルニンジン(*Codonopsis lanceolata*) (北海道から九州、平地や山地の林の中や縁) [長野県] 87
06617 バアソブ(*Codonopsis ussuriensis*) (釣鐘花 つる性、絶滅危惧Ⅱ類) 51
06694 ヤシオネ ラエビス(*Jasione laevis*(=*Jasione perennis*)) (20-30、青紫、山地、ヨーロッパアルプス) 106
06719 サウギキョウ(*Lobelia sessilifolia*) (40-80、濃青紫、平地や山地の湿地) 37
06730 タニギキョウ(*Peracarpa carnosus* var. *circaeoides*) (10-15、白(5~8ミリ)、北海道から九州、比較的湿った場所) 33
06770 フィテウマ シーベリ(*Phyteuma sieberi*) (シベリア原産) 3
06780 キキョウ(*Platycodon grandiflorum*) (30-60、青) 8,14,87
06780-2 キキョウ(絞り咲き)(*Platycodon grandiflorum*) (30-60、青・白) 14,17
06782-3 アポイギキョウ(松浦系、紫)(*Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyoku') (20、紫、花大) 105
06782-4 アポイギキョウ(混合)(*Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyoku') (20、紫、白) 99
06780-9 キキョウ(矮性種)(*Platycodon grandiflorum*) (30-60、青) 2
06780-10 キキョウ(渦葉)(*Platycodon grandiflorum*) (青) 3
06782 アポイギキョウ(アポイ岳系、紫、) (*Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyoku') (20、青紫) 19,85,105
06783 ヒメアポイギキョウ(通称)(*Platycodon grandiflorum* 'Hime-Apoigikyoku') (10、紫) 29
-----【キク科 Asteraceae】-----
06910 マルバテイショウソウ(*Ainsibara fragrans* var. *integrifolia*) (40-60、白~ピンク、絶滅危惧種1B) [冬に咲く] 75
06972 エゾノチチコグサ(*Antennaria dioica*) (7、濃桃、エゾノチチコグサと同じ。乾燥して痩せた牧草地や荒地などに生育する。絶滅危惧ⅠA類) 3
07172 ヤクシマノギク(*Aster yakushimensis*) (60-100、白、黄、屋久島原産、絶滅危惧ⅠA類) [少量] 106
07186 オケラ(*Atractylodes japonica*) (70、白) 106
07187 大花オケラ(アカバナオケラ)(*Atractylodes macrocephala*(*ovata*)) (30-60、赤、中国原産) 34
07292-B コモチミコウモリ(ムカゴ) (*Cacalia auriculata* var. *bulbifera*) (白、北海道、山地から亜高山) 3
07294 モミジガサ(*Cacalia celphiniifolia*) (60-80、白色の頭花、山地の林床/林縁) 32
07445 ケンタウレア アムビグア(*Centaurea ambigua*) 20
07610 サツマアザミ(*Cirsium sieboldii* ssp. *austrokiushianum*) 43
07842-W (W)ヒゴタイ(タマアザミ)(*Echinops setifer*) (70-100、青、西日本、九州、朝鮮半島南部、絶滅危惧Ⅱ類) [長野県] 92
07861 ベニニガナ(*Emilia sagittata*) (30-60、赤、1年草、本州、四国、九州~沖縄) 77
07862 ウスベニニガナ(*Emilia sonchifolia*) (30、ピンク) 77
07889 エリゲロン アウレウス(*Erigeron aureus*) (10-12、黄) [キバナアズマギク] 3,21
07928 アポイアズマギク(*Erigeron thunbergii* var. *angustifolius*) (絶滅危惧ⅠB類) 32
07929-E ハッコウダアズマギク(流通名、ミヤマアズマギクの地域変種?)(*Erigeron thunbergii* var. *glabratus*) 93
07952 ヒヨドリバナ(*Eupatorium chinense* var. *oppositifolium*) (100-200、日本各地) 2
07952-W (W)ヒヨドリバナ(*Eupatorium chinense* var. *oppositifolium*) (100-200、日本各地) [山口県] 53
07954-2 シロバナフジバカマ(*Eupatorium fortunei*) (白) 53
08150 チシマタンポポ(通称)(ヒエラキウム アルピナム)(*Hieracium alpinum*) (10-20、黄、アルプス、ヨーロッパ) 4,6,21
08151 コウリンタンポポ(エフデギク)(*Hieracium aurantiacum*) (10-20、赤) 46,77
08159 ウズラバタンポポ(*Hieracium maematum*) (20、黄、紫褐色の斑入り葉) 2
08164 ヤナギタンポポ(*Hieracium umbellatum*) (30-120、黄、北海道本州四国、山地のやや湿気た所) 88
08165 ヒエラキウム ビロースム(*Hieracium villosum*) (25、黄、明るい草原や石の多い草地などに生育する。) 3
08275 イソニガナ(*Ixeris nipponica*) (絶滅危惧Ⅱ類) 88
08360 センボンヤリ(*Leibnitzia anandria*) (9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花、北海道、本州、東アジア) 56,87
08360-E センボンヤリ(濟州島産)(*Leibnitzia anandria*) (20、白) [葉は広く厚い] 103
08389 エゾウスユキソウ(レブンウスユキソウ)(*Leontopodium discolor*) (15、絶滅危惧ⅠB類) [礼文島原産] 3
08401 チシマウスユキソウ(*Leontopodium kurilense*) (10-25、白、海岸の岩場、南千島) [少量] 106
08415 レオントポディウム ソウリエイ(四川ウスユキソウ)(*Leontopodium souliei*) [花茎10-20、苞葉1-3の星型] 3
08420 キリギシウスユキソウ(*Leontopodium hayachinense* ssp. *miyabeanum*) (夕張山系、キリギシ山蛇紋岩崩壊地) 3
08421 モコトヤマウスユキソウ(*Leontopodium discolor* f. *Mokoto*) (苞葉の先は星型に尖るが、秋になると丸くなる) [藻琴山に自生するエゾウスユキソウ] 3
08443 レプチネラ スクウオリダ「ブラツ ブラック」(*Leptinella squalida* 'Platt's Black') (葉色は緑、黒) 3
08644-W (W)コウヤボウキ(*Pertya scandens*) (60-100、白~淡い赤、木本、関東以西四国九州) [春の交換会から持ち越し] [神奈川県] 6
08671-W (W)ハマコウゾリナ(*Picris hieracioides* subsp. *japonica* var. *litoralis*) (10-20) [千葉県] 77
08671-W1 (W)ハマコウゾリナ(*Picris hieracioides* subsp. *japonica* var. *litoralis*) (10-20) [千葉県] 86
08673-W (W)コウゾリナ(*Picris hieracioides* var. *glabrescens*) [山梨県] 88
08803 ミヤマトウヒレン(*Saussurea pennata*) 6
08901 ミヤマオグルマ(*Senecio kawakamii*) (15-30、黄、高山の砂礫地、草原) 6,48
08920 ヒメタムラソウ 細葉(*Serratula coronata nana*) 92

- 08940 シルフィウム ペルフォリアツム(ツキヌキオグルマ)(*Silphium perfoliatum*) (20、黄) 30
09032 ヤブレガサ(*Syneilesis palmata*) (50、白) 106
09086 カントウタンポポ(*Taraxacum platycarpum*) [20、黄] 5
09086-W (W)カントウタンポポ(*Taraxacum platycarpum*) [春の交換会から持ち越し] 5
09091 シコタンタンポポ(*Taraxacum shikotanense*) (20、黄) [北海道由来] 3
09105 キハマギク(*Telekia speciosa*) (耐暑性弱い) 20
-----【キジカクシ科 *Asparagaceae*】-----
09283 アルブカ フミリス(*Albuca humilis*) (10、白(中央部黄)、半耐寒性、球根) 86
09375-3 スズラン(斑入り)(*Convallaria keiskei*) [散り斑3種の混合] 3
09375-W (W)スズラン(*Convallaria keiskei*) (20、白、本州中部以北から北海道) [保湿種子] [長野県] 106
09387 カンザシギボウシ(*Hosta capitata*) (60(花茎)、青紫、白、イワギボウシに似る) 19
09387-2 カンザシギボウシ(素心)(*Hosta capitata*) 51
09394 ヒメイワギボウシ(*Hosta gracillima*) 51
09394-E トサヤマギボウシ(ヒメイワギボウシの高知地域変種)(*Hosta gracillima*) (高知県の石灰岩地帯に自生) 51
09396 ウラジロギボウシ(*Hosta hypoleuca*) (大型、白花多花性、絶滅危惧 I B類) 49
09399-1 スダレギボウシ(素心)(*Hosta kikutii* var. *polyneuron*) (30-60、白、淡い青、高知県和歌山県) 51
09399-W (W)スダレギボウシ(*Hosta kikutii* var. *polyneuron*) (30-60、白、淡い青、高知県和歌山県) [高知県] 12
09399-W1 (W)スダレギボウシ(*Hosta kikutii* var. *polyneuron*) (30-60、白、淡い青、高知県和歌山県) [高知県] 51
09402 トサノギボウシ(ウナズキギボウシ)(*Hosta kikutii* var. *tosana*) [葉は黄あけぼの斑、花は八重、子宝咲き]
09419 セトウチギボウシ(*Hosta pycnophylla*) (絶滅危惧 I B類) 51
09424 シコクギボウシ(*Hosta shikokiana*) [~30、濃紫、四国赤石山系固有種] 50
09425 オオバギボウシ(*Hosta sieboldiana*) (100以上、白) 106
09425-W (W)オオバギボウシ(*Hosta sieboldiana*) (100以上、白) [愛知県] 2
09431 コバギボウシ(*Hosta sieboldii* f. *lancifolia*) (30-50、薄紫) 37,106
09438 タチギボウシ(ニシキギギボウシ)(*Hosta sieboldii* var. *rectifolia*) (60-100(茎)、薄青紫) 106
09438-1 タチギボウシ(ニシキギギボウシ)(白縞斑)(*Hosta sieboldii* var. *rectifolia*) (60-100(茎)、薄青紫) 51
09455 オトメギボウシ(*Hosta venusta*) [5、淡桃、済州島] 2
09457-1 オトメギボウシ(白中斑)(*Hosta venusta* *Variegata*) (5、斑入) 3
09490 ラケナリア プシラ(*Lachenalia (Polyxena) pusilla*) (5、白、ロゼット状の葉の間に咲く。) [春の交換会から持ち越し、] 106
09492 ポリキセナ ロンギツバ(*Lachenalia (Polyxena) longituba*) (-10、白、南アフリカ原産) 14
09494 ポリキセナ オドラータ(*Lachenalia (Polyxena) odorata*) (10、白、芳香) 21
09507 ラケナリア アルバ(*Lachenalia (Polyxena) alba*) (南アフリカ) [白小花] 94
09511 ヤブラン(*Liriope muscari*) (40、淡紫、日本各地) 2
09511-W (W)ヤブラン(*Liriope muscari*) (40、淡紫、日本各地) [愛知県] 2
09521 マイヅルソウ(*Maianthemum dilatatum*) (50-25(花茎)、白、北海道から九州) 99
09542 オオバジャノヒゲ「黒竜」(*Ophiopogon planiscapus 'Kokuryu'*) (10、白、黒葉) 53
09589 オオナルコユリ(*Polygonatum macranthum*) 49
09592 オオアマドコロ(*Polygonatum odoratum* var. *maximowiczii*) 3
09593 アマドコロ(*Polygonatum odoratum* var. *pluriflorum*) (40-80、白、緑、液果は秋に紫色に熟す) 53
09600-W (W)キチジョウソウ(*Reineckea carnea*) [愛知県] 2
09632 ツルボ(*Scilla scilloides*) (20-30、桃) 2,18
09632-W (W)ツルボ(*Scilla scilloides*) (20-30、桃、北海道から沖縄) [愛知県] 2
09633 ツルボ(矮性種)(*Scilla scilloides* dwarf type) (15、桃) 38,39
09633-E1 ツルボ(矮性種、銚子産)(*Scilla scilloides* dwarf type) (10、桃) 95
09634 シロバナツルボ(*Scilla scilloides* f. *albiflora*) (30-40、白) 95,97
09636 オニツルボ(*Scilla scilloides* var. *major*) (20-40(花茎)、淡紅紫、全国各地の海岸) [四国西南部、九州に自生] 51,103
-----【キツネノマゴ科 *Acanthaceae*】-----
09713 スズムシバナ(*Strobilanthes oligantha*) (30-60、青紫、山地の林下の陰地) 97
09714-1 スズムシバナ(青白混合)(*Strobilanthes oligantha*, *Strobilanthes oligantha* f. *albiflora*) (30-60、青紫、白、山地の林下の陰地) 88
-----【キョウチクトウ科 *Apocynaceae*】-----
09740 チョウジソウ(*Amsonia elliptica*) (30-50、青紫) 14,17,26,31,42,53,56,93
09773 ヒメイヨカズラ(*Cynanchum matsumurae*) (20-40、淡黄、奄美~琉球の固有種) 77
09782 スズサイコ(*Cynanchum paniculatum*) (100、直立する、緑、茶) 35
09810 フウセントウワタ(*Gomphocarpus physocarpus*) (60-200、一年草(本来は低木)、耐寒性弱い) 30
09885 ビンケトキシクム ニグルム(*Vincetoxicum nigrum*) (50-100、暗茶青) 92
-----【キンポウゲ科 *Ranunculaceae*】-----
09952 ヤマトリカブト(*Aconitum japonicum* var. *montanum*) (50-70、紫) 106
09952-W (W)ヤマトリカブト(*Aconitum japonicum* var. *montanum*) (50-70、紫) [長野県] 87
09962 レイジンソウ(*Aconitum loczyanum*) (50、白) 106
09962-W (W)レイジンソウ(*Aconitum loczyanum*) (50、白) [愛媛県] 12

- 09987 リシリブシ(*Aconitum sachalinense* var. *compactum*) (15、青) 3
- 10003-W (W)エゾトリカブト(*Aconitum yesoense*) (60-150、青紫、北海道) [北海道] 16
- 10003-W1 (W)エゾトリカブト(*Aconitum yesoense*) (60-150、青紫、北海道) [北海道] 22
- 10010-W (W)オオバシヨウマ(*Actaea (Cimicifuga) acerina*) (40-120(花茎)、白) [長野県] 106
- 10010-W1 (W)オオバシヨウマ(*Actaea (Cimicifuga) acerina*) (40-120(花茎)、白) [山口県] 53
- 10017-W (W)サラシナシヨウマ(*Actaea (Cimicifuga) simplex*) (40-150、白、北海道から九州) [長野県] 87
- 10017-W1 (W)サラシナシヨウマ(*Actaea (Cimicifuga) simplex*) (40-150、白、北海道から九州) [長野県] 92
- 10018 タンゴサラシナシヨウマ(*Actaea (Cimicifuga) sp.*) (80-150、白) 106
- 10072 オキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) cernua*) (30-50、暗赤紫) 19,55,89
- 10072-1 オキナグサ(混合)(*Anemone (Pulsatilla) cernua*) (30-50、) 42,93
- 10072-E オキナグサ(新潟県魚沼市由来)(*Anemone (Pulsatilla) cernua*) (30-50、暗赤紫) [秋に開花分から採種]
- 10073 キバナオキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) cernua* var. *flaba*) [10、黄、黄花の出現率は2~3割です] 19
- 10077 プルサチラ ゲオルギガ(*Anemone (Pulsatilla) georgiga*) (白・淡青) 3
- 10104 プルサチラ ルブラ(*Anemone (Pulsatilla) rubra*) 3
- 10116 セイヨウオキナグサ(プルサチラ ブルガリス)(*Anemone (Pulsatilla) vulgaris*) (20、桃) 3
- 10124 プルサチラ ブルガリス「ロード クロック」(*Anemone (Pulsatilla) vulgaris* 'Rode Klokke') (10-20、白褐色)
- 10165 アネモネ バルデンシス(*Anemone baldensis*) (日当たりのよい岩礫地、肥沃な細かい土に小石が混じったような場所にはえる) [春の交換会から持ち越し、黄緑、実生2年で咲く] 106
- 10193 アネモネ ムルチフィダ(*Anemone multifida*) (15-60、淡黄、赤、白、低地から高山帯の下部、明るい森林下、林縁、緩い傾斜草原) 93
- 10239 アネモネ ルピコラ(*Anemone rupicola*) (10、白-淡黄) 48
- 10253 ハルザキシウメイギク(通称)(アネモネ ヴァージニアナ)(*Anemone virginiana*) (50-60、白) 106
- 10280 レンゲシヨウマ(*Anemonopsis macrophylla*) (40-60、白、僅かに桃) 19,27,87,92,106
- 10280-3 レンゲシヨウマ(泥軸、白花)(*Anemonopsis macrophylla*) 92
- 10280-6 レンゲシヨウマ(八重咲き)(*Anemonopsis macrophylla*) 106
- 10291 アクイレギア アルピナ(*Aquilegia alpina*) (15-30、紫、アルプス) 77
- 10303 ヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana*) (30-50、海老茶・黄) 30,33,77,78,83,99,106
- 10303-W (W)ヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana*) [長野県] 92
- 10304 ヤマオダマキ「カリメロ」(*Aquilegia buergeriana* 'Calimero') (=ヤマオダマキ(多) [15、赤茶と黄、ダイセンヤマオダマキの選抜種] 3
- 10307 キバナヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* f. *flavescens*) (25、黄) 83
- 10307-1 キバナヤマオダマキ(距なし)(*Aquilegia buergeriana* f. *flavescens*) (25、黄) 19
- 10309 オオヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* var. *oxysepala*) (50、紫褐と黄、日当たりのよい道端、林縁、草原などにはえる) 5
- 10317 カナダオダマキ(*Aquilegia canadensis*) (20-40、赤や黄) 17,30,44,86,105
- 10340 アクイレギア エカルカラタ(フウリンオダマキ)(*Aquilegia ecalcarata*) (20-30、白薄い紫、中国、1800-3500m) [春の交換会から持ち越し] 99,106
- 10346-E オダマキ(*Aquilegia flabellata*) [春の交換会から持ち越し] 2
- 10346 オダマキ(*Aquilegia flabellata*) [20、青] 11,55,57
- 10351 オダマキ (八重)(桃花)(園芸種?)(*Aquilegia flabellata* double pink) 9
- 10356 ミヤマオダマキ(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*) (10-20、紫) 19,31,32,45,97
- 10356-4 チシマルリオダマキ(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*) (ミヤマオダマキよりやや矮性、花の色は濃い) 3
- 10356-5 ミヤマオダマキ「おぼろ」(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* 'Oboro') (10-20、薄いピンクでぼかしが入る) 95
- 10356-E2 ミヤマオダマキ(八ヶ岳系、ピンク)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*) 14,86
- 10362 ミヤマオダマキ(八重)(菊咲)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* full double fl.) [矮性] 3
- 10363 ミヤマオダマキ(桃)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* pink fl.) 3
- 10364 ミヤマオダマキ(白砂子覆輪斑)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* variegated leaf) (10-30、青紫 白) 14
- 10365 ミヤマオダマキ(白)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* white fl.) 11,31,74,76
- 10379 アクイレギア ヨネシー(*Aquilegia jonesii*) [親株は海外山草会の種子交換会より入手した種子の実生、純系である確証はない。形状、花形は写真の本物とよく似ている] 105
- 10423 ルリオダマキ(通称)→アクイレギア シベリカ(*Aquilegia sibirica*) 105
- 10470 アクイレギア ブルガリス「グリーン アップルズ」(*Aquilegia vulgaris* 'Green Apples') (咲き始めグリーンから白、八重咲き種) 30
- 10482 キタダケソウ(*Callianthemum hondoense*) (10-15、白、南アルプス北岳固有、特定国内希少野生動植物) 106
- 10484 キリギシソウ(*Callianthemum sachalinense* subsp. *kirigishiense*) (10-20、白、石灰岩の草地、北海道(岨山)(固有)、絶滅危惧IA類) 3
- 10521 エゾミヤマハンシヨウヅル(*Clematis alpina* ssp. *ochotensis*) 3
- 10544 クレマチス ヘラクレイフォリア(*Clematis heracleifolia*) (50-100、青、中国北部、朝鮮半島) 106
- 10547-W (W)ハンシヨウヅル(*Clematis japonica*) (ツル性、赤、紫、日本固有種、本州~九州) [長野県] 87
- 10574 コウヤハンシヨウヅル(*Clematis obvallata*) (絶滅危惧 I A類) 34
- 10583 カザグルマ(*Clematis patens*) (ツル性、薄い紫、秋田から九州) 19,85,92,99,106
- 10584 カザグルマ(白)(*Clematis patens* white fl.) (ツル性、白、秋田から九州) 6,87

- 10593 オオワクノテ(*Clematis serratifolia*) [黄、原種のクレマチス] 23
10604 センニンソウ(*Clematis terniflora*) (ツル、白) 87,105
10626 セリバオウレン(*Coptis japonica* var. *dissecta*) (10-30、白、本州四国) 32,35
10625-1 オウレン(青軸)(*Coptis japonica*) 44
10626-W (W)セリバオウレン(*Coptis japonica* var. *dissecta*) (10-30、白、本州四国) [兵庫県] 48
10630-1 ヒメバイカオウレン(矮性種?)(*Coptis quinquefolia*) (10-20、白褐色) [春の交換会から持ち越し、和歌山県産由来] 34
10632-1 ミツバオウレン(八重咲き)(*Coptis trifolia*) 3
10669 デルフィニウム グラレオスム(*Delphinium glareosum*) (日当たりのよい岩場、岩礫斜面、草原などに群生する中型のヒエンソウ) 106
10725 サンインシロカネソウ(ソコベニシロカネソウ)(*Dichocarpum ohwianum*) (レッドデータブック記載種) 33
10735 チチブシロカネソウ(*Enemion raddeanum*) 86
10750 シラネアオイ(*Glaucidium palmatum*) (40、淡赤紫) 3,19,42,92,106
10750-E1 シラネアオイ(*Glaucidium palmatum*) (40、) [新潟上越由来低山対応、3世代目] 80
10751 シラネアオイ(白)(*Glaucidium palmatum* var. *leucanthum*) (40、白) 3,42,93
10751-2 シラネアオイ(白)(八重咲き)(*Glaucidium palmatum* var. *leucanthum*) 103
10751-W (W)シラネアオイ(白)(*Glaucidium palmatum* var. *leucanthum*) [新潟県] 98
10798 ヘレボルス交配種、混合(*Helleborus hybrid mix colors*) 20
10798-1 ヘレボルス交配種、混合、ダブル(*Helleborus hybrid mix dbl.*) 20
10798-2 ヘレボルス交配種、混合、黒(*Helleborus hybrid mix black*) 20
10798-3 ヘレボルス交配種、ブロッツ咲き(*Helleborus hybrid blotches*) 94
10798-4 ヘレボルス交配種、ダブル(*Helleborus hybrid dbl.*) 94
10812 ヘレボルス ニゲル(*Helleborus niger*) (15、白、淡桃) 106
10830 ヘレボルス オリエンタリス(桃)(*Helleborus orientalis pink*) 20
10832 ヘレボルス オリエンタリス パープル フォーム(*Helleborus orientalis purple form*) 20
10847 ヘレボルス オリエンタリス(黒)(*Helleborus orientalis black*) 20
10895 アコウキンポウゲ(*Ranunculus acris* var. *borealis*) (樺太原産) 6
10896 ミヤマキンポウゲ(*Ranunculus acris* var. *nipponicus*) (10-50、黄、高山の草地) 8,9
10924 ラヌクルス ゴーアニ(*Ranunculus gouani*) (黄) 3
10926 ラヌクルス グラミネウス(イトハキンポウゲ)(*Ranunculus gramineus*) (20、黄、欧州) 106
10995 ヒメウズ(*Semiaquilegia adoxoides*) (10-30、白、関東から沖縄、林の中、道端) [春の交換会から] 81
11010-W (W)シギンカラマツ(*Thalictrum actaeifolium*) (30、白、関東南部から九州) [愛知県] 2
11012 ヒメカラマツ(*Thalictrum alpinum* var. *stipitatum*) 44
11024 タリクトルム デラバイ(ヘンシカラマツソウ)(*Thalictrum delavayi*) (60-120、ピンク、草原、傾斜面、岩場、灌木の間、明るい林床) 106
11039 アポイカラマツ(*Thalictrum foetidum* var. *apoiense*) 48
11040 タリクトルム フォエチヅム グラブレスケンス(チャボカラマツ)(*Thalictrum foetidum* var. *glabrescens*) [10-20、全草粉白を帯びる] 3
11042 タイカカラマツ(通称)(*Thalictrum grandiflorum*) (20-30、桃紫大輪、中国南西部原産) 91
11043 ナガバカラマツ(*Thalictrum integrilobum*) (アポイ岳特産、橄欖岩変異種) [20-30、] 3
11066 シキンカラマツ(*Thalictrum rochebrunianum*) (60、淡桃、長野、群馬、福島) 2,30,106
11070 イワカラマツ(*Thalictrum sekimotoanum*) [白] 5
11080 ムラサキカラマツ(*Thalictrum uchiyamai*) (50、薄紫、対馬と済州島のみ分布、希少種、絶滅危惧 I B類)
11082 タカサゴカラマツ(タイワンバイカカラマツ)(*Thalictrum urbainii*) (20、白(口紅赤)、台湾原産) 92
11103 トロリウス キネンシス(*Trollius chinensis*) (30、輝黄金花、中国) 106
-----【クマツヅラ科 Verbenaceae】-----
11282 ヤマブドウ(*Vitis coignetiae*) 48
-----【グミ科 Elaeagnaceae】-----
11327 アキグミ(*Elaeagnus umbellata*) (円形の銀赤色果、小型落葉樹) 48
-----【クロウメドキ科 Rhamnaceae】-----
11419-W (W)エゾクロウメドキ(*Rhamnus japonica*) [山形県] 49
-----【ケシ科 Papaveraceae】-----
11531 クサノオウ(*Chelidonium majus* var. *asiaticum*) (30-60、黄、2年草) [春の交換会から持ち越し] 2
11552 ジロボウエンゴサク(*Corydalis decumbens*) (10-20、薄い紫、実は線形のさく果、熟すると自然に散布される。関東地方から九州) [春の交換会から持ち越し] 2,4
11558 キケマン(*Corydalis heterocarpa* var. *japonica*) (60、黄とピンク、本州以南) [春の交換会から持ち越し] 2
11560-W (W)ムラサキケマン(ヤブケマン)(*Corydalis incisa*) (30-50、紫、日本各地) [春の交換会から] [長野県] 87
11623 コマクサ「緋炎」(*Dicentra peregrina* 'Hien') (園芸種、濃色赤) 42
11624 コマクサ「夕映」(*Dicentra peregrina* 'Yubae') (コマクサの濃色選抜品種) [保湿種子] 3
11761-1 パパベル アルピヌムsp(*Papaver alpinum*) 3
11770 リシリヒナゲシ(*Papaver fauriei*) (20、黄、利尻山固有種、絶滅危惧 I B類、市中に流布している種は栽培ヒナゲシの可能性大、栽培ヒナゲシとリシリヒナゲシは酷似) [少量] 42,106
11811 パパベル デゲニイ(*Papaver degenii*) [白、葉は細く繊細、無毛] 3

- 【ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae】-----
- 12281 エサシソウ(シロバナモウズイカ)(*Verbascum blattaria* f. *albiflora*) (50-80、白、2年草、帰化植物) 28,83
- 【サクラソウ科 Primulaceae】-----
- 12380 アカバナリリハコベ(*Anagallis arvensis*) (10-20、赤、一年草、亜熱帯から熱帯) 54
- 12381 ルリハコベ(*Anagallis arvensis* f. *coerulea*) (10-20、青紫、1年草、伊豆七島・紀伊半島・四国・九州・琉球) 18,41,97
- 12470 リュウキュウコザクラ(*Androsace umbellata*) 76,77
- 12491 マンリョウ(*Ardisia crenata*) (-100、赤い実、暖地) 29
- 12491-2 マンリョウ(斑入り大)(*Ardisia crenata*) 51
- 12494-3 カラタチバナ(黄実)(*Ardisia crispa*) (園芸品種) 53
- 12530 シクラメン コウム(*Cyclamen coum*) (10、ピンク、耐寒性あり) 21
- 12561 シクラメン グラエカム(*Cyclamen graecum*) (10、ピンク、地中海の島々、標高1200m、乾燥地) 21
- 12614 シクラメン プルプラッセンズ(*Cyclamen purpurascens*) (ピンク、初夏咲き、芳香あり、森林下で、あまり大きくない石が点在するアルカリ土壌に自生、耐寒性あり) 106
- 12704 ハマボツス(*Lysimachia mauritiana*) (10-40、白、北海道から九州) 2,5
- 12709 モロコシソウ(*Lysimachia sikokiana*) (50、黄、乾燥した植物体からカレーの匂い、日本固有種、本州から琉球) 23,91
- 12713 クサレダマ(*Lysimachia vulgaris* var. *davurica*) (80、黄色、北海道から九州) 2,106
- 12795-E カワシマコザクラ(*Primula borealis*) (プリムラ ポレアリスの地方種、薄紫) [種子少量] 3
- 12832 エゾコザクラ(*Primula cuneifolia*) (10、ピンク、日本では北海道のみ) 3
- 12835 ミチノコザクラ(*Primula cuneifolia* var. *heterodonta*) (絶滅危惧Ⅱ類) 3
- 12844 プリムラ デンティクラダ(*Primula denticulata*) (30、バラ白 濃淡、ヒマラヤ、耐暑性弱い) 106
- 12861 ウナンサクラソウ(*Primula filchnerae*) 35
- 12901 クリンソウ(*Primula japonica*) (20-50、赤、北海道から四国、湿地) 4,30,46,83
- 12901-3 クリンソウ(濃赤)(*Primula japonica*) 3
- 12901-5 クリンソウ(ピンク)(*Primula japonica*) 57
- 12907 オオサクラソウ(*Primula jesoana*) 106
- 12913-1 ショクカッソウ(♀短花柱×♂長花柱)(*Primula kisoana* var. *shikokiana*) (10、桃、絶滅危惧Ⅱ類) [少量] 106
- 12913-2 ショクカッソウ(♀長花柱×♂短花柱)(*Primula kisoana* var. *shikokiana*) (10、桃、絶滅危惧Ⅱ類) [少量] 106
- 12926 ヒメコザクラ(*Primula macrocarpa*) (5、絶滅危惧ⅠA類) 3
- 12947 レブンコザクラ(*Primula modesta* var. *matsumurae*) (10-20、ピンク、玉状に咲く、北海道、絶滅危惧Ⅱ類)
- 13014 サクラソウ(*Primula sieboldii*) (10-20、ピンク、北海道南部から九州) 57
- 【サトイモ科 Araceae】-----
- 13151-B アリサエマ コンサンギネウム(小球)(*Arisaema consanguineum*) (中国産) [やや好日性] 80
- 13151-B1 アリサエマ コンサンギネウム(中球)(*Arisaema consanguineum*) (中国産) [やや好日性] 80
- 13168 オキナワテンナンショウ(*Arisaema heterocephalum* ssp. *okinawaense*) (絶滅危惧ⅠA類、特定種) [20-40、冬緑性] 90
- 13169 マイヅルテンナンショウ(*Arisaema heterophyllum*) 80
- 13169-B マイヅルテンナンショウ(小~中球)(*Arisaema heterophyllum*) 80
- 13200 コウライテンナンショウ(*Arisaema peninsulae*) (80、緑、広義のムムシグサに含める見解もある) 3
- 13202 ムサシアブミ(*Arisaema ringens*) (40、関東以西、四国九州) 2
- 13208-W (W)ムムシグサ(*Arisaema serratum*) (50-100、緑、北海道から九州) [山口県] 53
- 13208-W1 (W)ムムシグサ(*Arisaema serratum*) (50-100、緑、北海道から九州) [愛知県] 2
- 13212 ユキモチソウ(*Arisaema sikokianum*) (40、付属体白、球形、近畿四国、絶滅危惧Ⅱ類) 106
- 13219-B1 ウラシマソウ(素心)(小球)(*Arisaema thunbergii* ssp. *urashima* 'Green form') (40、緑) 14,80
- 13230 ウワジマテンナンショウ(*Arisaema undulatifolium* subsp. *uwajimense*) (15-40、愛媛高知) [保湿種子] 51
- 13305 オオハング(*Pinellia tripartita*) (20-50、緑に帯紫) 2
- 13321-B サウロマツム グッタツム(*Sauromatum guttatum*) [好日性、テンナンショウに近い、耐寒性普通] 80
- 【シオデ科(サルトリイバラ科) Smilacaceae】-----
- 13375 ヒメカカラ(*Smilax biflora*) 44
- 【シソ科 Lamiaceae】-----
- 13431 カワミドリ(*Agastache rugosa*) (40-100、淡青紫穂状花、山地の草原、北海道から九州) 83,105,106
- 13493 コムラサキ(*Callicarpa dichotoma*) (50-200、紫実、葉柄と花柄の位置がわずかずれている) 2
- 13494 シラタマコシキブ(シロミノコムラサキ)(*Callicarpa dichotoma* var. *albi-fructus*) (100-200、白、白実、日本中国) 2
- 13497 ムラサキシキブ(*Callicarpa japonica*) (200-300、紫実、葉柄と花柄の位置は近接している) 53
- 13497-2 モモシキブ(ピンクパール)(*Callicarpa japonica*?) [木本、ピンク実] 53
- 13498 シロシキブ(*Callicarpa japonica* f. *albacca*) (200-300、白実、葉柄と花柄の位置は近接している) 53
- 14201 カリガネソウ(*Caryopteris divaricata*) (30-100、青紫、全草に特有の臭気、北海道から九州) 2
- 14201-1 カリガネソウ(濃色)(*Caryopteris divaricata*) 77,106
- 14202 カリガネソウ(桃)(*Caryopteris divaricata* pink) (30-100、桃) 106

- 14204 ダンギク(*Caryopteris incana*) (70-80、白、ピンク、青、紫、絶滅危惧Ⅱ類) 2,51
14270 シモバシラ(*Collinsonia* (*Keiskea*) *japonica*) (40-70、白、初冬、立ち枯れた茎の根元に霜柱状の氷柱が出来る。) 91,97
14280 ムシャリンドウ(*Dracocephalum argunense*) (10-20、青紫、北海道から中部、絶滅危惧Ⅱ類) 3
14282 ピンクコーカサスムシャリンドウ(*Dracocephalum botryoides*) 17
14289 ドラコセアルム モルダビカ(*Dracocephalum moldavica*) (1年草) 106
14300 フトボナギナタコウジュ(*Elsholtzia argi-nipponica*) 77
14373 アキチヨウジ(*Isodon longitubus*) (60-90、青、長野以西) 106
14440 メハジキ(*Leonurus japonicus*) (50-100、淡紅紫、2年草) 53
14550 カミメボウキ(*Ocimum tenuiflorum*(*sanctum*)) (30-60、薄紫、熱帯原産、芳香あり) 20,105
14634 タテヤマウツボグサ(*Prunella prunelliformis*) (15、紫、東北地方から中部地方、亜高山、高山の草地)
14637 ウツボグサ(*Prunella vulgaris* ssp. *asiatica*) (20、青、北海道から沖縄) 2,17,106
14639 ウツボグサ(白)(*Prunella vulgaris* ssp. *asiatica* white fl.) (20、白、北海道から沖縄) 105
14660 クロバナヒキオコシ(*Rabdosia trichocarpa*) (50-150、黒紫) 106
14687 アキノタムラソウ(*Salvia japonica*) (20-50、青紫、山形から九州) 2,5
14691 シナノアキギリ(*Salvia koyamae*) (絶滅危惧Ⅱ類) 92
14694 ナツノタムラソウ(*Salvia lutescens* var. *intermedia*) 92
14699-W (W)キバナアキギリ(*Salvia nipponica*) (20-30、黄、本州から九州) [東京都] 98
14710 ハルノタムラソウ(*Salvia ranziana*) (10-20、白、日本固有種、紀伊四国九州) [春の交換会から持ち越し] 92
14757-1 コバノタツナミ(白)(*Scutellaria indica* var. *parvifolia*) (5-10、白、タツナミソウより小型) [春の交換会から持ち越し] 21,05
14757-3 コバノタツナミ(色混合)(*Scutellaria indica* var. *parvifolia*) (5-10、タツナミソウより小型) 2
14870 セイヨウニンジクポク(*Vitex agnus-castus*) (200、薄い紫、南欧、西アジア) 41
14873 ハマゴウ(*Vitex rotundifolia*) (50-100、灌木、青紫、東北地方南部から九州、海岸の砂地) 2
14873-W (W)ハマゴウ(*Vitex rotundifolia*) (50-100、灌木、青紫、東北地方南部から九州、海岸の砂地) [山口県] 53
-----【シュウカイドウ科 Begoniaceae】-----
14921-1B シュウカイドウ(ムカゴ)白花(*Begonia grandis*) 47
-----【シュロソウ科 Melanthiaceae】-----
14931 シライトソウ(*Chionographis japonica*) (20-40、白、秋田から九州、山地) 2,34,47,53,97
14931-E シライトソウ(*Chionographis japonica*) (20-40、白、秋田から九州、山地) [上越市由来] 80
14931-W (W)シライトソウ(*Chionographis japonica*) (20-40、白、秋田から九州、山地) [愛知県] 2
14936 コシキジマシライトソウ(通称)(*Chionographis* sp.) (鹿児島島の甑(こしき)島の林床に自生 普通のシライトソウより葉がしっかりしていて花付も良い) 34
14938 ヒメシライトソウ(通称)(*Chionographis* sp.) (矮性シライトソウ、済州島原産) 34,56
15000 トリリウム オバツム(*Trillium ovatum*) (カナダ: プリティッシュ・コロンビア州~米国: カリフォルニア州原産) [えんじ色、エンレイソウの種子の混入の恐れあり、保湿種子] 14
15017 ミヤマエンレイソウ(*Trillium tschonoskii*) (20-40、白、北海道から九州、山地) [保湿種子] 106
15030 ベラトウルム アルブム(*Veratrum album*) (肥沃で湿った草原や牧草地、大きな岩と岩の間に生育する。) 20
-----【ショウガ科 Zingiberaceae】-----
15065 ハナミョウガ(*Alpinia japonica*) (40-60、白赤、関東以西四国九州、暖地) 44
15065-W (W)ハナミョウガ(*Alpinia japonica*) (40-60、白赤、関東以西四国九州、暖地) [愛知県] 2
-----【ジンチョウゲ科 Thymelaeaceae】-----
15243 ヤンバルガンピ(*Wikstroemia* (*Diplomorpha*) *indica*) (常緑低木、緑、沖縄) 97
15249 ガンピ(*Wikstroemia* (*Diplomorpha*) *sikokiana*) (20-30、橙) 99
-----【スイカズラ科 Caprifoliaceae】-----
15325 クロミノウゲイスカグラ(*Lonicera caerulea* ssp. *edulis* var. *emphylocalyx*) (別名ハスカップ) 3
15328-W (W)チシマヒヨウタンボク(ロニケラ カミソイ)(*Lonicera chamissoi*) (日本では高山、サハリンでは海岸近く見られる。絶滅危惧Ⅱ類) [北海道] 16
15421 マツムシソウ(*Scabiosa japonica*) (50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原) 19,54
15421-E マツムシソウ(桃色、長野地域変種か)(*Scabiosa japonica*) (50-90、) 103
15421-W (W)マツムシソウ(*Scabiosa japonica*) (50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原) [長野県] 87
15421-W1 (W)マツムシソウ(*Scabiosa japonica*) (50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原) [長野県] 92
15425 ソナレマツムシソウ(*Scabiosa japonica* var. *littoralis*) (10-30、青紫、多年草、関東、海岸、絶滅危惧Ⅱ類) 99
-----【スイレン科 Nymphaeaceae】-----
15535 コウホネ(*Nuphar japonicum*) (20-60、黄、水生、北海道から九州) [保湿種子] 2
15539 オゼコウホネ(*Nuphar pumilum* var. *ozenese*) (水生植物、黄、葉は水上から立ち上がらない、北海道、月山、尾瀬、絶滅危惧Ⅱ類) [保湿種子] 49
15545 ヒツジグサ(エゾノヒツジグサ)(*Nymphaea tetragona*) [保湿種子] 49

-----【ススキノキ科 Xanthorrhoeaceae】-----

- 15568 アスフォデルス アルブス(*Asphodelus albus*)20
 15580 キキョウラン(*Dianella ensifolia*) (60-80、淡紫、青紫の実、本州四国九州、琉球)32
 15613 ユウスゲ(キスゲ)(*Hemerocallis citrina* var. *vespertina*) (100-150、橙黄、本州から九州、山地の草原)23,26,77,92
 15614-W (W)ユウスゲ(キスゲ)(*Hemerocallis citrina* var. *vespertina*) (100-150、橙黄、本州から九州、山地の草原) [広島県]15
 15616 ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)(エゾカンゾウ)(*Hemerocallis dumortieri* var. *esculenta*) (50-70、黄、北海道から中部、山地、亜高山)31,97,106
 15620 ハマカンゾウ(*Hemerocallis fulva* var. *littorea*) (50-80、橙、関東から沖縄、海岸)53
 15621 ノカンゾウ(*Hemerocallis fulva* var. *longituba*) (50-70、黄)77
 15624 ヘメロカリス交配種(*Hemerocallis hybrid-tetraploidy*) (40-60、四倍体)20
 15630 トビシマカンゾウ(*Hemerocallis middendorffii* var. *exaltata*) (100-200、黄、ニッコウキスゲより大型、飛鳥、佐渡島のみ分布)77

-----【スミレ科 Violaceae】-----

- 15732 アリアケスミレ(*Viola betonicifolia* var. *albescens*) (白地に紅紫、紫の紫状、本州から九州、朝鮮・中国) [春の交換会から持ち越し]2,33
 15732-W (W)アリアケスミレ(*Viola betonicifolia* var. *albescens*) (白地に紅紫、紫の紫状、本州から九州、朝鮮・中国) [春の交換会から持ち越し] [愛知県]2
 15734 キバナノコマノツメ(*Viola biflora*)3
 15747 オオバキスミレ(*Viola brevistipulata*) (濃黄、唇弁に赤紫の条が入る、北海道から島根、多雪地)3
 15755 ダイセンキスミレ(*Viola brevistipulata* ssp. *minor*) (濃黄、花卉の裏側は暗紅褐色のぼかし、中国山地)3
 15757 ナエバキスミレ(*Viola brevistipulata* var. *kishidai*) (有茎種、黄、上越から南東北の亜高山)3
 15767 ヒゴスミレ(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana*) (12、普通は白、九州産には紅がかかる)14
 15770-1 ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン)(通称ウスベニヒゴスミレ)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana* x *eizanensis*) (濃淡の紅が入る。)5
 15770-2 ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン、純白)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana* x *eizanensis*) (白)5
 15784 タカネスミレ(*Viola crassa*) (5-12、黄、高山帯、本州中部地方以北～北海道)3
 15803-2 エイザンスミレ(黄白掃斑)(*Viola eizanensis*)24
 15806-E ナルカミスミレ(*Viola eizanensis* var. *simplicifolia* f. *leucantha*) ((ヒツバエゾスミレの白花種)) [春の交換会から持ち越し、素心]5
 15806 ナルカミスミレ(*Viola eizanensis* var. *simplicifolia* f. *leucantha*) ((ヒツバエゾスミレの白花種))5
 15825-3 タチツボスミレ(色混合)(丈10)(*Viola grypceras*) [春の交換会から持ち越し]2
 15825-4 タチツボスミレ(色混合)(丈20)(*Viola grypceras*) [春の交換会から持ち越し]2
 15825-8 タチツボスミレ(距が多い)(*Viola grypceras*)5
 15827 シロバナタチツボスミレ(*Viola grypceras* f. *albiflora*) (白) [春の交換会から持ち越し]5
 15831 オトメスミレ(*Viola grypceras* f. *purpurelocalcarata*) (10-20、白、距に淡い紫が残る、箱根で発見) [春の交換会から持ち越し]5
 15857 ヒメスミレ(*Viola inconspicua* ssp. *nagasakiensis*) (濃紫、唇弁と側弁に紫条が入る。低地)33
 15857-W (W)ヒメスミレ(*Viola inconspicua* ssp. *nagasakiensis*) (濃紫、唇弁と側弁に紫条が入る。低地) [春の交換会から持ち越し] [愛知]2
 15861 コスミレ(*Viola japonica*) (淡桃、淡紫、北海道南西部から九州まで)2,5,33,94
 15861-1 コスミレ(紫)(*Viola japonica*) (濃い紫、) [春の交換会から持ち越し、埼玉県由来]5
 15865 フイリコスミレ(*Viola japonica* f. *variegata*) [黄掃斑、斑入りの出現は2～3割]5,24
 15866 コスミレ(ピンク)(*Viola japonica* pink) [春の交換会から持ち越し]5
 15868 ビオラ ヨーイ(*Viola jooi*)3
 15891 スミレ(*Viola mandshurica*) (通常濃赤紫、唇弁に紫条が入る。日本全土)89
 15891-W (W)スミレ(*Viola mandshurica*) (通常濃赤紫、唇弁に紫条が入る。日本全土) [春の交換会から持ち越し] [愛知県]2
 15898 アナマスミレ(*Viola mandshurica* f. *crassa*) [5-10、紫、利尻島由来]33
 15907 アツバスマミレ(*Viola mandshurica* var. *triangularis*) [5-10、白、神津島由来]33
 15909-E ニイジマスミレ(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *nijimensis*) (10、白、東京都原産) [春の交換会から持ち越し、新島産由来]5
 15909 ニイジマスミレ(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *nijimensis*) (10、白、東京都原産)5
 15925-1 ニオイタチツボスミレ(丈が小、色混合)(*Viola obtusa*) [春の交換会から持ち越し]2
 15925-2 ニオイタチツボスミレ(丈が大、色混合)(*Viola obtusa*) [春の交換会から持ち越し]2
 15925-W2 (W)ニオイタチツボスミレ(*Viola obtusa*) (濃紫、濃紅紫、中央部白くぬける。ほぼ日本全土) [春の交換会から持ち越し] [愛知県]2
 15930-1 ビオラ オドラタ(斑入り葉)(*Viola odorata*) (別名ニオイスマミレ)24
 15938 ナガバナタチツボスミレ(*Viola ovato-oblonga*) (2)
 15955 アカネスミレ(*Viola phalacrocarpa*) (基本は茜色、青紫～紅紫、)33
 15980-E ナガハシスミレ(菅名岳由来)(*Viola rostrata* var. *japonica*) (濃い紫、)5
 15985 アイヌタチツボスミレ(ビオラ サハリネンシス)(*Viola sacchalinenensis*)3

- 15994 フイリミヤマスマレ(*Viola selkirkii* f. *variegata*) (紅紫、葉脈の沿って白い斑が入る) [春の交換会から持ち越し]92
- 16002-W (W)フモトスマレ(ビオラ シーボールドイ) (*Viola sieboldii*) (一般に白、唇弁と側弁に紅紫条が入る。西日本に多い) [春の交換会から持ち越し] [愛知県]2
- 16028 ヒナスミレ(*Viola tokubuchiana* var. *takedana*) (淡ピンク、白、細かい紅条が入る)33
- 16029 シロバナヒナスミレ(*Viola tokubuchiana* var. *takedana* f. *albiflora*) (白)33
- 16042 シロバナフイリゲンジスマレ(*Viola variegata* sp.) (白、葉脈の沿って白い斑が入る) [少量]24
- 16043 ゲンジスマレ(*Viola variegata* var. *nipponica*) (淡紫、裏面の方が色が濃い、花卉に紫の条が入る、日本には自生しない)33
- 16043-1 ゲンジスマレ(流通名イヨゲンジスマレ) (*Viola variegata* var. *nipponica*) (愛媛系) [春の交換会から持ち越し]
- 16043-W ゲンジスマレ(流通名イヨゲンジスマレ) (*Viola variegata* var. *nipponica*) [愛媛県]24
- 16044 ツボスマレ(別名ニョイスミレ) (*Viola verecunda*) (淡紫、唇弁と側弁に赤紫の条が入る) [春の交換会から持ち越し]2
- 16050 コケスマレ(*Viola verecunda* var. *yakusimana*) (白、唇弁に赤紫の条が入る) [少量]24
- 16055 コンピラスミレ(*Viola violacea* f. *pictitolia*) [少量]24
- 16063 スミレ「紅鶴」(エイザンスミレ x ベニバナナンザンスミレ) (*Viola* x '*Benzuru*') (ナンザン x ヒゴに酷似)40
- 16068 ノジスマレ(*Viola yedoensis*) (淡紫、紫条あり)33
- 16075 タカオスマレ(*Viola yezoensis* f. *discolor*) (春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる) [生成りの白]5,33
- 16076 アソヒカゲスマレ(*Viola yezoensis* var. *asoana*) (15、春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる) [少量]24,33
- 16077 シソバキスマレ(*Viola yubariana*(*Viola brevistipulata* var. *crassifolia*)) (濃黄、唇弁に赤紫の条が入る、北海道、蛇紋岩地帯、絶滅危惧Ⅱ類)3
- 16079 シラユキスマレ(*Viola verecunda* f. *condidissima*) [春の交換会から持ち越し]2
- 【セリ科 Apiaceae】-----
- 16164 アンジェリカ シルベストリス シルベストリス(*Angelica sylvestris* subsp. *sylvestris*)20
- 16184 アストラアンティア マヨル「ラルス」(*Astrantia major* '*Lars*') (選抜種)20
- 16192 アストラアンティア マヨル「ローマ」(*Astrantia major* '*Rome*') (ピンク)3
- 16204 ホタルサイコ(*Bupleurum longiradiatum* subsp. *sachalinense* var. *elatis*) (50、黄、北海道から九州)92
- 16213 ミシマサイコ(*Bupleurum scorzoneraefolium* var. *stenophyllum*) (30-50、黄、薬草、本州四国九州、絶滅危惧Ⅱ類)48
- 16230 ツボクサ(*Centella asiatica*) (茎は這性、淡紅紫、関東以西から琉球、耐寒性弱い)20
- 16237 ヒナセントウソウ(*Chamaele decumbens* f. *gracillima*)45
- 16260-W (W)ミツバ(*Cryptotaenia japonica*) [長野県]79
- 16283 エリンギウム アクイフォルウム(*Eryngium aquifolium*) (青)20
- 16295 ハマボウフウ(*Glehnia littoralis*) (10-30、白、日本全土海岸地帯)88
- 【センリョウ科 Chloranthaceae】-----
- 16501 ガビサンヒトリシズカ(流通名?) (*Chloranthus henryi*) [乾燥種子]45
- 16502-2 ヒトリシズカ(青軸、素心) (*Chloranthus japonicus*) (5-7、) [種子交換委員会注:乾燥種子]14
- 16510-W (W)センリョウ(*Sarcandra glabra*) (50-100、黄、赤実、関東地方から沖縄) [愛知県]2
- 【タデ科 Polygonaceae】-----
- 16542 イブキトラノオ(*Bistorta major* var. *japonica*) (30-100(花茎)、淡紅、特に伊吹山に多い)46
- 16571 ソバ(*Fagopyrum esculentum*) [白]46
- 16612 ヒメタデ(*Persicaria erecto-minor*) (5-15、淡紅、草地川岸、絶滅危惧Ⅱ類)54
- 16613 アオヒメタデ(ヒメタデの白花種) (*Persicaria erecto-minor* f. *viridiflora*) (5-15、花は緑白)48,54
- 16620 ミズヒキ(*Persicaria filiforme*) (30-50(地植え)、赤白)2,37
- 16620-1 ミズヒキ(白花) (*Persicaria filiforme*) (30-50(地植え)、白)37
- 16622 ミズヒキ(斑入り「ペインターズ・パレット」) (*Persicaria filiformis* '*Painter's Palette*') (40、赤白、斑入り)105
- 16624 ギンミズヒキ(*Persicaria filiformis* f. *albiflora*) (30-50(地植)、15(鉢)、白、多年草)2
- 16636-1 イヌタデ(斑入り) (*Persicaria longiseta*)47,54
- 16641 イザリイヌタデ(業者流通名:ヒメタデ、ヤクシマタデ) (*Persicaria longiseta* f. *diuricatoamosa*)97
- 16666 アイ(通称タデアイ/アイタデ) (*Persicaria tinctoria*)47
- 16666-2 マルハアイタデ(流通名か) (*Persicaria tinctoria*?)45
- 【タヌキモ科 Lentibulariaceae】-----
- 16767 ムシトリスマレ(*Pinguicula vulgaris* var. *macroceras*) (紫色) [北海道由来]3
- 【ツツジ科 Ericaceae】-----
- 16890 チシマツガザクラ(*Bryanthus gmelinii*) (5、淡紅、ツガザクラとは別属、東北から北海道、高山帯、絶滅危惧Ⅱ類)3
- 17030 アカモノ(*Gaultheria adenostrix*) (10-20、白、赤実、小低木) 3,106
- 17034 シラタマノキ(*Gaultheria miqueliana*) (10-30、白実、小低木)106
- 17080 ミネズオウ(*Loiseleuria procumbens*) (6-10、白、小低木)3
- 17140 ナガバツガザクラ(*Phyllodoce nipponica* var. *oblongo-ovata*) (10-20、白、小低木、北海道から東北中北部、高山帯) [播種は山苔か水苔、発芽率は低い]3

- 17163-W (W)ベニバナイチヤクソウ(*Pyrola incarnata*) (15-25、紅、亜高山帯の林床、半寄生植物とも言われている) [種子には胚乳がないので、発芽には共生菌が必要、生育には別の共生菌が存在しているとされている] [長野県]106
- 17189-W (W)キバナシャクナゲ(*Rhododendron aureum*) (60-70、薄黄、低木、北海道から中部、高山帯から亜高山上部) [山梨県]98
- 17200 エゾツツジ(*Rhododendron camtschaticum*) (10-30、桃、小低木、高山帯)42
- 17200-1 エゾツツジ(濃色)(*Rhododendron camtschaticum*) (赤花) [木立性]3
- 17271 アカヤシオ(*Rhododendron pentaphyllum* var. *nikoense*)106
- 17386-W (W)アキシバ(*Vaccinium japonicum* Maximowicz) (50-100、ピンク、赤実、北海道から九州、山地) [山形県]49
- 17390 ナツハゼ(*Vaccinium oldhamii*) (150-300、黒実) [果実(乾燥)の状態を提供]6,31
- 17390-W (W)ナツハゼ(*Vaccinium oldhamii*) [山形県]49
- 17390-W1 (W)ナツハゼ(*Vaccinium oldhamii*) [山口県]53
- 17396 イワツツジ(*Vaccinium praestans*) (10、落葉小低木、赤実、本州の高山帯、北海道) [香りが強い液果]3
- 17396-W (W)イワツツジ(*Vaccinium praestans*) (10、落葉小低木、赤実、本州の高山帯、北海道) [北海道]16
- 17403 クロマメノキ(*Vaccinium uliginosum*) (30-80、白、黒紫実、北海道、中部以北、亜高山帯から高山帯)3
- 17404 コケモモ(*Vaccinium vitis-idaea*) (10-40、白、赤実、常緑低木、酸性土壌を好む、高山帯)3
- 17404-1 摩周コケモモ(*Vaccinium vitis-idaea*) (コケモモ中粒種)3
- 17410 バクシニウム ミルティルス(*Vaccinium myrtillus*) (英名Bilberry)3
- 17411 バクシニウム アングスティフォリウム(*Vaccinium angustifolium*) (15、矮性のブルーベリー原種)3
- 17412 ブルーベリー「ブルーレイ」(*Vaccinium "Cyanococcus"*) (ハイブッシュタイプ)3
- 17413 ブルーベリー「ハーバード」(*Vaccinium "Herbard"*) (ハイブッシュタイプ)3
- 17414 ブルーベリー「ウッドワード」(*Vaccinium ashei "Woodard"*) (ラビットアイタイプ)3
- 【ツツラフジ科 Menispermaceae】-----
- 17417-W (W)アオツツラフジ(*Cocculus trilobus*) [大阪府]34
- 17450 アオカズラ(*Sabia japonica*) (絶滅危惧 I B類) [(ルリビョウタン)]35
- 【ツバキ科 Theaceae】-----
- 17511 ナツツバキ(*Stewartia pseudo-camellia*)49
- 【ツユクサ科 Commelinaceae】-----
- 17535 アネイレマ アエクイノクチアレ(*Aneilema aequinotiale*) (南アフリカ原産、多年草)48
- 17549 ツユクサ(斑入、黄縞斑)(*Commelina communis* variegated leaf) (60、)54
- 17549-1 ツユクサ(斑入、白斑)(*Commelina communis* variegated leaf)54
- 17570 ヤブミョウガ(*Pollia japonica*) (50-60、白小花、関東から九州)2,26,37
- 17570-W (W)ヤブミョウガ(*Pollia japonica*) (50-60、白小花、関東から九州) [山口県]53
- 17570-W1 (W)ヤブミョウガ(*Pollia japonica*) (50-60、白小花、関東から九州) [愛知県]2
- 【ツリフネソウ科 Balsaminaceae】-----
- 17594 キツリフネ(*Impatiens noli-tangere*) (40-80、黄、一年草、北海道から九州)2,53
- 17598 ツリフネソウ(*Impatiens textori*) (50-80、赤紫、一年草、日本各地)5,35,53
- 17598-2 ツリフネソウ(ピンク)(*Impatiens textori*) (50-80、ピンク、一年草、)52
- 17598-4 ツリフネソウ(ピンク)吹掛(*Impatiens textori*) (30、ピンク) [白に紫の斑点]53
- 17599 ツリフネソウ(白)(*Impatiens textori 'Alba'*) (30、白)53
- 17601 シロツリフネ(*Impatiens textori* f. *pallescens*) (50-80、白、一年草、北海道から九州)5,35
- 【ツルナ科 Aizoaceae】-----
- 17615 デロスペルマ コンゲスタ(*Delosperma congesta*) (黄、耐暑性、耐寒性強い、南アフリカ)3
- 【テコフィラエア科 Tecophilaeaceae】-----
- 17653 テコフィラエア ライトリー(*Tecophilaea cyanocrocus* var. *leichtlinii*) (キアノクロックスの変種)21
- 【トウダイグサ科 Euphorbiaceae】-----
- 17704 ショウジョウソウ(クサショウジョウ)(*Euphorbia heterophylla*) (30-50(地植)、16(鉢)、橙・緑、頭頂部赤)2,77
- 17780 シラキ(*Sapium japonicum*) (落葉小高木、材が白いことからの名、本州から沖縄)44
- 【ナス科 Solanaceae】-----
- 17885 ブロワリア アメリカナ(*Browallia americana*) (30-70、青)106
- 17940-1 オオセンナリ(通称クロホオズキ)(斑入り)(*Nicandra physaloides*) (50-100、薄紫、1年草、南アメリカ、帰化植物)53,83
- 17970 ホオズキ(*Physalis alkekengi* var. *frachetii*) (60、白)2
- 17972 センナリホオズキ(*Physalis pubescens*) [20-30、白]53
- 18002-W (W)ヒョドリジョウゴ(*Solanum lyratum*) (ツル、秋に赤い実) [山口県]53
- 【ナデシコ科 Caryophyllaceae】-----
- 18087 オオバナノミミナグサ(リシリミミナグサ)(*Cerastium fischerianum*)11
- 18095 タガソデソウ(*Cerastium pauciflorum* var. *amurense*) (絶滅危惧 II 類)92
- 18128 オヤマナデシコ(*Dianthus alpinus*) (5-10、濃紅)15
- 18182 ディアンツス グラキアリス(ヒョウガナデシコ)(*Dianthus glacialis*) (5-10、ピンク、ヨーロッパアルプス原産)3
- 18194 ハマナデシコ(フジナデシコ)(*Dianthus japonicus*) (15-40、濃桃、本州から沖縄、海岸)37,53,54

- 18196 シロバナハマナデシコ(*Dianthus japonicus* f. *albiflorus*) (15-40、白)95,105
18197 ヒメハマナデシコ(*Dianthus kiusianus*) (15-30、ピンク、和歌山愛媛、沖縄まで、海岸、日本固有種)97,103,105
18205 ディアンツス ミクロレピス(*Dianthus microlepis*) [濃赤、3-4、灰緑色マット状、]3
18233 シナノナデシコ(*Dianthus shinanensis*) (20、赤紫、本州中部、荒地)30,77,78
18234 シナノナデシコ(白)(*Dianthus shinanensis* white fl.)76
18249 クモイナデシコ(*Dianthus superbus* var. *amoenus*) (10-20、ピンク、タカネナデシコの変種) 3,97
18250 クモイナデシコ(白)(*Dianthus superbus* var. *amoenus* white fl.) (10-20、白、タカネナデシコの変種)17
18251 カワラナデシコ(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*) (20-50、桃、萼片の長さは3-4でエゾカワラナデシコより長い、)2,3,25,41,78,98
18251-1 カワラナデシコ(濃色)(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*) (20-50、濃い桃)3
18251-3 カワラナデシコ(白、赤、桃混合)(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*)31
18251-7 カワラナデシコ(絞り咲き)(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*)98
18258 タカネナデシコ(シモフリナデシコ)(*Dianthus superbus* var. *speciosus*) (15、桃、エゾカワラナデシコの高山型、本州以北)105
18274 イセナデシコ(*Dianthus x isensis*) (ピンク)99,105
18277 ナデシコ「秩父乙女」(*Dianthus 'Titibuotome'*) (赤)9
18436 リクニス カルケドニカ(*Silene (Lychnis) chalcidonica*) [アメリカセンノウ]3,20
18444 スイセンノウ(フランネルソウ)(*Silene (Lychnis) coronaria*) (60、淡紅、南ヨーロッパ原産)2
18445 リクニス コロナリア「アルバ」(*Silene (Lychnis) coronaria 'Alba'*)20
18457 カッコウセンノウ(*Silene (Lychnis) flos-cuculi*) (30-40、桃、ヨーロッパアルプス原産)30
18459 ヒメカッコウセンノウ(流通名)→リクニス フロスククリ ナナ(*Silene (Lychnis) flos-cuculi nana*)3
18462 リクニス フロス-ジヨビス(*Silene (Lychnis) flos-jovis*)20
18467 ムギセンノウ(*Silene (Lychnis) githago*) (100、桃)17
18468 センジュガンビ(*Silene (Lychnis) gracillima*) (30-100、白、東北～中部地方以北)4,46
18470 オグラセンノウ(*Silene (Lychnis) kiusiana*) (絶滅危惧Ⅱ類)19,85
18472 フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*) (30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州)99,106
18472-W (W)フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*) (30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州) [長野
18472-W1 (W)フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*) (30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州) [長野
18472-W2 (W)フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*) (30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州) [山梨
18477 マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(*Silene (Lychnis) sieboldii*) (30-40、紅、一般に流通するのは葉や茎に赤が混じらないツクシマツモト)2,14,19,85,96,106
18482 エンビセンノウ(*Silene (Lychnis) wilfordii*) (40、赤、北海道の一部、埼玉長野、絶滅危惧Ⅱ類)3,19,22
18527 ムシトリナデシコ(*Silene armeria*) (40-70、桃、南ヨーロッパ原産、北海道から九州)2,77
18570 フシグロ(*Silene firma*) (30-100、白、越年草、北海道から九州)106
18592 羽衣センノウ(園芸種)(*Silene (Lychnis) sp.*) [ロゼットから花茎10-20、パステルピンク]3
18597 ツルビランジ(*Silene keiskei* f. *procumbens*) (這性、濃いピンク、絶滅危惧ⅠA類)97,106
18599 タカネビランジ(*Silene keiskei* var. *akaisialpina*) (10-15、赤紫、中部、高山帯)98,99,106
18602 シロバナビランジ(*Silene keiskei* var. *minor* f. *albescens*) (10-15、白、ビランジの白花種)106
18628-E サクラマンテマ(*Silene pendula*) (60以下、桃、帰化植物、地中海沿岸) [春の交換会から持ち越し]4
18628 サクラマンテマ(*Silene pendula*) (60以下、桃、帰化植物、地中海沿岸)8
18665 シレネ ウニフローラ(イソマンテマ)(*Silene uniflora*) (5、白)105
18670 タカネマンテマ(*Silene uralensis*) (白、絶滅危惧ⅠA類)3,92
18686 シレネ デイオイカ「レイズ ウインター クリーム」(*Silene dioica* "Ray's winter cream")20
18729 エゾイワツメクサ(*Stellaria pterosperma*) (絶滅危惧ⅠB類)3
-----【ニシキギ科 Celastraceae】-----
18772 ニシキギ(*Euonymus alatus*) (200-300、薄緑、落葉低木、赤実)2
18776 コマユミ(*Euonymus alatus* f. *stiatu*) (100-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州)2,44,99
18776-W (W)コマユミ(*Euonymus alatus* f. *stiatu*) (100-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州) [石川県]31
18776-W1 (W)コマユミ(*Euonymus alatus* f. *stiatu*) (100-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州) [山口県]53
18790 アメリカマユミ(別名イガグリマユミ)(*Euonymus hamiltonianus*) (耐寒性あり、北アメリカ)8
18806 ツリバナ(*Euonymus oxyphyllus*) (100-400、淡緑、赤実、落葉低木、北海道から九州、山地)2,99
18817 フウリンツリバナマユミ(*Euonymus sp.*) (プロペラの様な実がなるネット)8
18823 ムラサキツリバナ(*Euonymus sachalinensis* var. *tricarpu*)49
18834 シラヒゲソウ(*Parnassia foliosa* var. *nummularia*) (15-30、白、本州四国九州) [少量、保湿種子]106
18839-W (W)ウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *multiset*) [10-50、白、山地の湿地、北海道から九州] [長野県] 87
-----【ハエドクソウ科 Phrymaceae】-----
19202 ハマホオズキ(通称)? (*Mimulus sp. ?*)43
-----【ハナイカダ科 Helwingiaceae】-----
19243 ヘルウインギア キネンシス(中国ハナイカダ)(*Helwingia chinensis*)52
-----【ハナシノブ科 Polemoniaceae】-----
19313 フロックス キャロニナ「ビルベーカー」(*Phlox carolina 'Bill Baker'*)77

- 19337 エゾハナシノブ(*Polemonium caeruleum* ssp. *yezoense*) (30-80、青、北海道から本州北部(日本海側)、絶滅危惧Ⅱ類)22
- 19353 ハナシノブ(*Polemonium kiushianum*) (30-50、濃い紫、絶滅危惧ⅠA類、特定種)11,30,83,92,106
- 19369 ヒダカハナシノブ(*Polemonium caeruleum* f. *hidakanum*) (エゾハナシノブと違うのは茎や花序が無毛)84
- 19370 エゾハナシノブ(白花)(*Polemonium caeruleum* ssp. *Yezoense alba*) (30-80、白、北海道から本州北部(日本海側)、絶滅危惧Ⅱ類)77
- 【ハナヤスリ科 Ophioglossaceae】-----
- 19393 ナガホノナツノハナワラビ(*Botrychium strictum*)49
- 【ハマウツボ科 Orobanchaceae】-----
- 19420 ナンバンギセル(*Aeginetia indica*) (20、赤紫、北海道から沖縄、イネ科の他ミョウガなどにも寄生)2,24,31,44,54,55,56,97
- 19420-1 ナンバンギセル(口紅咲き)(*Aeginetia indica*) (20、白)43,96
- 19420-3 ナンバンギセル(白ふち)(*Aeginetia indica*) (20、赤紫)43
- 19420-W (W)ナンバンギセル(*Aeginetia indica*) (20、赤紫、北海道から沖縄、イネ科の他ミョウガなどにも寄生) [東京都]98
- 19421 ナンバンギセル(白)(*Aeginetia indica* white fls) (20、白)44
- 19560 コシオガマ(*Phtheirospermum japonicum*) (30、桃、低地性、半寄生)5
- 【バラ科 Rosaceae】-----
- 19612 キンミズヒキ(黄金葉)(*Agrimonia pilosa*)35
- 19613 キンミズヒキ(*Agrimonia pilosa* var. *japonica*) (30-50(地植)、15(鉢)、黄、北海道から九州) 2,47
- 19635 セイヨウカマツカ(通称)(*Aronia arbutifolia*) (赤実、耐寒性あり、北アメリカ原産)31,48
- 19636 アロニア メラノカルパ(*aronia melanocarpa*) (英名ブラックチョークベリー)3
- 19681 サンザシ(*Grataegus cuneata*) (200、落葉低木、白花、赤実、中国中部)106
- 19708 チョウノスケソウ(*Dryas octopetala* var. *asiatica*)93
- 19776 オオダイコンソウ(*Geum aleppicum*) (30、黄)2
- 19787 ダイコンソウ(*Geum japonicum*) (30-50、濃黄、花径3、北海道から九州)83
- 19794 チングルマ(*Geum pentapetalum*) (15、白、北海道から中部以北、高山帯から亜高山帯)3,93
- 19820 ミツバシモツケ(*Gillenia trifoliata*) (60-100、白、北アメリカ原産)29
- 19902 カマツカ(*Photinia* (*Pourthiaea*) *villosa* var. *leavis*) (500-700、白、赤実、本州から九州)34
- 19938 イワキンバイ(*Potentilla dickinsii*) (10-20、黄、北海道から九州)44
- 19938-E イワキンバイ(*Potentilla dickinsii*) (10-20、黄、北海道から九州) [夕張岳由来]105
- 19939 ヤクシマイワキンバイ(通称)イワキンバイの矮性型?(*Potentilla dickinsii*?) (5位、黄、やのある3小)
- 19969 ユウバリキンバイ(*Potentilla matsumurae* var. *yuparensis*) (10-30、黄、絶滅危惧IB類)9,41,46,48,77
- 19970 チシマキンバイ(*Potentilla megalantha*) (10-20、黄、北海道)4,6,11,85,97
- 20005 ポテンティラ レクタ(ハタザオキンバイ)(*Potentilla recta*) [春の交換会から持ち越し]77
- 20125 シロヤマブキ(*Rhodotypos scandens*) (100、一重白、小作りには多剪定、)2,6,36,40
- 20135 カカヤンバラ(ヤエヤマノイバラ)(*Rosa bracteata*) (100、白、沖縄(先島諸島) 海岸の草原、荒地) [花期5-10月、西表島由来、種子交換委員会注:精製後保湿種子]12105
- 20143 サンショウバラ(*Rosa hirtula*) (100-500、ピンク、富士箱根地方、絶滅危惧Ⅱ類) [乾燥種子]2
- 20143-E サンショウバラ(*Rosa hirtula*) (100-500、ピンク、富士箱根地方、絶滅危惧Ⅱ類) [保湿種子]106
- 20152 タカネバラ(*Rosa nipponensis*) (100-200、赤、日本固有種、中部山岳部から四国剣山など)19,27
- 20157 ハマナス(*Rosa rugosa*) (100-150、ピンク、北海道、南は茨城、島根)3
- 20157-E ハマナス(*Rosa rugosa*) (100-150、ピンク、北海道、南は茨城、島根) [保湿種子]106
- 20264 フレモコウ(*Sanguisorba officinalis*) (30-100、赤、紫、北海道から九州)2
- 20264-1 フレモコウ(ゴマ斑)(*Sanguisorba officinalis*)24
- 20264-W (W)フレモコウ(*Sanguisorba officinalis*) (30-100、赤、紫、北海道から九州) [愛知県]2
- 20268 タンナワレモコウ(ヒメワレモコウ)(*Sanguisorba officinalis* var. *microcephala*) (-15、赤紫、済州島特産) [種子交換委員会注:シイナ多い]22
- 20313 ナナカマド(*Sorbus commixta*) (400、白)3,44
- 20317 ナンキンナナカマド(*Sorbus gracilis*) (100-300、黄、赤実、東北南部から九州)55
- 20329 タカネナナカマド(*Sorbus sambucifolia*)3
- 20329-E タカネナナカマド(大雪山由来)(*Sorbus sambucifolia*) [果実がやや大きい]3
- 20329-W (W)タカネナナカマド(*Sorbus sambucifolia*) [山梨県]98
- 【ヒガンバナ科 Amaryllidaceae】-----
- 20450 ステゴビル(*Allium* (*Caloscordum*) *inutile*) (20、白、絶滅危惧Ⅱ類)92,96
- 20511 オオハナニラ(アリウム ギガンテウム)(*Allium giganteum*)2
- 20603 カンカケイニラ(アリウム トガシイ)(*Allium togashii*) (白、淡紫、小豆島特産種、絶滅危惧ⅠB類)96
- 20605 アリウム ツベロスム(ガーリックヒヤイブ)(*Allium tuberosum*) (30、白、ニンニク臭がある)74
- 20610 ギョウジャニンニク(*Allium victorialis* var. *platyphyllum*) (40-60、白、北海道から近畿、山地、山菜で食用)3106
- 20645 キルタンツス ブラキスキフス(*Cyrtanthus brachyscyphus*) (30、輝赤)21
- 20670 ハブランツス アンダーソニー(*Habranthus andersonii*) (15-25、橙)14,37,105
- 20711 アマリリス「ルドウィヒス スカーレット」(*Hippeastrum* x '*Ludwing's Scarlet*') (80、赤花、交配種)2

- 20741 レウココム アウツムナレ(*Leucojum autumnale*) (20、白、アキザキスノーフレークとも呼ばれる)82,86,105
20759 キツネノカミソリ(*Lycoris sanguinea*) (30-50、橙、北海道から九州)2
20776 ナルキスス ブルボコディウム(*Narcissus bulbocodium*) (10-20、黄、地中海沿岸原産) [春の交換会から持ち越し、黄緑、実生2年で咲く]106
20786 ナルキスス ブルボコディウム コンスピキユアス(*Narcissus bulbocodium* ssp. *conspicuus*) (15、黄、西ヨーロッパ、北アフリカ) [春の交換会から持ち越し]105
20788 ナルキスス ブルボコディウム オベス(*Narcissus bulbocodium* ssp. *obesus*) (10、濃黄、スペイン原産) [春の交換会から持ち越し]105
20904 サフランモドキ(*Zephyranthes carinata* Herb) (30、淡いピンク)2,14
20905 ゼフィランテス キトリナ(*Zephyranthes citrina*) (50、黄、半耐寒性)2
20915 ゼフィランテス リンドレヤナ(*Zephyranthes lindleyana*) (20、オレンジ?(淡桃))30
-----【ヒシ科 Trapaceae】-----
20937 ヒメビシ(*Trapa incisa*) [保湿種子]49
-----【ビャクダン科 Santalaceae】-----
21050 ツクバネ(*Buckleya lanceolata*) (100-200、落葉小低木、雌雄異株、半寄生(ツガ、モミ、アセビ)、本州・四国・佐賀長崎大分)87
-----【ヒルガオ科 Convolvulaceae】-----
21200 マルバルコウ(マルバルコウソウ、ツタノハルコウ)(*Ipomoea (Quamoclit) coccinea*) (ツル、濃橙、一年草、中央アメリカ原産、帰化植物)53,98
21209 アサガオ(莖なし)(*Ipomoea (Quamoclit) nil* very short type) (15、濃ピンク白縁)97
21214 マルバアサガオ(通称 ウンナンアサガオ/ウンナンヒルガオ)(*Ipomoea (Quamoclit) purpurea* syn. *Pharbitis purpurea*)12,24,54
21216 ホシアサガオ(*Ipomoea (Quamoclit) triloba*) (熱帯アメリカ原産、一年草、帰化植物)53
-----【フウチョウソウ科 Capparaceae】-----
21260 フウチョウソウ(クレオメ)(*Cleome hassleriana*) (100、紅紫、熱帯アメリカ原産、南西諸島で野生化)77
-----【フウロソウ科 Geraniaceae】-----
21307 ゲラニウム ボヘミクス(*Geranium bohemicum*) (15-50、青、一年草ないし2年草)106
21317 チシマフウロ(*Geranium erianthum*)92
21318 シロバナノチシマフウロ(*Geranium erianthum* f. *leucanthum*) (15、白、チシマフウロの白花種)106
21322 タカネゲンナイフウロ(*Geranium eriostemon* var. *reinii* f. *onoei*) (30-50、青紫、本州中部、亜高山帯から高山帯)106
21345 ゲンノショウコ(赤)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*) (30-50、赤、北海道から沖縄)2,99
21345-2 ゲンノショウコ(白)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*) (30-50、白、北海道から沖縄)2
21350 ゲラニウム ファエウム(クロバナフウロ)(*Geranium phaeum*) (50-80、濃い紫、ヨーロッパ、ピレネー、肥沃で湿気た草地や草原) [少量]106
21376 ゲラニウム レグリー(*Geranium regelii*)106
21385 アケボノフウロ(ゲラニウム サンギネウム)(*Geranium sanguineum*) (20-50、桃、ヨーロッパ、トルコ、コーカサス原産)6
21411 アサマフウロ(*Geranium soboliferum*) (30-50、赤紫濃い、茎直立する)106
21443 オガフウロ(*Geranium yesoense* var. *pseudo-palustre* f. *intermedium*)105
-----【ブドウ科 Vitaceae】-----
21801 ヘンリーヅタ(*Parthenocissus henryana*) (落葉低木、ツル、中国原産)29
-----【ベンケイソウ科 Crassulaceae】-----
21950 ムラサキベンケイソウ(*Hylotelephium telephium*) (北海道) [濃い赤紫]103
21951 ツガルミセバヤ(*Hylotelephium tsugaruense*)103
21954 ウスリーミセバヤ(シダレミセバヤ)(*Hylotelephium ussuriense*) (10-15、白、) [韓国産、花穂は大、枝垂れる]103
21990-W (W)ツメレンゲ(*Orostachys erubescens japonicus*) [長野県] 8
-----【ホシクサ科 Eriocaulaceae】-----
22189 シラタマホシクサ(*Eriocaulon nudicuspe*) (15-40、白、一年草、静岡愛知三重、絶滅危惧Ⅱ類)34104
22193 クロホシクサ(*Eriocaulon parvum*) (10-20、黒藍、一年草、本州から九州、絶滅危惧Ⅱ類)104
-----【ボタン科 Paeoniaceae】-----
22234 ヤマシャクヤク(*Paeonia japonica*) (30-50、白、関東から九州)1,3,19,44,92,106
22234-3 ヤマシャクヤク(多重弁)(*Paeonia japonica*) (30-50、白、関東から九州)35
22235 ヤマシャクヤク(ピンク花)(*Paeonia japonica* pink fl.)29
22248 ベニバナヤマシャクヤク(*Paeonia obovata*) (40-50、赤 果皮を取って播種、2年目に発芽、絶滅危惧Ⅱ類)3,43,53,87
22248-2 ベニバナヤマシャクヤク(炎)(*Paeonia obovata*) (40-50、紅)16
22249 ベニバナヤマシャクヤク(白)(*Paeonia obovata* alba) (40-50、白)35
22260 ボタン(*Paeonia suffruticosa*) (赤)20
22260-2 ボタン(園芸種のセルフ1)(*Paeonia suffruticosa*) [ピンク]2
22260-4 ボタン(園芸種のセルフ、混合)(*Paeonia suffruticosa* mix)20
-----【マタタビ科 Actinidiaceae】-----

- 22290 サルナンシ(Actinidia arguta) (ツル、白、緑実、北海道から九州)32
 22290-W (W)サルナンシ(Actinidia arguta) (ツル、白、緑実、北海道から九州) [山形県]99
 -----【マツブサ科 Schisandraceae】-----
- 22320-W (W)サネカズラ (ピナンカズラ)(Kadsura japonica) (ツル、木本、常緑、赤実、関東以西) [山口県]53
 22330 チョウセンゴミシ(Schisandra chinensis) (落葉つる植物、淡黄白色、赤実、雌雄異株、本州北部から北海道)35
 -----【マツ科 Pinaceae】-----
- 22422 ピケア メヨリ(Picea meyeri) トウヒ属 20
 -----【マメ科 Fabaceae】-----
- 22475 ヤブマメ(Amphicarpaea bracteata subsp.edgeworthii var. japonica) (白、旗弁は紫、林の縁、日本全土)2
 22489 アンティリス アルピナ(Anthyllis alpina) (オレンジ) [アンティリス ブルネラリアのオレンジ花]3
 22494 アンティリス ブルネラリア(Anthyllis vulneraria) (小石混じりの乾燥した草原や岩場、牧草地などに生育する。) [北欧原産の黄花]3
- 22550 ゲンゲ白花(通称:レンゲ、レンゲソウ白花)(Astragalus sinicus white fl.) (25、白、播種は秋の彼岸ごろ(関東標準))7
- 22572 バプティシア レウコファエア(Baptisia leucophaea) (薄黄、クリームワイルドインディゴ)52
 22627-W (W)カワラケツメイ(Cassia mimosoides ssp. nomame) [20-50、黄] [山口県]53
 22640 ハナズオウ(ハナスオウ)(Cercis chinensis) (300、紅、中国原産)2,17
 22695 クリトリア(チョウマメ)(Clitoria ternatea) (ツル、青紫、熱帯性)2
 22722 タヌキマメ(Crotalaria sessiliflora) (40、青、一年草、本州から沖縄)5,36,53
 22780 フジカンゾウ(Desmodium oldhamii) (50-150、赤、本州から九州)53
 22801 ノアズキ(Dunbaria villosa) (ツル、黄、本州から九州、日当たり)2
 22821 ミヤマトベラ(Euchresta japonica) [50、愛知県産4代目、莢はできない]75
 22943 コマツナギ(Indigofera pseudotinctoria) (80-150、落葉小低木、赤)5
 22944 コマツナギ(白)(Indigofera pseudotinctoria white fl.) (80-150、落葉小低木、白)5
 23031-W (W)ヤマハギ(Lespedeza bicolor) (100-150、ピンク、北海道から九州) [愛知県]2
 23062 マキエハギ(Lespedeza virgata) (40-60、白、本州から沖縄)25,37
 23075 ミヤコグサ(Lotus corniculatus var. japonicus) (10、黄、北海道から南西諸島、元来は帰化植物)30,35,77
 23205 レブンソウ(白)(Oxytropis megalantha 'Alba') (15、白 [保湿種子]3
 23320 トキリマメ(Rhynchosia acuminatifolia) (ツル、黄、関西以西から九州、タンキリマメに比べて葉の下半分の幅が広い)5
 23322 タンキリマメ(Rhynchosia volubilis) (ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下半分の巾が狭い)5,55,88
 23322-W (W)タンキリマメ(Rhynchosia volubilis) (ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下半分の巾が狭い) [大阪府]34
- 23423 センダイハギ(Thermopsis lupinoides) (30-80、紫、海岸の砂地や草地、内陸低地の草原などに群
 23522 アカササゲ(Vigna vexillata var. tsusimensis) (ツル、薄紫、絶滅危惧種 I A類) [40-120]88
 -----【マンサク科 Hamamelidaceae】-----
- 23560 マンサク(Hamamelis japonica) (落葉小高木、黄、本州から九州)2
 -----【ミカン科 Rutaceae】-----
- 23590-W (W)マツカゼソウ(Boenninghausenia japonica) (40、白) [愛知県]2
 23660 ツルシキミ(Skimmia japonica var. intermedia f. repens)3
 23682 アサクラザンショウ(Zanthoxylum piperitum f. inerme) (サンショウより、実が大きく刺の少ない変種、雌雄異株)32
 -----【ミズキ科 Cornaceae】-----
- 23730 ヤマボウシ(Benthamidia japonica) (500-1000、落葉小高木、薄黄、本州から九州)2
 23741 エゾゴゼンタチバナ(Chamaepericlymenum suecicum) (5-20、白紫、大雪山、釧路根室)3
 23754 コルヌス マス(コーネリアンチェリー)(Cornus (Benthamidia) mas) (黄 果実は赤、)20
 -----【ミツバウツギ科 Staphyleaceae】-----
- 23860-W (W)ゴンズイ(Euscaphis japonica) [300] [大阪府]34
 -----【ムクロジ科 Sapindaceae】-----
- 24055 コハウチワカエデ(Acer sieboldianum) [乾燥種子]49
 24080 フウセンカズラ(Cardiospermum halicacabum) (ツル、白、一年草)2
 -----【ムラサキ科 Boraginaceae】-----
- 24232 ミヤマムラサキ(Eritrichium nipponicum) [保湿種子、淡青紫]3
 24271 ムラサキ(Lithospermum erythrorhizon) (40-70、白、北海道から九州、交雑種に注意、日本ムラサキは、花が白、大きさが1cmと大きい、根は全て赤い。絶滅危惧 I B類)78,85
 -----【メギ科 Berberidaceae】-----
- 24435-E ルイヨウボタン(Caulophyllum robustum) (40-70、薄黄、黒紫実) [青葉と散り斑から採種]3
 24435 ルイヨウボタン(Caulophyllum robustum) (40-70、薄黄、黒紫実)93
 24491 タツタソウ(Jeffersonia dubia) (朝鮮半島原産)3

- 24513-2 ハッカクレン(♀白花×♂赤花)(斑入り)(*Podophyllum pleianthum*) (10-20、白褐色) [母種どちらも斑入り、斑入り出現率、約30%]15
- 24513-3 ハッカクレン(♀赤花×♂白花)(斑入り)(*Podophyllum pleianthum*) [母種どちらも斑入り、斑入り出現率、約30%]15
- 24520 トガクシショウマ(*Ranzania japonica*) (30-60、赤紫、白実、本州中部、北部、多雪地帯) [乾燥種子]93
-----【モウセンゴケ科 *Droseraceae*】-----
- 24551 ナガバノモウセンゴケ(*Drosera anglica*) (5以下、白、尾瀬原産、絶滅危惧II類)100
- 24553 クルマバモウセンゴケ(*Drosera burmannii*) (5以下、白、南西諸島に原産とのこと、春にタネを播き、一年草として扱う。)100
- 24561 イシモチソウ(*Drosera peltata*) (10-30、白、酸性の湿地) [保湿種子]100
- 24563-W (W)モウセンゴケ(*Drosera rotundifolia*) [群馬県]89
-----【モクレン科 *Magnoliaceae*】-----
- 24695 オオヤマレンゲ(*Magnolia seiboldii* ssp. *japonica*) (200-500、落葉低木、白、関東から九州)26,35
- 24695-E オオヤマレンゲ(*Magnolia seiboldii* ssp. *japonica*) (200-500、落葉低木、白、関東から九州) [保湿種]
- 24696 シデコブシ(*Magnolia stellata*) [(ヒメコブシ)]35
-----【モチノキ科 *Aquifoliaceae*】-----
- 24766 ウメモドキ(*Ilex serrata*) [200-300、落葉低木、赤実] 2
- 24766-W (W)ウメモドキ(*Ilex serrata*) (200-300、落葉低木、赤実) [大阪府]34
-----【ヤマゴボウ科 *Phytolaccaceae*】-----
- 24991-1 ヤマゴボウ(斑入り)(*Phytolacca esculenta*)43
- 25000 ジュズサンゴ(*Rivina humilis*) (30、紅)41
-----【ヤマノイモ科 *Dioscoreaceae*】-----
- 25026-B4 ヤマノイモ(斑入葉)(ムカゴ)(矮性タイプ)(*Dioscorea japonica*)24
- 25026-W (W)ヤマノイモ(*Dioscorea japonica*) (ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州) [愛知県]2
- 25026-WB (W)ヤマノイモ(ムカゴ)(*Dioscorea japonica*) (ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州) [愛知県]2
-----【ユキノシタ科 *Saxifragaceae*】-----
- 25145 ヒトツバシヨウマ(*Astilbe simplicifolia*)10-30、白)56
- 25147 タンナチダケサシ(*Astilbe taquetii*) (20-30、白、朝鮮半島原産)106
- 25209 ネコノメソウ(*Chrysosplenium grayanum*) (5-20、淡黄、本州から北海道) [春の交換会から持ち越し]2
- 25261 ミテラ カウレンシセンス(*Mitella caulescens*) (50前後、淡い黄緑、北米西部原産、) [春の交換会から持ち越し]92
- 25264 チャルメルソウ(*Mitella furusei* var. *subramosa*) (20-40、紅紫、本州中部から九州、湿地) [春の交換会から持ち越し]2
- 25265 エゾノチャルメルソウ(*Mitella integripetala*) [20-30、茶]88
- 25266 オオチャルメルソウ(*Mitella japonica*) (20-50、赤紫、近畿四国九州) [春の交換会から持ち越し]88
- 25267 ツクシチャルメルソウ(*Mitella kiusiana*) (20-30、淡い黄緑、九州) [春の交換会から持ち越し]88
- 25272 タキミチャルメルソウ(*Mitella stylosa*) (20-30、紅紫、鈴鹿山脈) [春の交換会から持ち越し]88
- 25300 ヤワタソウ(*Peltoboykinia tellimoides*) (30、黄)32
- 25301 ワタナベソウ(*Peltoboykinia watanabei*) (30、黄緑、四国九州の深山、絶滅危惧II類)85106
- 25321 ヤグルマソウ(*Rodgersia podophylla*) (80-100、白、矢車に似た葉)2106
- 25374 ムカゴユキノシタ(*Saxifraga cernua*) [保湿種子、ムカゴで繁殖する]3
- 25388 サキシフラガ キンバラリア(*Saxifraga cymbalaria*) (黄、這性 1年草)5
- 25393-W (W)ダイモンジソウ(*Saxifraga fordunei* var. *incislobata*) (10、白、関東以西九州まで) [愛知県]2
- 25485 サキシフラガ ウンブローサ(紅花)(別名ナルサメソウ)(*Saxifraga umbrosa rosea*) (15-30、薄紅)39
- 25540 ティアレア コルディフォリア(洋種ズダヤクシュ)(*Tiarella cordifolia*) (赤、北米東部原産、湿り気の多い森の中) [春の交換会から持ち越し]92
- 25542 ズダヤクシュ(*Tiarella polyphylla*) (10-20、白、山地や亜高山の林床/林縁)44
- 25543 ズダヤクシュ(黄花)(*Tiarella* sp.)106
-----【ユリ科 *Liliaceae*】-----
- 25841 ウバユリ(*Cardiocrinum cordatum*) (100-150、淡青白、地植え向き。一回結実型多年草、日本固有種、宮城より九州)97
- 25841-1 ウバユリ(紅花選抜種)(*Cardiocrinum cordatum*)101
- 25841-2 ウバユリ(羅紗葉)(*Cardiocrinum cordatum*) [羅紗葉の出現率は不明]15
- 25861 ツバメオモト(*Clintonia udensis*) (30、白、瑠璃色実、北海道から近畿の山地、亜高山) [保湿種子]106
- 26047 バイモ(*Fritillaria verticillata* var. *thunbergii*) (30-80、薄黄)39
- 26213 ウケユリ(*Lilium alexandrae*) (絶滅危惧 I A類)95
- 26215-1 ヤマユリ(広葉、大花)(*Lilium auratum*) (100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿)49
- 26216 ヤマユリ(赤花)(*Lilium auratum* red fls.) (50、ピンク)95
- 26219 ヤマユリ(斑入)(*Lilium auratum* variegated leaf) (縞斑)95
- 26219-1 ヤマユリ(斑入×赤花)(*Lilium auratum* variegated leaf) (縞斑)95
- 26223 ノヒメユリ(スゲユリ)(*Lilium callosum*) (40、黄赤、絶滅危惧 I B類)23
- 26234 キバナノヒメユリ(*Lilium concolor* var. *flaviflorum*) (30-150、黄、長崎沖縄)103

- 26235 ヒメユリ(*Lilium concolor* var. *partheneion*) (40、緋色～橙赤、絶滅危惧 I B類)98
 26254-W (W)ササユリ(*Lilium japonicum*) (50-80、白～ピンク、日本固有種、中部から九州) [広島県]15
 26254-W1 (W)ササユリ(*Lilium japonicum*) (50-80、白～ピンク、日本固有種、中部から九州) [山形県]53
 26259-B オウゴンオニユリ(黄金鬼百合)(ムカゴ)(*Lilium lancifolium* var. *flaviflorum*) (オニユリの黄花変種。対馬特産)80
 26263 コオニユリ(*Lilium leichtlinii*) (80、橙)106
 26263-W (W)コオニユリ(*Lilium leichtlinii*) [長野県]87
 26270 スカシユリ(イワトユリ)(*Lilium maculatum*) (20-60、橙、紀伊、新潟以北の本州(太平洋側個体群))106
 26271 エゾスカシユリ(*Lilium maculatum* subsp. *dauricum*) (25-80、黄赤、北海道)81
 26273-W (W)ヤマスカシユリ(*Lilium maculatum* var. *monticola*) [山形県]49
 26275 リリウム マルタゴン(*Lilium martagon*) (赤紫、日当たりの良い草原や木漏れ日がさす林の下など)80
 26283 リリウム マルタゴン(白)(*Lilium martagon* 'alba')80
 26284-E クルマユリ(低山性)(*Lilium medeoloides*)80
 26299 イトハユリ(*Lilium pumilum*) (40、黄赤)23
 26305 ヒメサユリ(*Lilium rubellum*) (30-80、ピンク、山形福島新潟)30,92
 26305-W (W)ヒメサユリ(*Lilium rubellum*) (30-80、ピンク、山形福島新潟) [山形県]25
 26461 ノトスコルドム ボナリエンセ(*Nothoscordum bonariense*) [黄30
 26557-W (W)ホトトギス(*Tricyrtis hirta*) (30-50、白地に赤紫斑点、日本固有種、北海道から九州) [愛知県]2
 26563 シロホトトギス「白楽天」(*Tricyrtis hirta* var. *albescens* 'Hakurakuten') (白)97
 26565 ホトトギス(白)(*Tricyrtis hirta* white fl.) (50、白)106
 26571 キイジョウロウホトトギス(*Tricyrtis macranthopsis*) (40-80、黄、絶滅危惧 II 類)95
 26572-W (W)ヤマホトトギス(*Tricyrtis macropoda*) (30-50、白地に赤紫斑点、日本各地) [山口県]53
 26581 イワホトトギス(*Tricyrtis hirta* var. *saxicola*) (愛鷹山系)81
 -----【ラン科 Orchidaceae】-----
 26762 キバナショウハツキユウ(*Bletilla ochracea*) (薄い黄、中国南西部)17
 26764 シラン(*Bletilla striata*) (30-40、紫、最も丈夫な野生ランの一つ)2,37
 26764-1 シラン(三蝶咲き)(*Bletilla striata*)17
 26766 シラン(ピンク)(*Bletilla striata* pink fl.) [桃林]17
 27016 クマガイソウ(*Cypripedium japonicum*) (20-40、白赤紫、長期鉢栽培は難しい、北海道から九州、絶滅危惧 II 類)2
 27149 カキラン(*Epipactis thunbergii*) (20-30、黄、北海道本州、日当たりの良い湿地)56
 27260 ダイサギソウ(*Habenaria dentata*) (30-70(茎)、白、絶滅危惧 I B類)90
 27351-W (W)コ克蘭(*Liparis nervosa*) (15、黒紫、茨城以南四国九州) [愛知県]2
 27582-B サギソウ「玉竜花」(*Pecteilis radiata* 'Gyokuryuuka')80
 27671 ヤマトキソウ(*Pogonia minor*)100
 -----【リンドウ科 Gentianaceae】-----
 27930 コマチリンドウ(ケンタウリウム コンフェルトム)(*Centaurium chloodes*(*confertum*)) (5-10、ピンク、ヨーロッパ)3,14
 27970-W (W)トウヤクリンドウ(*Gentiana algida*) (10-30、薄黄、中部以北か北海道、高山帯) [山梨県] 98
 28005 ゲンチアナ ダフリカ(*Gentiana dahurica*)20
 28025 リシリリンドウ(*Gentiana jamesii*)3
 28077 リンドウ(*Gentiana scabra* var. *buergeri*) (20-100、青紫、本州から九州)106
 28112 エゾリンドウ(*Gentiana triflora* var. *japonica*)3
 28115 エゾオヤマリンドウ(*Gentiana triflora* var. *japonica* f. *montana*) (30-40、青紫、中部以北から北海道、亜高山)3
 28137 ヤクシマリンドウ(*Gentiana yakushimensis*) (10-20、青紫、屋久島、絶滅危惧 I B類、特定国内希少野生動植物) [少量]42,93
 28211 アケボノソウ(*Swertia bimaculata*) (40-50、白地に点、越年草、北海道から九州)53106
 28215-W (W)センブリ(*Swertia japonica*) (10-30、白、越年草、北海道から九州) [東京都]98
 28242 ツルリンドウ(*Tripterospermum japonicum*) (ツル、淡い紫、赤実、北海道から九州)106
 28242-W (W)ツルリンドウ(*Tripterospermum japonicum*) (ツル、淡い紫、赤実、北海道から九州) [山口県]53
 -----【レンブクソウ科 Adoxaceae】-----
 28283-1 ガマズミ(黒実)(*Viburnum dilatatum*)35
 28283-W (W)ガマズミ(*Viburnum dilatatum*) (200-300、落葉低木、白、赤実、北海道から九州) [山形県]49
 -----【ロウバイ科 Calycanthaceae】-----
 28340 クロバナロウバイ(*Calycanthus floridus* var. *glaucus*) (落葉低木、暗紫、北アメリカ東部原産)35
 28360 ナツロウバイ(*Synocalycanthus chinensis*) (落葉低木、白、浙江省原産)27