

第35回(2018-2019年度)種子リスト

番号	和名(特徴)(学名)(草丈cm、花色、原産地等)[提供者コメント][採種地] 提供者番号
-----【アオイ科】-----	
00001	トロロアオイ(<i>Abelmoschus manihot</i>)(150-、薄黄、温暖地では多年草)1
00025	カラスノゴマ(<i>Gorchoropsis tomentosa</i>)(40、黄、1年草)1
00035	ワタ(<i>Gossypium arboreum</i>)(70、)74
00053	ハマボウ(<i>Hibiscus hamabo</i>)(200-400、黄、木、実生4年で開花)39,54
-----【アカバナ科】-----	
00524	ヤナギラン(<i>Epilobium angustifolium</i>)(100、赤紫)62
00524-W	(W)ヤナギラン(<i>Epilobium angustifolium</i>)(本州以北北海道、山地亜高山帯、北半球に広く分布)[長野県]68
00549	アカバナ(<i>Epilobium pyrricholophum</i>)(15-90、紅紫、北海道から九州)15
00600-W	(W)チョウジタデ(<i>Ludwigia epilobioides</i>)(50、黄、日本全土、水田など湿地)[埼玉県]15
00612	メマツヨイグサ(<i>Oenothera biennis</i>)(2年草、北アメリカ原産、帰化植物)1
00623-2	オエノテラ ペレンニス(通称:ヒメツキミソウ)掃込斑(<i>Oenothera perennis</i>)(帰化植物)23
00624	アカバナユウゲシヨウ(通称ユウゲシヨウ)(<i>Oenothera rosea</i>)(20-40、ピンク、北アメリカからの帰化植物)1
00633	オエノテラ テトラプテラ(ツキミソウ)(<i>Oenothera tetraptera</i>)(20-60、白、江戸期渡来、繁殖力はそれほど強くない)3,15
-----【アケビ科】-----	
00652-W1	(W)アケビ(<i>Akebia quinata</i>)(ツル500以上、淡紫、自家不結実性)[山口県]54
-----【アジサイ科】-----	
00680-W	(W)クサアジサイ(<i>Cardiandra alternifolia</i>)(30、桃、本州(宮城県以南)、四国、九州)[愛知県]1
00732	コアジサイ(<i>Hydrangea hirta</i>)(50-150、淡青紫、日本固有種、関東以西四国九州、林縁など)40
00732-W	(W)コアジサイ(<i>Hydrangea hirta</i>)(50-150、淡青紫、日本固有種、関東以西四国九州、林縁など)[長野県]67
00740-1	アジサイ(園芸種)(<i>Hydrangea macrophylla</i>)[親株は、覆輪、空色]84
00770	キレンゲシヨウマ(<i>Kirengeshoma palmata</i>)(60-100、黄、紀伊、四国、九州の山地に分布、絶滅危惧Ⅱ類)5,4,85
00820-1	イワガラミ(散り斑)(<i>Schizophragma hydrangeoides</i>)(落葉ツル、白、山地の岩崖や林縁)12
-----【アブラナ科】-----	
00957	ハタザオ(<i>Arabis glabra</i> (NET))(50、白)1
00965	ミヤマハタザオ(<i>Arabis lyrata</i> ssp. <i>kamtschatica</i>)(10-30、白、北海道、本州(中部地方))[春の交換会から]62
00973	フジハタザオ(<i>Arabis serrata</i>)3,51
00974	エゾノイワハタザオ(<i>Arabis serrata</i> var. <i>glauca</i>)(10-40、白、北海道・本州(東北))41
00975	イワハタザオ(<i>Arabis serrata</i> var. <i>japonica</i>)(10-30、白、本州(東北、関東、中部)、山地)[春の交換会から]15
01026	ヤマガラシ(別名:ミヤマガラシ)(<i>Barbarea orthoceras</i>)(20-60、黄、本州中部以北から北海道)3
01130	ハリイヌナズナ(<i>Draba aizoides</i>)(5-10、黄、アルプス、ピレネー、アペニンに分布)23
01139	エゾイヌナズナ(シロバナイヌナズナ)(<i>Draba borealis</i>)(5-20、白、北海道、本州の中部地方)[春の交換会から]8
01180	キタダケナズナ(ハクホウナズナ)(<i>Draba kitadakensis</i>)(10-20、白、南アルプス、奥秩父、絶滅危惧ⅠB類)[春の交換会から]61
01180a	キタダケナズナ(ハクホウナズナ)(<i>Draba kitadakensis</i>)(10-20、白、南アルプス、奥秩父、絶滅危惧ⅠB類)8
01196	ドラバ オリゴスペルマ(<i>Draba oligosperma</i>)(5-10、黄、北米)23
01213	トガクシナズナ(<i>Draba sakurii</i>)(10、白、本州中部、絶滅危惧ⅠB類)15
01216	シロウマナズナ(<i>Draba shiroumana</i>)(10、白、中部地方の高山、亜高山、絶滅危惧ⅠB類)[春の交換会から]61

- 01216a シロウマナズナ(*Draba shiroumana*)(10、白、中部地方の高山、亜高山、絶滅危惧 I B類)76
01233 オクエゾナズナ(*Draba ussuriensis* f. *leiocarpa*)(6-12、白、北海道)[春の交換会から]8
01280 ワサビ(*Eutrema japonica*)[乾燥種子]48
01361 レピディウム ペルビアヌム(*Lepidium peruvianum*)(20まで、蕪の様な根をもつ、薬用「マカ」)20
01380 オオバンソウ→ゴウダソウ(大判草、ギンセンソウ)(*Lunaria annua*)(60-120、濃バラ、二年草)1,74
01381 オオバンソウ→ゴウダソウ(白花)(*Lunaria annua alba*)(60-120、白、二年草)1,74
01382 ルナリア アンヌア「アルバ バリエガタ」(*Lunaria annua* 'Alba Variegata')(斑入り、60-120、濃バラ、二年草)[白斑]20
01531-W (W)ゲンバイナズナ(*Thlaspi arvense*)[春の交換会から][長野県]67
-----【アヤメ科】-----
01695 クロクス ゴウリミー(*Crocus goulimyi*)(青色系の花、ギリシャ原産)[春の交換会から]85
01793 フリーシア ビリディス(*Freesia viridis*)(半耐寒性→アキダンテラ ビリディス(*Acidanthera viridis*))[春の交換会から]85
01794 フリーシア ムイリー(*Freesia x muiirii*)(白(黄スポット)、10-20、半耐寒性)[春の交換会から]85
01825-B グラジオラス カリアンツス(球根)(*Gladiolus callianthus*(*murielae*))(白(芯は紫)耐寒性はあまりない)[保存は5°C以上で、別名 *Acidanthera bicolor*]23
01910 ヒオウギ(*Iris (Belamcanda) chinensis*)(50-100、橙・赤点、耐寒性は比較的ある)4,28,51,85
01947 ノハナショウブ(*Iris ensata* var. *spontanea*)(60-90、紫、耐寒性あり、日本各地)15
01947-W (W)ノハナショウブ(*Iris ensata* var. *spontanea*)(60-90、紫、耐寒性あり、北海道～九州、水辺湿原)[新潟県]78
01949 イリス フォエティディッシマ(*Iris foetidissima*)(灰青、種子は緋色、独得の臭気)62
01952 ヒメシャガ(*Iris gracilipes*)(15-30、青、日本特産種、耐寒性)[保湿種子]85
01993 アヤメ(*Iris sanguinea*)(50、青紫)1,76
01995 ヒオウギアヤメ(*Iris setosa*)(30-90、青紫)85
01995-W (W)ヒオウギアヤメ(*Iris setosa*)(本州では高山の湿地、北海道では平地の湿地)[長野県]62
02023 イチハツ(*Iris tectorum*)(30-50、青紫、原産地は中国)1
02063 ヒメヒオウギ(旧アノマテカ ラクサ)(オレンジ)(*Lapeirousia laxa*)(40、オレンジ、南アフリカ原産)1,84
02314 トリトニア クロカタ(*Tritonia crocata*)(20-30、半耐寒性)[花の中心が透明]60
-----【イソマツ科】-----
02491 イソマツ(*Limonium wrightii*)(10、60(花茎)、淡い紅紫、伊豆小笠原南西諸島、絶滅危惧 II 類)21
-----【イヌサフラン科】-----
02584-W (W)チゴユリ(エダウチチゴユリ)(*Disporum smilacinum*)(10-30、白、日本各地、広葉樹林内)[山口県]54
-----【イネ科】-----
02762 ヒメアブラススキ(*Bothriochloa parviflora*)(80、丘陵地、草原、日本では関東以西、琉球、小笠原まで)6,49,63
02800 コバンソウ(*Briza maxima*)(30、黄緑、一年草、原産地はヨーロッパ、明治期に渡来)1
02960-W (W)ジュズダマ(*Coix lachryma-jobi*)[愛知県]1
03260-2 ウラハグサ(通称:フウチソウ)(黄金葉)(*Hakonechloa macra*)(40-70、日本固有種、神奈川から和歌山の太平洋岸)6
03553 ネズミガヤ(*Muhlenbergia japonica*)(20-40、北海道から九州、低地)8,63
03643 アオチカラシバ(*Pennisetum alopecuroides* f. *viridescens*)(50、チカラシバの素心)15
03651 ギンギツネ(*Pennisetum villosum*)(花穂は狐の尻尾に似る、アフリカ原産)22
03854 キンエノコロ(*Setaria glauca*)(一年草、)6
-----【イラクサ科】-----
04021 ラセイタソウ(*Boehmeria biloba*)[春の交換会から]63
-----【イワタバコ科】-----
04235-B アキメネス(園芸種)(別名:ハナギリソウ)(*Achimenes* sp.)(15-25、紫、耐寒性はあまりない)85
04270-W (W)イワタバコ(*Conandron ramondioides*)(15-30、青紫、本州(福島以南)、四国、九州)[愛知県]1

- 04370 マツムラソウ(*Titanotrichum oldhamii*)(絶滅危惧 I A類)74
 -----【ウコギ科】-----
- 04495 トチバニンジン(*Panax japonicus*)(50-80、赤実、北海道から九州)[乾燥種子]29
 -----【ウマノスズクサ科】-----
- 04512 ウマノスズクサ(*Aristolochia debilis*)(ツル植物、多年草)14
 -----【ウリ科】-----
- 04822-W1 (W)カラスウリ(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[山口県]54
 04822-W2 (W)カラスウリ(実が丸形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛知県]1
 04822-W3 (W)カラスウリ(実は俵形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛知県]1
- 04766 プチキュウリ(*Cucumis sativus*)(果実は鑑賞、食用、3-4cm)54
 -----【ウルシ科】-----
- 04855-W (W)ハゼノキ(別名リュウキュウハゼ)(*Rhus succedanea*)(落葉小低木)[山口県]54
 04856-W (W)ヤマハゼ(*Rhus sylvestris*)(500-800、落葉小高木、関東以西から沖縄)[山口県]54
 -----【オオバコ科】-----
- 04932 矮性黄花ジギタリス「カリヨン」(*Digitalis grandiflora* 'Carillion')(20-40、黄白)85
 04938 ジギタリス プルプレア(*Digitalis purpurea*)[赤花]23
 04939 ジギタリス プルプレア(白)(*Digitalis purpurea* f. *albiflora*)(30-60、ほぼ白)23
 04950 イワカラクサ(*Erinus alpinus*)(5-20、赤紫、ヨーロッパ原産)[春の交換会から]61
 05085 イワブクロ(*Penstemon frutescens*)(10、薄紫、高山(火山系)に分布)17
 05104 ペンステモン ハリー(*Penstemon hallii*)(高山の日当たりのよい稜線の岩礫地、ロッキー山脈の高山帯)20
 05113 ペンステモン ヒルスツス ピグメウス(*Penstemon hirsutus* var. *pygmaeus*)(多花性、育てやすい)[別名:ヒメイワブクロ]10
 05249 サンイントラノオ(*Veronica (Pseudolysimachion) ogurae*)(15-30、青、絶滅危惧 II 類、島根県)72
 05250 トウテイラン(*Veronica (Pseudolysimachion) ornatum*)(40-50、青紫、鳥取兵庫京都の海岸べり、絶滅危惧 II 類)33,85
 05251 トウテイラン(白花)(*Veronica (Pseudolysimachion) ornatum white fl.*)(40-50、白、絶滅危惧 II 類)85
 05252 ヤマトラノオ(*Veronica (Pseudolysimachion) rotundum*)(40-90、青紫、本州から九州北部)85
 05255 キクバクワガタ(*Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum*)(5-20、紫、北海道、千島)37,45
 05259 バンダイクワガタ(*Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum* ssp. *senanense* f. *bandaiana*)(15-25、薄い紫)85
 05260 ダイセンクワガタ(*Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum* ssp. *senanense* f. *daisenense*)(10、青)23
 05268 ハマトラノオ(*Veronica (Pseudolysimachion) sieboldianum*)(20-40、青、鹿児島、沖縄、絶滅危惧 II 類)50,74,81
 05356 クガイソウ(*Veronicastrum sibiricum* ssp. *japonicum*)(50、紫、本州、日当たりのよい草地や林の縁)25
 -----【オシロイバナ科】-----
- 05425-1 オシロイバナ(赤)(*Mirabilis jalapa*)(20-60、赤)1
 -----【オトギリソウ科】-----
- 05433 トモエソウ(*Hypericum ascyron*)(50-130、黄、北海道から九州、日当たりの良い草地)51,85
 05445 オトギリソウ(*Hypericum erectum*)(40、黄、北海道から九州、草地)1
 05457 ヒメオトギリ(*Hypericum japonicum*)(15-40、黄、1年草、北海道から九州)15
 05480 サワオトギリ(サワオトギリソウ)(*Hypericum pseudopetiolatum*)(20ぐらい、黄、径1、山地の湿り気のある林下)62
 05489 ツキヌキオトギリ(*Hypericum sampsoni*)(30-40、黄、絶滅危惧 I B類)36
 -----【オミナエシ科】-----

05509 オミナエシ(*Patrinia scabiosifolia*)(60-100、黄、日当たりの良い山地、北海道から九州)1,82,85
05517-W (W)オトコエシ(*Patrinia villosa*)(50-100、白、北海道から九州、日当たりの良い草地等、)[山口県]54

-----【オモダカ科】-----

05535 マルバオモダカ(*Caldesia parnassiifolia*)(絶滅危惧Ⅱ類)[乾燥種子]51

-----【カタバミ科】-----

05588-B オキザリス テトラフィラ(球根)(*Oxalis tetraphylla*)(耐寒性はあまりない。)[5°C以上で保管のこと]23

-----【カバノキ科】-----

05646 一寸クマシデ(流通名、別名一寸カナシデ)(*Carpinus* sp.)79

-----【カヤツリグサ科】-----

05680-W (W)ハタガヤ(*Bulbostylis barbata*)(5-20、日当たりの良い砂地など、本州から九州)[山口県]54
05725 ジョウロウスゲ(*Carex capricornis*)(30-60、北海道、本州(関東以北)絶滅危惧Ⅱ類)37
05781 イガグリズゲ(*Carex grayi*)(湿生植物、北アメリカ東部原産)54
05817 ナキリスゲ(*Carex lenta*)(-50、関東新潟以西の本州、四国、九州)74
05886 テンジクスゲ(斑入り)(*Carex phyllocephala*)(30-50、常緑多年草、中国原産、一部野生化)14,46
05981 オウゴンスゲ(カレックス アウレア)(*Carex aurea*)(北米の牧草地など)23
05983 ヒトモトススキ(*Cladium jamaicense* subsp. *chinense*)(100-200、関東新潟以西~九州、日本原産)34

-----【キキョウ科】-----

06257 ヒメシャジン(*Adenophora nikoensis*)(10-40、青、東北地方南部から中部地方)85
06270 ヤチシャジン(*Adenophora palustris*)(50、淡紫、明るい湿地(絶滅危惧ⅠA類))5,19
06274 モイワシャジン(*Adenophora pereskiaefolia* var. *moiwana*)(40-90、薄い青、北海道本州北部)62,85
06276 シラトリシャジン(ウリュウシャジン)(*Adenophora pereskiaefolia* var. *uryuensis*) (25、青、北海道雨竜山(蛇紋岩地帯)、絶滅危惧Ⅱ類)23
06281 オトメシャジン(*Adenophora puellaris*)(20-60、青、四国(東赤石山)蛇紋岩地帯)[交換会から入手]21
06287 イワシャジン(*Adenophora takedae*)(30-60、青)5,23,79,82
06287-E イワシャジン(富士山麓由来)(*Adenophora takedae*)(30-60、青)[暖地で実生からの種子]4
06288 ホウオウシャジン(*Adenophora takedae* var. *howozana*)(10-20、青、絶滅危惧ⅠB類)23,62
06290 イワシャジン(白)(*Adenophora takedae* white fl.)(3-50、白)5,23,62
06290-2 イワシャジン(白、立性)(*Adenophora takedae* white fl.)(白)85
06293 シマシャジン(*Adenophora tashiroi*)(10-30、青、長崎県 平戸五島産、絶滅危惧ⅠB類)[平戸島由来]36
06303 ツリガネニンジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica*)(50-100、青)4,19,30,68
06303-W (W)ツリガネニンジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica*)(50-100、青、北海道から九州、山野や土手)[愛知県]1
06303-W1 (W)ツリガネニンジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica*)(50-100、青、北海道から九州、山野や土手)[大阪府]37
06305 シラゲシャジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica* f. *canescens*)(40-90、青、全体に白毛が密生)62,85
06306-W (W)ナガバシャジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica* f. *lancifolia*)(サイヨウシャジンより小型オトメシャジンより大型)[徳島県]52
06489 ホタルブクロ(白)(*Campanula punctata* f. *albiflora*)(-80、白)1
06492 ヤマホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *hondoensis*)(20-60、薄紫、ホタルブクロの変種、ホタルブクロと違って萼と萼の間に付属片がついていない)1
06492-W (W)ヤマホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *hondoensis*)(日本固有種、東北地方南部から近畿地方東部、土手などに多い)[長野県]19
06495-1 ハチジョウホタルブクロ(流通名?)(*Campanula punctata* var. *microdonta* ?)(10-30、白)4
06503 ハタザオギキョウ(カンパヌラ ラプンクロイデス)(*Campanula rapunculoides*)(50-120、青、ヨーロッパ原産)4,76,85

- 06542 カンパヌラ タケシマナ アルバ(Campanula takesimana alba)23,77
 06601 ツルニンジン(Codonopsis lanceolata)(ツル性、青、別名ジイソブ、根は滋養強壮とヘルニア特効薬)5
 06601-3 ツルニンジン(素心)(Codonopsis lanceolata)71
 06601-W (W)ツルニンジン(Codonopsis lanceolata)(ツル性、青、別名ジイソブ、根は滋養強壮とヘルニア特効薬北海道から九州、平地や山地の林の中や縁)[長野県]67
 06694 ヤシオネ ラエビス(Jasione laevis(=Jasione perennis))(20-30、青紫、山地、ヨーロッパアルプス)85
 06719 サワギキョウ(Lobelia sessilifolia)(40-80、濃青紫、平地や山地の湿地)5,23,35
 06719-2 サワギキョウ(斑入り)(Lobelia sessilifolia)43
 06719-W (W)サワギキョウ(Lobelia sessilifolia)(40-80、濃青紫、日本各地、湿地)[長野県]67
 06780 キキョウ(Platycodon grandiflorum)(30-60、青)1,37,82
 06781 アポイギキョウ(アポイ岳系、紫、)(Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou')(20、青紫)5,35,61,85
 06781-5 アポイギキョウ(アポイ岳系、白)(Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou white fls.')(20、白)69
 06781-7 アポイギキョウ(アポイ岳系、白、八重)(Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou white fls. doble')(20、白)80
 06783 キキョウ(渦葉)(Platycodon grandiflorum contracted)(青)36
 06787 キキョウ(矮性種)(Platycodon grandiflorum nana)(30-60、青)1
 06789 キキョウ(白)(Platycodon grandiflorum white)(30-60、白)41
 06790 キキョウ(絞り咲き)(Platycodon grandiflorum white & blue)(30-60、青・白)16
 06790-1 キキョウ(絞り咲き)(矮性タイプ)(Platycodon grandiflorum white & blue)(30-60、青・白)16
 06790 キキョウ(絞り咲き)(Platycodon grandiflorum white & blue)(30-60、青・白)45
 06793 キキョウ「セミプレナム」(Platycodon grandiflorum 'Semiplenum')20

-----【キク科】-----

- 06914-W (W)キッコウハグマ(Ainsliaea apiculata)[茨城県]71
 07186 オケラ(Atractylodes japonica)(70、白、若菜は山菜になる。本州から九州)35,41,85
 07294 モミジガサ(Cacalia celphiniifolia)(60-80、白色の頭花、山地の林床/林縁)82
 07294-1 モミジガサ(斑入り)(Cacalia celphiniifolia)(60-80、白色の頭花、山地の林床/林縁)[種子交換会注:シイナ多い]82
 07299 ヨブスマソウ(Cacalia hastata ssp. orientalis)(100-250、大きくなる、関東以北、北海道)82
 07321 カレンドウラ オフィシナンス「ギタナオレンジ」(Calendula officinalis 'Gitana orange')(キンセンカの園芸品種、30、オレンジ)20
 07596 ノハラアザミ(Cirsium oligophyllum)51
 07604 フジアザミ(Cirsium purpuratum)(80-200、赤紫、日本固有種、山中のガレ地や河原)[少量]48
 07630 サワアザミ(Cirsium yezoense)(80-200、赤紫、日本海側の地域に分布)[山形県由来]51
 07842 ヒゴタイ(タマアザミ)(Echinops setifer)(70-100、青、西日本、九州、朝鮮半島南部、絶滅危惧Ⅱ類)5
 07861 ベニニガナ(Emilia sagittata)(30-60、赤、1年草、本州、四国、九州～沖縄)74
 07862 ウスベニニガナ(Emilia sonchifolia)(30、ピンク)65
 07914-E1 ミヤマノギク(オオヒラアズマギク)(Erigeron miyabeanus)(ミヤマノギクの大平山変異種、白花)75
 07930 キリギシアズマギク(Erigeron thunbergii var. glabratus f. kirigishiensis)75
 07932 エリゲロン トリフィーダス(Erigeron trifidus)23
 07938 ユウバリアズマギク(Erigeron thunbergii subsp. glabratus f. haruoi)(夕張岳、蛇紋岩岩地)23
 07952 ヒヨドリバナ(Eupatorium chinense var. oppositifolium)(100-200、日本各地)1
 07958 サワヒヨドリ(Eupatorium lindleyanum)(40-90、ピンク-白)40
 08150 チシマタンポポ(通称)(ヒエラキウム アルピヌム)(Hieracium alpinum)(10-20、黄、アルプス、ヨーロッパ)43,74
 08159 ウズラバタンポポ(Hieracium maebulatum)(20、黄、紫褐色の斑入り葉)[春の交換会から]1
 08164 ヤナギタンポポ(Hieracium umbellatum)(30-120、黄、北海道本州四国、山地のやや湿気た所)18,63
 08164a ヤナギタンポポ(Hieracium umbellatum)(30-120、黄、北海道本州四国、山地のやや湿気た所)63
 08221 エゾコウゾリナ(Hypochaeris crepidioides)(絶滅危惧ⅠB類)[アポイ岳特産]23
 08242 オゼミズギク(Inula ciliaris var. glandulosa)[種子交換会注:完熟種子は少ない]45

- 08360 センボンヤリ(*Leibnitzia anandria*)(9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花、北海道、本州、東アジア)18,22,74
- 08360-E センボンヤリ(済州島産)(*Leibnitzia anandria*)(20、白)25
- 08360-W (W)センボンヤリ(*Leibnitzia anandria*)(9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花、北海道、本州、東アジア)[群馬県]71
- 08360-W1 (W)センボンヤリ(*Leibnitzia anandria*)(9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花、北海道、本州、東アジア)[山形県]51
- 08389 エゾウスユキソウ(レブンウスユキソウ)(*Leontopodium discolor*)(15、北海道からサハリン、絶滅危惧 I B類)23
- 08394 ハヤチネウスユキソウ(*Leontopodium hayachinense*)(10-20、蛇紋岩地帯、絶滅危惧 I B類)85
- 08423 ヒロハウスユキソウ(*Leontopodium japonicum* f. *orogenes*)23
- 08644-W (W)コウヤボウキ(*Pertya scandens*)(60-100、白~淡い赤、木本、関東以西四国九州)[大阪府]37
- 08644-W1 (W)コウヤボウキ(*Pertya scandens*)(60-100、白~淡い赤、木本、関東以西四国九州)[山口県]54
- 08892 コウリンカ(*Senecio flammeus* var. *glabrifolius*)(40-60、橙、福島から広島、絶滅危惧 II 類)15
- 08901 ミヤマオグルマ(*Senecio kawakamii*)(15-30、黄、高山の砂礫地、草原)8
- 08921 タムラソウ(*Serratula coronata* ssp. *insularis*)(60以上、赤紫)44
- 08952 イッスンキンカ(俗称屋久島イッスンキンカ)(*Solidago minutissima*)(3-5、屋久島)23
- 09032 ヤブレガサ(*Syneilesis palmata*)(50、白、本州から九州)5
- 09041 キクバヤマボクチ(*Synurus palmatopinnatifidus*)62
- 09043 オヤマボクチ(*Synurus pungens*)(25、紫)15
- 09043-1 オヤマボクチ(バラ斑)(*Synurus pungens* variegatum)23
- 09060 シロバナタンポポ(*Taraxacum albidum*)(30ぐらい、他のタンポポより舌状花が少なく白色、単為生殖可能)32
- 09088 タラクサクム ルブリフォリウム(*Taraxacum rubrifolium*)(15、黄、銅葉のタンポポ、フェロー諸島)[春の交換会から]63
- 09220 ムラサキムカシヨモギ(*Vernonia cinerea*)[別名ヤンバルヒゴタイ]72
- 【キジカクシ科】-----
- 09283 アルブカ フミリス(*Albuca humilis*)(10、白(中央部黄)、半耐寒性、球根)60
- 09294 アルブカ ソメリセチアナム(*Albuca somersetianum*)(20-30、黄、)84
- 09313 コマチユリ(*Arthropodium candidum* var. *maculatum*)(半耐寒性)22
- 09377 スズラン(ピンク花)(*Convallaria majalis* pink fl.)(25、ピンク)[乾燥種子]27
- 09400-W1 (W)スタレギボウシ(*Hosta kikutii* var. *polyneuron*)(30-60、白、淡い青、高知県和歌山県)[高知県]36
- 09412 イワギボウシ(*Hosta longipes* var. *longipes*)(20、薄紫、中型種、東北から九州)5
- 09416-W (W)ミズギボウシ(*Hosta longissima* var. *brevifolia*)[宮城県]13
- 09417 ミズギボウシ(斑入り葉)(*Hosta longissima* var. *brevifolia* f. *variegata*)[種子交換会注:斑入り葉が出現する確率は少ない]82
- 09422 セトウチギボウシ(*Hosta pycnophylla*)(絶滅危惧 I B類)36
- 09428-W (W)オオバギボウシ(*Hosta sieboldiana*)(100以上、白)[愛知県]1
- 09441 コバギボウシ(*Hosta sieboldii* f. *lancifolia*)(30-50、薄紫)50,85
- 09449 タチギボウシ(ニシキギギボウシ)(*Hosta sieboldii* var. *rectifolia*)(60-100(茎)、薄青紫)85
- 09470 ギボウシ(広葉、斑入り、属小名不明)(*Hosta* sp.)[種子交換会注:斑入り葉が出現する確率は少ない]82
- 09493 ポリキセナ エンシフォリア(*Lachenalia (Polyxena) ensifolia*)(多肉質葉の間に白花、南ア)[春の交換会から]9
- 09507 ラケナリア プシラ(*Lachenalia (Polyxena) pusilla*)(5、白、ロゼット状の葉の間に咲く。)[春の交換会から]85
- 09512 ラケナリア ビリディフロラ(*Lachenalia (Polyxena) viridiflora*)(20、青緑)84
- 09521-W (W)ヤブラン(*Liriope muscari*)(40、淡紫、日本各地)[愛知県]1
- 09521 ヤブラン(*Liriope muscari*)(40、淡紫、日本各地)1,54
- 09554 マッソニア プスツラタ(*Massonia pustulata*)(10、白、5枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒性、夏休眠する)24

- 09596 ノシラン“キスジノシラン”(Ophiopogon jaburan 'Kisuji-nosiran')(20-40、白、青実、黄覆輪縹斑)54
 09600-W (W)ナガバジャノヒゲ(Ophiopogon japonicus var. umbrosus)(30-40葉、白、林床、北海道から九州)[山口県]54
 09674 シラー ヒスパニカ(Scilla hispanica)(→Endymion hispanica)25
 09692 ツルボ(Scilla scilloides)(20-30、桃)1,30,39
 09692-W (W)ツルボ(Scilla scilloides)(20-30、桃、北海道から沖縄)[大阪府]16
 09693 ツルボ(矮性種)(Scilla scilloides dwarf type)(15、桃)21,74,84
 09694 シロバナツルボ(Scilla scilloides f. albiflora)(30-40、白)16,21,38
 09696 オニツルボ(Scilla scilloides var. major)(20-40(花茎)、淡紅紫、全国各地の海岸)81

-----【キツネノマゴ科】-----

- 09748 スズムシバナ(Strobilanthes oligantha)(30-60、青紫、山地の林下の陰地)63
 09749 スズムシバナ(白)(Strobilanthes oligantha f. albiflora)(30-60、白、山地の林下の陰地)63

-----【キョウチクトウ科】-----

- 09770 チョウジソウ(Amsonia elliptica)(30-50、青紫)2,4,5,14,26,31,35
 09781 ロクオンソウ(ヒゴビヤクゼン)(Cynanchum amplexicaule)(-90、薄い黄、絶滅危惧Ⅱ類)6
 09794-W (W)イヨカズラ(Cynanchum japonicum)(30-60、白、日本台湾朝鮮中国)[長崎県]21
 09798 クサナギオゴケ(Cynanchum katoi)(-100、赤紫、千葉以西四国九州、日本固有種、絶滅危惧種Ⅱ類)6,14,21,46,81
 09798-2 クサナギオゴケ(淡黄)(Cynanchum katoi)46
 09812 スズサイコ(Cynanchum paniculatum)(100、直立する、緑、茶)6
 09868 ヒメヨカズラ(Tylophora matsumurae)(10、黄緑 小さな花)21
 09885 ビンケトキシクム ニグルム(Vincetoxicum nigrum)(50-100、暗茶青)25,62

-----【キンポウゲ科】-----

- 09932 トリカブト(Aconitum carmichaelii)(100、赤紫)48,62,84
 09962 レイジンソウ(Aconitum loczyanum)(50、白)85
 09987 リシリブシ(Aconitum sachalinense var. compactum)(15、青)23
 10003 エゾトリカブト(Aconitum yesoense)(60-150、青紫、北海道)44
 10004 エゾノホソバトリカブト(Aconitum yuparense)62
 10015 サラシナショウマ(銅葉ブルネット)(Actaea (Cimicifuga) ramosa 'Brunette')(60-150、白)85
 10017-W (W)サラシナショウマ(Actaea (Cimicifuga) simplex)(40-150、白、北海道から九州)[長野県]67
 10017-W1 (W)サラシナショウマ(Actaea (Cimicifuga) simplex)(40-150、白、北海道から九州)[長野県2]62
 10072 オキナグサ(Anemone (Pulsatilla) cernua)(30-50、暗赤紫)[春の交換会から]5,62,67
 10072a オキナグサ(Anemone (Pulsatilla) cernua)(30-50、暗赤紫)11,13
 10073 キバナオキナグサ(Anemone (Pulsatilla) cernua var. flaba)(30-50、薄い黄)25
 10076 マンシュウオキナグサ(Anemone (Pulsatilla) dahurica)(25-40、明るい藤色、東アジア、シベリア)62
 10117 セイヨウオキナグサ(プルサチラ ブルガリス)(白)(Anemone (Pulsatilla) vulgaris 'Alba')23
 10160 アネモネ アルタイカ(Anemone altaica)(30-50、グリーン系)10
 10164 アネモネ バイカレンシス(Anemone baicalensis)85
 10222 アネモネ オブツシロバ(Anemone obtusiloba)(岩場、低木林)23
 10238 アネモネ ルピコラ(Anemone rupicola)(10、白-淡黄)10
 10272 白花バイカカラマツ(Anemonella thalictroides 'Alba')[青軸]23
 10280 レンゲショウマ(Anemonopsis macrophylla)(40-60、白、僅かに桃)5,62,67,85
 10280-1 レンゲショウマ(青軸)(Anemonopsis macrophylla)(40-60、白?、)43,75
 10280-3 レンゲショウマ(泥軸、白花)(Anemonopsis macrophylla)(40-60、白、茶褐色の茎)62
 10280-6 レンゲショウマ(八重咲き)(Anemonopsis macrophylla)(40-60、白、僅かに桃、ほぼ二重)43,85
 10304 ヤマオダマキ(Aquilegia buergeriana)(30-50、海老茶・黄)4,14,31,74
 10304-W (W)ヤマオダマキ(Aquilegia buergeriana)(30-50、海老茶・黄、北海道から九州、草地、林縁)[長野県]19
 10305 ヤマオダマキ「カリメロ」(Aquilegia buergeriana 'Calimero')(ヤマオダマキの園芸品種。萼片の紫褐色が濃く、花卉の黄色が鮮やか)23
 10307 キバナヤマオダマキ(Aquilegia buergeriana f. flavescens)(25、黄)[春の交換会から]63
 10307a キバナヤマオダマキ(Aquilegia buergeriana f. flavescens)(25、黄)5,15,25,37

- 10307-W (W)キバナノヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* f. *flavescens*)[長野県]66
- 10309 オオヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* var. *oxysepala*)(50、紫褐と黄、日当たりのよい道端、林縁、草原などにはえる)[春の交換会から]15
- 10309a オオヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* var. *oxysepala*)(50、紫褐と黄、日当たりのよい道端、林縁、草原などにはえる)[佐渡由来]83
- 10318 カナダオダマキ(*Aquilegia canadensis*)(20-40、赤や黄)4,31,63
- 10342 アクイレギア エカルカラタ(フウリンオダマキ)(*Aquilegia ecalcarata*)(20-30、白薄い紫、中国、1800-3500m)43
- 10348 オダマキ(*Aquilegia flabellata*)[春の交換会から、40、青紫に白の舌]1
- 10357 オダマキ(ピンク)(園芸種?)(*Aquilegia flabellata* 'pink')(25-40、ピンク)28
- 10358 オダマキ(紫)(園芸種?)(*Aquilegia flabellata* 'purple')(25-40、)26,28
- 10359 ミヤマオダマキ(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(10-20、紫)4,27,31,48
- 10360 ミヤマオダマキ(矮性)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* dwarf type)(5、紫)27
- 10368 ミヤマオダマキ(白)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* white fl.)[春の交換会から]8
- 10368a ミヤマオダマキ(白)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* white fl.)31
- 10382 アクイレギア グランディフローラ(交配種?)(*Aquilegia grandiflora*)(萼+白、花大)25
- 10449 クロバナオダマキ(*Aquilegia viridiflora*)(30、暗黒紫)[春の交換会から]8
- 10449a クロバナオダマキ(*Aquilegia viridiflora*)(30、暗黒紫)46
- 10452 アクイレギア ブルガリス(*Aquilegia vulgaris*)25
- 10454 アクイレギア ブルガリス アルバ(*Aquilegia vulgaris* alba)28
- 10460 アクイレギア ブルガリス 八重(*Aquilegia vulgaris* double purple)28
- 10463 アクイレギア ブルガリス「グリーン アップルズ」(*Aquilegia vulgaris* 'Green Apples')(咲き始めグリーンから白、八重咲き種)25
- 10493 ヒダカソウ(*Callianthemum miyabeanum*)(10-15、白、北海道アポイ岳固有、絶滅危惧IA類)[小葉タイプ]75
- 10495 カリアンテマム(赤花種)(*Callianthemum* sp.)75
- 10516 ミヤマハンショウヅル(*Clematis alpina* ssp. *ochotensis* var. *fujijamana*)(つる性低木、紅紫、北海道から九州、山地から亜高山)17
- 10541 クレマチス ヘラクレイフォリア(*Clematis heracleifolia*)(50-100、青、中国北部、朝鮮半島)85
- 10584 カザグルマ(*Clematis patens*)(ツル性、薄い紫、秋田から九州)5,32,62,67,85
- 10607 センニンソウ(*Clematis terniflora*)(ツル、白)1
- 10607-W (W)センニンソウ(*Clematis terniflora*)(ツル、白)[埼玉県]78
- 10612 シロハンショウヅル(*Clematis tosaensis* f. *cremea*)[純白]81
- 10630 バイカオウレン(*Coptis quinquecolia*)(15、白)[春の交換会から]62
- 10727 ツルシロカネソウ(シロカネソウ)(*Dichocarpum stoloniferum*)(10-20、白)23
- 10742 エランティス ヒエマリス(別名セイヨウセツブンソウ)(*Eranthis hyemalis*)(5-15、黄、半日陰の林や森の中、石灰質の草地)4
- 10750 シラネアオイ(*Glaucidium palmatum*)(40、淡赤紫)5,13,23,43,44,62,82,85
- 10750-1 シラネアオイ(濃紫)(*Glaucidium palmatum*)(40、赤紫)[濃色系]13
- 10750-W (W)シラネアオイ(*Glaucidium palmatum*)[自然交配][新潟県]78
- 10751 シラネアオイ(白)(*Glaucidium palmatum* var. *leucanthum*)(40、白)13,43,82
- 10751-W (W)シラネアオイ(白)(*Glaucidium palmatum* var. *leucanthum*)[自然交配][新潟県]78
- 10796 ヘレボルス交配種、混合(*Helleborus hybrid mix colors*)20
- 10796-1 ヘレボルス交配種、ピンク(*Helleborus hybrid pink*)20
- 10811 ヘレボルス ニゲル(*Helleborus niger*)(15、白、淡桃)[春の交換会から]85
- 10842-1 クリスマスローズ(通称)(ダブル咲)(*Helleborus* sp.)[春の交換会から]4
- 10842-3 クリスマスローズ(通称)(黒花系)(*Helleborus* sp.)(30、)[春の交換会から、親株はルーセブラック、スポットなし]4
- 10842-6 クリスマスローズ(通称)(ピコ)(*Helleborus* sp.)[春の交換会から、親株は白色の花弁の縁にえんじ~ピンクの覆輪]4
- 10895 アコウキンポウゲ(流通名?)(*Ranunculus acris* var. *borealis*)(20-30、黄、樺太原産)[春の交換会から]8
- 10896 ミヤマキンポウゲ(*Ranunculus acris* var. *nipponicus*)(10-50、黄、高山の草地)2,15
- 10911 ラヌンクルス クレナタス(*Ranunculus crenatus*)23
- 10927 ラヌンクルス グラミネウス(イトハキンポウゲ)(*Ranunculus gramineus*)(20、黄、欧州)25

- 10995 ヒメウス(*Semiaquilegia adoxoides*)(10-30、白、関東から沖縄、林の中、道端)[春の交換会から]1
- 10995a ヒメウス(*Semiaquilegia adoxoides*)(10-30、白、関東から沖縄、林の中、道端)76
- 11014 カラマツソウ(*Thalictrum aquilegifolium* var. *intermedium*)21
- 11015-W (W)マンセンカラマツ(*Thalictrum aquilegifolium* var. *sibiricum*)(絶滅危惧 I B類)[200][長野県]66
- 11017 ハルカラマツ(*Thalictrum baicalense*)62
- 11020 コハスバカラマツ(*Thalictrum coreanum* var. *minor*)(朝鮮半島)74
- 11023 タリクトルム デラバイ(ヘンシカラマツソウ)(*Thalictrum delavayi*)(60-120、ピンク、草原、傾斜面、岩場、灌木の間、明るい林床)85
- 11039 タリクトルム フォエチヅム グラブレスケンス(チャボカラマツ)(*Thalictrum foetidum* var. *glabrescens*)(20-40、紫を帯びた萼片、石灰岩植物、北海道岩手、絶滅危惧 II 類)23
- 11041-2 タイカカラマツ(通称)(白)(*Thalictrum grandiflorum*)72
- 11041-3 タイカカラマツ(通称)(甲竜)(*Thalictrum grandiflorum*)(変異個体)72
- 11082 タリクトルム プベスケンス(*Thalictrum pubescens*)白4
- 11065 シキンカラマツ(*Thalictrum rochebrunianum*)(60、淡桃、長野、群馬、福島)1,25
- 11067 タリクトルム サカリネンセ(エゾカラマツ)(*Thalictrum sachalinense*)(一般に低地の日陰の陰地、湿り気のある草地)22
- 11069 イワカラマツ(*Thalictrum sekimotoanum*)(50-150、黄緑色の花糸が糸状に垂れ下がる、本州四国、日当たりの良い場所)15
- 11076 ヒレフリカラマツ(*Thalictrum toyamae*)(10、淡い紅紫、宮崎県、絶滅危惧 I B類)45
- 11078 ムラサキカラマツ(*Thalictrum uchiyamae*)(50、薄紫、対馬と済州島のみ分布、特定希少種、絶滅危惧 I B類)62
- 11080 タカサゴカラマツ(タイワンバイカカラマツ)(*Thalictrum urbainii*)20、白(口紅赤)、台湾原産61,74
- 11102 トロリウス キネンシス(*Trollius chinensis*)(30、輝黄金花、中国)25
- 11107 キンバイソウ(*Trollius hondoensis*)(40、黄橙、日本固有種、中部地方)25
- 11109 トロリウス ラクサス(*Trollius laxus*)(クリーム、ロッキー山脈)[春の交換会から]85
- 11110 レブンキンバイソウ(*Trollius ledebourii* var. *polysepalus*)(20、濃黄、礼文島固有種)75
- 【クスノキ科】-----
- 11158 ヤマコウバシ(*Lindera glauca*)15
- 【クマツヅラ科】-----
- 11286-W (W)エビヅル (*Vitis ficifolia* var. *lobata*)(落葉蔓性木本、黒実、本州から沖縄)[山口県]54
- 【ケシ科】-----
- 11552 ジロボウエンゴサク(*Corydalis decumbens*)(10-20、薄い紫、実は線形のさく果、熟すると自然に散布される。関東地方から九州)[春の交換会から]3
- 11558 キケマン(*Corydalis heterocarpa* var. *japonica*)(60、黄とピンク、本州以南)[春の交換会から]1
- 11558-1 キケマン(斑入)(*Corydalis heterocarpa* var. *japonica*)(60、黄とピンク、本州以南)[春の交換会から]60
- 11560 ムラサキケマン(ヤブケマン)(*Corydalis incisa*)(30-50、紫、日本各地)[春の交換会から]1
- 11560-W (W)ムラサキケマン(ヤブケマン)(*Corydalis incisa*)(30-50、紫、日本各地)[春の交換会から][長野県]67
- 11567 コリダリス ルテア(*Corydalis lutea*)[春の交換会から]62
- 11567a コリダリス ルテア(*Corydalis lutea*)62
- 11576 フウロケマン(*Corydalis pallida*)(20-50、黄、本州四国九州)[春の交換会から]15
- 11622 コマクサ(*Dicentra peregrina*)(15、ピンク、高山の砂礫地)[大雪山由来]23
- 11629 ケマンソウ(*Dicentra spectabilis*)(別名タイツリソウ、薄ピンク、中国朝鮮)31
- 11769 パパベル デゲニイ(*Papaver degenii*)(5-10、黄、亜高山帯から高山帯)23
- 11771 リシリヒナゲシ(*Papaver fauriei*)(20、黄、利尻山固有種、絶滅危惧 I B類、市中に流布している種は栽培ヒナゲシの可能性大、栽培ヒナゲシとリシリヒナゲシは酷似)23,75
- 【コウヤマキ科】-----
- 11880 コウヤマキ(*Sciadopitys verticillata*)51
- 【ゴマノハグサ科】-----

- 12252-W エゾヒナノウスツボ(*Scrophularia grayana*)(90-150、赤紫、南千島、北海道、青森岩手)[北海道]81
- 【コミカンソウ科】-----
- 12335 フィランツス「フェアリー」(コモレビソウ)(*Phyllanthus 'Fairly'*)10、クリーム小花、非耐寒性常緑多年草16
- 12336 フィランツス グランジフリオス(*Phyllanthus grandifolius*)20
- 【サクラソウ科】-----
- 12381 ルリハコベ(*Anagallis arvensis f. coerulea*)(10-20、青紫、1年草、伊豆七島・紀伊半島・四国・九州・琉球)32
- 12400 アンドロサケ アルバナ(*Androsace alba*)(2年草)23
- 12408 アンドロサケ カルネア(*Androsace carnea*)(湿った岩礫斜面、岩だな、草付きの岩上、酸性土壌を好む)23
- 12442 アンドロサケ ラクテア(*Androsace lactea*)(白、ヨーロッパ)23
- 12464 アンドロサケ セプトントリオナリス(*Androsace septentrionalis*)(10-20、白、1年草)23
- 12470 リュウキュウコザクラ(*Androsace umbellata*)(5-10、白、1年草、中国地方から沖縄、海近くの草地)[春の交換会から]65
- 12470a リュウキュウコザクラ(*Androsace umbellata*)(5-10、白、1年草、中国地方から沖縄、海近くの草地)74
- 12494-4 カラタチバナ(白実、巻葉)(*Ardisia crispa*)42
- 12494-W (W)カラタチバナ(*Ardisia crispa*)(20-70、常緑小低木、百両、白、赤実)[愛知県]1
- 12496-W (W)ヤブコウジ(*Ardisia japonica*)(10-20、白、赤実、十両、北海道から九州)[山口県]54
- 12506 ビロードヤブコウジ(*Ardisia mamillata*)(葉がビロード状、赤実、中国南部)[少量]42
- 12513 コルツサ マッチョリ アルバ(白花サクラソウモドキ)(*Cortusa matthioli alba*)23
- 12530 シクラメン コウム(*Cyclamen coum*)(10、ピンク、耐寒性あり)45
- 12555 シクラメン コウム コウカシム(*Cyclamen coum ssp. caucasicum*)(10、ピンク)[春の交換会から]62
- 12561 シクラメン グラエカム(*Cyclamen graecum*)(10、ピンク、地中海の島々、標高1200m、乾燥地)[春の交換会から]62
- 12567a シクラメン ヘデリフォリウム(*Cyclamen hederifolium*)(10-20、ピンク、耐寒性あり)45
- 12567 シクラメン ヘデリフォリウム(*Cyclamen hederifolium*)(10-20、ピンク、耐寒性あり)[春の交換会から]85
- 12625 シクラメン ヘデリフォリウム「ルイサンダー」(*Cyclamen hederifolium "Lysander"*)[春の交換会から]62
- 12569 シクラメン ヘデリフォリウム(白)(*Cyclamen hederifolium 'Album'*)[春の交換会から]62
- 12603 シクラメン ペルシウム(*Cyclamen persicum*)(濃ピンク、春咲き、要霜除け、原種)[春の交換会から]85
- 12610 シクラメン プルプラッセンス(*Cyclamen purpurascens*)(ピンク、初夏咲き、芳香あり、森林下で、あまり大きくない石が点在するあるアルカリ土壌に自生、耐寒性あり)69
- 12704 ハマボツス(*Lysimachia mauritiana*)(10-40、白、北海道から九州)54,69,74
- 12709 モロコシソウ(*Lysimachia sikokiana*)(50、黄、乾燥した植物体からカレーの匂い、日本固有種、本州から琉球)[高知県産]52
- 12713 クサレダマ(*Lysimachia vulgaris var. davurica*)(80、黄色、北海道から九州)1,85
- 12805 プリムラ カンデラブラ ハイブリッド(*Primula candelabra hybrs*)(交配種)[黄、セルフ]85
- 12818 プリムラ チュンゲンシス(*Primula chungensis*)(オレンジ色の花)62
- 12830 エゾコザクラ(*Primula cuneifolia*)(10、ピンク、日本では北海道のみ)23
- 12833 ミチノクコザクラ(*Primula cuneifolia var. heterodonta*)(10、ピンク、青森岩木山特産、絶滅危惧Ⅱ類)23
- 12842 プリムラ デンティクラタ(*Primula denticulata*)(30、バラ-白 濃淡、タマザキサクラソウの別名、ヒマラヤ、耐暑性弱い)[春の交換会から]85
- 12846 プリムラ デンティクラタ(白)(*Primula denticulata white fl.*)(30、白、濃淡)[春の交換会から]85
- 12857 プリムラ ファリノサ(ヨウシユキワリソウ)(*Primula farinosa*)(湿った草原、川の傍などに群生する)23
- 12859 ウナンサクラソウ(*Primula filchnerae*)(20-40、薄ピンク~薄紫、東アジア、夏越しはやや難しい)6

- 12900 クリンソウ(*Primula japonica*)(20-50、赤、北海道から四国、湿地)29,66
 12900-W (W)クリンソウ(*Primula japonica*)(20-50、赤、北海道から四国、湿地)[長野県]66
 12900-W1 (W)クリンソウ(*Primula japonica*)(20-50、赤、北海道から四国、湿地)[山梨県]78
 12912 シコクカッコソウ(*Primula kisoana* var. *shikokiana*)(10、桃、絶滅危惧Ⅱ類)71
 12938 プリムラ ミニマ(*Primula minima*)(石灰岩地帯で日当たりのよい岩だな、岩場、岩礫地、稜線の草原、小石混じりの草原)[少量]20
 12944 ユキワリコザクラ(*Primula modesta* var. *fauriei*)(5-10、薄いピンク、東北北部から北海道、ユキワリソウの北方変種)85
 12944-E2 エサンユキワリコザクラ(通称)(*Primula modesta* var. *fauriei*)(恵山産)4
 12957 ヒナザクラ(*Primula nipponica*)23
 12975 プリムラ ポリアンツス「ゴールド レース」(*Primula polyanthus* 'Gold Lace')(園芸種)4
 13014 サクラソウ(*Primula sieboldii*)(10-20、ピンク、北海道南部から九州)26
 13014-3 サクラソウ(白)(*Primula sieboldii*)28
 13022 ソラチコザクラ(*Primula sorachiana*)(5-10、ピンク、日高山脈と夕張山地)[日高静内川産]23
 13067 ユウバリコザクラ(*Primula yuparensis*)(4-10、ピンク、夕張岳蛇紋岩地域、鋸葉が尖るのはユウバリコザクラ、絶滅危惧ⅠB類)23,85
 13095 ソルダネラ アルピナ(イワカガミダマシ)(*Soldanella alpina*)(15、薄い紫、高山、亜高山、牧草地や小川の縁、ヨーロッパ)23
 13115-W (W)ツマトリソウ(*Trientalis europaea*)(5-20、白)[群馬県]73
 -----【サトイモ科】-----
 13169-B マイヅルテンナンショウ(小~中球)(*Arisaema heterophyllum*)(60-100、雄性個体と両性個体のみ存在、岩手から鹿児島、川沿いの草地、絶滅危惧Ⅱ類)64
 13200 コウライテンナンショウ(*Arisaema peninsulae*)(80、緑、広義のマムシグサに含める見解もある)[保湿種子]23
 13202 ムサシアブミ(*Arisaema ringens*)(40、関東以西、四国九州)1,67
 13212 ユキモチソウ(*Arisaema sikokianum*)(40、付属体白、球形、近畿四国、絶滅危惧Ⅱ類)5,23,36
 13212-B1 ユキモチソウ(小球)(*Arisaema sikokianum*)(40、付属体白、球形、近畿四国、絶滅危惧Ⅱ類)[実生1年]85
 13219 ウラシマソウ(素心)(*Arisaema thunbergii* ssp. *urashima* 'Green form')(40、緑)15
 13219-B1 ウラシマソウ(素心)(小球)(*Arisaema thunbergii* ssp. *urashima* 'Green form')(40、緑)64
 13225 アオテンナンショウ(*Arisaema tosaense*)(20-130、薄緑、山地・林床・溪谷)36
 13228 ヒガンマムシグサ(*Arisaema undulatifolium*)(40、紫褐色)34
 13290-W1 (W)ミズバショウ(*Lysichiton camtschaticense*)(60-100、白、北海道から中部、湿地)[保湿種子][北海道]23
 13290-W2 (W)ミズバショウ(*Lysichiton camtschaticense*)(60-100、白、北海道から中部、湿地)[発芽済み種子、保湿][北海道]23
 13300-B ニオイハンゲ(ムカゴ)(*Pinellia cordata*)(赤花大葉)23
 13305 オオハンゲ(*Pinellia tripartita*)(20-50、緑に帯紫、本州中部から沖縄)1
 -----【シオデ科(サルトリイバラ科)】-----
 13382-1 トゲナシサルトリイバラ(*Smilax china* var. *yanagitai*)60
 -----【シソ科】-----
 13431 カワミドリ(*Agastache rugosa*)(40-100、淡青紫穂状花、山地の草原、北海道から九州)85
 14201 カリガネソウ(*Caryopteris divaricata*)(30-100、青紫、全草に特有の臭気、北海道から九州)5,8,32,54,55,
 14201-1 カリガネソウ(濃色)(*Caryopteris divaricata*)(30-100、濃い青紫、全草に特有の臭気、)74,85
 14201-W (W)カリガネソウ(*Caryopteris divaricata*)(30-100、青紫、全草に特有の臭気、北海道から九州)[長野県]67
 14202 カリガネソウ(桃)(*Caryopteris divaricata* pink)(30-100、桃)5,85
 14204 ダンギク(*Caryopteris incana*)(70-80、白、ピンク、青、紫、絶滅危惧Ⅱ類)1,22,84
 14204-1 ダンギク(ピンク)(*Caryopteris incana*)(70-80、ピンク)21
 14221-1 ジャコウソウ(白花)(*Chelonopsis moschata* white fl.)(60-100、白、北海道から九州)51
 14241 クルマバナ(*Clinopodium chinense* ssp. *grandiflorum* var. *parviflorum*)(20-80、薄い紫、北海道から九州)15

- 14270 シモバシラ(*Collinsonia (Keiskea) japonica*)(40-70、白、初冬、立ち枯れた茎の根元に霜柱状の氷柱が出来る。)32,35
- 14280 ムシャリンドウ(*Dracocephalum argunense*)(10-20、青紫、北海道から中部、絶滅危惧Ⅱ類)16
- 14281 ムシャリンドウ(白)(*Dracocephalum argunense* "Album")(10-20、白)75
- 14282 ピンクコーカサスマシャリンドウ(*Dracocephalum botryoides*)(10-15、ピンク、コーカサス)16
- 14300 フトボナギナタコウジュ(*Elsholtzia argi-nipponica*)74
- 14301 ナギナタコウジュ(*Elsholtzia ciliata*)(80、淡紫、一年草、北海道から九州)15,54,84
- 14330-1 チシマオドリコソウ(白散斑)(*Galeopsis bifida*)23
- 14370 セキヤノアキチョウジ(*Isodon effusa*)15
- 14372 ヒキオコシ(*Isodon japonicus*)(30-70、薄い紫、北海道南西部から九州)1
- 14374 アキチョウジ(白)(*Isodon longitubus white fl.*)(60-90、白、長野以西)5
- 14537 イヌコウジュ(*Mosla punctulata*)(30、薄い紅紫、日本全国)15
- 14550 カミメボウキ(*Ocimum tenuiflorum (sanctum)*)(30-60、薄紫、熱帯原産、芳香あり)20
- 14551 バジル(紫葉)(*Ocimum basilicum 'Red rubin'*)[交換会注:野菜の種子]20
- 14636 ウツボグサ(*Prunella vulgaris ssp. asiatica*)(20、青、北海道から沖縄)1
- 14638 ウツボグサ(白)(*Prunella vulgaris ssp. asiatica white fl.*)(20、白、北海道から沖縄)62
- 14641 セイヨウウツボグサ(*Prunella vulgaris subsp. vulgalis*)10、赤16
- 14656 ミヤマヒキオコシ(*Rabdosia shikokiana*)15
- 14660 クロバナヒキオコシ(*Rabdosia trichocarpa*)(50-150、黒紫)3,32
- 14687 アキノタムラソウ(*Salvia japonica*)(20-50、青紫、山形から九州)15
- 14699 キバナアキギリ(*Salvia nipponica*)(20-30、黄、本州から九州)5,85
- 14708 ヒメタムラソウ(*Salvia pygmaea*)76
- 14710 ハルノタムラソウ(*Salvia ranzaniana*)(10-20、白、日本固有種、紀伊四国九州)76
- 14743 コガネバナ(*Scutellaria baicalensis*)(40位、青紫花)3
- 14757 コバノタツナミ(*Scutellaria indica var. parvifolia*)(5-10、桃、タツナミソウより小型)1
- 14757-1 コバノタツナミ(白)(*Scutellaria indica var. parvifolia*)(5-10、白、タツナミソウより小型)1,63
- 14757-2 コバノタツナミ(紫)(*Scutellaria indica var. parvifolia*)(5-10、紫、タツナミソウより小型)1
- 14770 トウゴクシソバタツナミ(*Scutellaria maekawae f. abbreviate*)(新潟産)1
- 14786 アカボシタツナミソウ(*Scutellaria rubropunctata*)(20-50、淡紫、奄美大島～沖縄諸島)69
- 14873 ハマゴウ(*Vitex rotundifolia*)(50-100、灌木、青紫、東北地方南部から九州、海岸の砂地)1,22

-----【シュロソウ科】-----

- 14921 シライトソウ(*Chionographis japonica*)(20-40、白、秋田から九州、山地)63
- 14921-W (W)シライトソウ(*Chionographis japonica*)(20-40、白、秋田から九州、山地)[愛知県]1
- 14923 ミノシライトソウ(*Chionographis japonica var. minoensis*)(25-40、白、絶滅危惧ⅠB類)70
- 14926 コシキジマシライトソウ(通称)(*Chionographis japonica*)(鹿児島島の甑(こしき)島の林床に自生普通のシライトソウより葉がしっかりしていて花付も良い)12,45
- 14927 サイシュウトウシライトソウ(通称)(*Chionographis sp.*)45
- 14947 ヤクシマショウジョウバカマ(*Helonias (Heloniopsis) orientalis var. yakusimensis*)(ツクシショウジョウバカマの矮性種、屋久島固有種)23
- 15011 トリリウム セッシレ「ルブルム」(*Trillium sessile 'Rubrum'*)4
- 15013 エンレイソウ(*Trillium smalii*)(褐紫色、谷川沿いなど湿潤なところ)62
- 15013d エンレイソウ(*Trillium smalii*)(褐紫色、谷川沿いなど湿潤なところ)[乾燥種子]27
- 15026 トリリウム バセイ×ルゲリー(*Trillium vaseyi x rugelii*)白～クリーム4
- 15035 シュロソウ(*Veratrum maackii var. japonicum*)(20-30(葉)、50-100(茎)、暗紫、暗褐)35

-----【ショウガ科】-----

- 15065 ハナミョウガ(*Alpinia japonica*)(40-60、白赤、関東以西四国九州、暖地)54
- 15065-W (W)ハナミョウガ(*Alpinia japonica*)(40-60、白赤、関東以西四国九州、暖地)[愛知県]1

-----【スイカズラ科】-----

- 15339-W (W)スイカズラ(*Lonicera japonica*)(つる性、白から黄に変化する、香りあり、黒実)[山形県]51
- 15416 ヒメマツムシソウ(通称)(*Scabiosa columbaria var. alpina*)(10、青、ヨーロッパ)23
- 15421 マツムシソウ(*Scabiosa japonica*)(50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原)5
- 15421-W (W)マツムシソウ(*Scabiosa japonica*)(50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原)[長野県]67

- 15421-W1 (W)マツムシソウ(*Scabiosa japonica*)(50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原)[長野県2]62
 15422 エゾマツムシソウ(*Scabiosa japonica* var. *acutiloba*)(20-50、青紫、東北北部から北海道)44
 15425 ソナレマツムシソウ(*Scabiosa japonica* var. *littoralis*)(10-30、青紫、多年草、関東、海岸、絶滅危惧Ⅱ類)61,83,84

-----【ススキノキ科】-----

- 15615 ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)(エゾカンゾウ)(*Hemerocallis dumortieri* var. *esculenta*)(50-70、黄、北海道から中部、山地、亜高山)31,85
 15629 トビシマカンゾウ(*Hemerocallis middendorffii* var. *exaltata*)(100-200、黄、ニッコウキスゲより大型、飛鳥、佐渡島のみ分布)34

-----【スミレ科】-----

- 15732 アリアケスミレ(*Viola betonicifolia* var. *albescens*)(白地に紅紫、紫の紫状、本州から九州、朝鮮・中国)62
 15733 リュウキュウシロスミレ(*Viola betonicifolia* var. *oblongo-sagittata*)(白地に紫の縁取り)15
 15734 キバナノコマノツメ(*Viola biflora*)(5-20、黄、北海道、本州中部以北、四国、九州、亜高山帯から高山帯)23
 15756 ダイセンキスミレ(*Viola brevistipulata* ssp. *minor*)(濃黄、花弁の裏側は暗紅褐色のぼかし、中国山地)[少量]42
 15771-1 ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン)(通称ウスベニヒゴスミレ)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana* x *eizanensis*)(濃淡の紅が入る。)15
 15799 ヤマツクスミレ(*Viola diffusa* ssp. *tenuis*)[少量]42
 15800 ツクスミレ(*Viola diffusa* var. *glabella*)(淡い薄紫、開花株の寿命は短い、九州南部から南西諸島)42,69,73
 15806 ヒトツバエゾスミレ(*Viola eizanensis* var. *simplicifolia*)(白、淡紅紫、エイザンスミレに似る)4
 15807 ナルカミスミレ(*Viola eizanensis* var. *simplicifolia* f. *leucantha*)(ヒトツバエゾスミレの白花種)15
 15826-8 タチツボスミレ(距が多い)(*Viola grypoceras*)15
 15827 シロバナタチツボスミレ(*Viola grypoceras* f. *albiflora*)(白)[少量]42
 15857 ヒメスミレ(*Viola inconspicua* ssp. *nagasakiensis*)(濃紫、唇弁と側弁に紫条が入る。微香、低地)15
 15861 コスミレ(*Viola japonica*)(淡桃、淡紫、北海道南西部から九州まで)62
 15861-2 コスミレ(黄掃斑)(*Viola japonica*)[ピンク]15,42
 15863 シロバナツクシコスミレ(*Viola japonica* f. *albida*)(白、コスミレの白花、シロバナコスミレ(俗名))42
 15874 ケマルバスミレ(マルバスミレと呼ばれる)(*Viola keiskei* f. *glabra*)(白、唇弁に紫条が入る、青森から屋久島)[少量]42
 15885 ビオラ ラブラドリカ プルプレア(*Viola labradorica purpurea*)(変種)[少量、北米のスミレ、カラス葉]42
 15886 シロコスミレ(*Viola lactiflora*)(絶滅危惧ⅠA類)62
 15892-2 スミレ(花弁に覆輪)(*Viola mandshurica*)[少量、青味が強い紫]42
 15892-3 スミレ(花中心が桃色)(*Viola mandshurica*)[少量]42
 15892-4 スミレ(絞り)(*Viola mandshurica*)[紫の中に白が入る]42
 15893 エビチャスミレ→スミレ(エビ茶色)(*Viola mandshurica* “Ebicha”)(明るいエビ茶、平場)[少量]42
 15897 ニシキスミレ(*Viola mandshurica* f. *albo-variegata*)(紫、スミレの斑入り、実生でほぼ100%斑入り出現)[少量]42
 15902 ビオラ マンシュリカ ハセガワエ(シロガネスミレ)(*Viola mandshurica* f. *hasegawae*)(白から着色あり、東京白金台で発見)[少量、多少紫条入る]42
 15905 コモロスミレ(*Viola mandshurica* f. *plena*)(10、薄い紫、重弁)[少量]42
 15906 シロバナコモロスミレ(*Viola mandshurica* f. *plena*)(10、白(紫が残る)、重弁、選抜種)42
 15908 ホコバスミレ(*Viola mandshurica* var. *ikedaeana*)(紫、比較的高い山の草原)[少量]42
 15910 アツバスミレ「二色アツバスミレ」(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *bicolor*)(10、白・紫)42
 15911 ニイジマスミレ(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *nijimensis*)(10、白、東京都原産)15
 15930 ニオイタチツボスミレ(*Viola obtusa*)(濃紫、濃紅紫、中央部白くぬける)1
 15944-1 ナガバナタチツボスミレ(オトメ型)(*Viola ovato-oblonga*)62
 15954 シロスミレ(シロバナスミレ)(*Viola patrinii*)[少量]42

- 15972 ケイジョウスミレ(*Viola prionantha* var. *sylvatica*)42,62
 15973 リュウキュウコスミレ(*Viola pseudo-japonica*)(白花大)69
 15974 ビオラ プベスケンス(*Viola pubescens*)(レモン黄、暑さに強いが、夏は休眠しやすい、北米東部)[アメリカクスミレ]4,42
 15978 タチスミレ(*Viola raddeana*)(絶滅危惧Ⅱ類)69
 16009-1 ヒゴスミレ(素心)(*Viola sieboldiana*)42
 16052 ゲンジスミレ(*Viola variegata* var. *nipponica*)(淡紫、裏面の方が色が濃い、花弁に紫の条が入る、)[少量]42
 16060 コケスミレ(*Viola verecunda* var. *yakusimana*)(白、唇弁に赤紫の条が入る)23,42
 16065 コンピラスミレ(*Viola violacea* f. *pictitolia*)(シハイスミレの仲間)[少量]42
 16072 ベニバナナンザンスミレ(俗称)(*Viola* x '*Benibananzan*')(エイザンスミレの園芸品種)23
 16078-1 ノジスミレ(重弁)(*Viola yedoensis*)(淡紫、紫条あり)42
 16079 シロノジスミレ(*Viola yedoensis* f. *albescens*)(白)42
 16086 タカオスミレ「てんぐ」(*Viola yezoensis* f. *discolor* 'Tengu')(赤紫が強い、園芸品種、花時の葉の表面が黒褐色になる)[少量]42
 16087 アソヒカゲスミレ(*Viola yezoensis* var. *asoana*)(15、春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる)[少量]42
 16088 シソバクスミレ(*Viola yubariana*(*Viola brevistipulata* var. *crassifolia*))(濃黄、唇弁に赤紫の条が入る、北海道、蛇紋岩地帯、絶滅危惧Ⅱ類)23
 16088-1 シソバクスミレ(緑葉)(*Viola yubariana*(*Viola brevistipulata* var. *crassifolia*))(濃黄、唇弁に赤紫の条が入る、葉は葉裏も含めて緑色、北海道、蛇紋岩地帯、絶滅危惧Ⅱ類)[実生で稀に出現]23
 16090 スミレ「夕霧」(*Viola mandshurica* 'Yuugiri')(花弁の中央部にかけて紫のぼかし入る)[少量、芳香あり]42
 16091 ビオラ ソロリア「レッドジャイアント」(*Viola sororia* 'Red Giant')(濃色マゼンタ)[少量]42
 16092 スミレ「天城」(*Viola mandshurica* 'Amagi')(白他)[少量]42

—————【セリ科】—————

- 16115 アクティノツス ヘリアンティ(*Actinotus helianthi*)(日当たりのよい海岸近く)23
 16185 エキサイゼリ(*Apodicarpum ikenoi*)(20-30、白、準絶滅危惧種)[春の交換会から、関東から東海に自生、日本固有種]3
 16192 アストランチア マヨル(*Astrantia major*)(白色地に帯桃色、30-60、中央・西ヨーロッパ原産)85
 16218 ハクサンサイコ(*Bupleurum nipponicum*)(20-50、黄、日本固有種、亜高山から高山帯の草地)6
 16223 ミシマサイコ(*Bupleurum scorzoneraefolium* var. *stenophyllum*)(30-50、黄、薬草、本州四国九州、絶滅危惧Ⅱ類)6,67
 16235 ツボクサ(*Centella asiatica*)(茎は這性、淡紅紫、関東以西から琉球、耐寒性弱い)20
 16260-W (W)ミツバ(*Cryptotaenia japonica*)(40、白、山地の日陰、北海道から沖縄)[長野県]66
 16320 マルバトウキ(*Ligusticum hultenii*)(30-100、白、北海道から本州北部、海岸の岩場や砂地)10

—————【センリョウ科】—————

- 16503-1 フタリシズカ(青軸)(*Chloranthus serratus*)[乾燥種子]64
 16510-W (W)センリョウ(*Sarcandra glabra*)(50-100、黄、赤実、関東地方から沖縄)[愛知県]1
 16510 センリョウ(*Sarcandra glabra*)(50-100、赤実、関東地方から沖縄)[乾燥種子]48
 16510-2 センリョウ(黄実)(*Sarcandra glabra*)(50-100、黄、黄実、関東地方から沖縄)[乾燥種子]48

—————【タデ科】—————

- 16617 ヒメタデ(*Persicaria erecto-minor*)(5-15、淡紅、草地川岸、絶滅危惧Ⅱ類)28
 16618 アオヒメタデ(ヒメタデの白花種)(*Persicaria erecto-minor* f. *viridiflora*)(5-15、花は緑白)41
 16620 ミズヒキ(*Persicaria filiforme*)(30-50(地植え)、赤白)1,50
 16620-1 ミズヒキ(白花)(*Persicaria filiforme*)(30-50(地植え)、白)50
 16621 ミズヒキ(斑入り)(*Persicaria filiforme* 'Variegata')5,44
 16621-2 ミズヒキ(斑入り、矢印マークの斑ではない)、赤花(*Persicaria filiforme* 'Variegata')65
 16622 ギンミズヒキ(*Persicaria filiformis* f. *albiflora*)(30-50(地植)、15(鉢)、白、多年草)1
 16623 ミズヒキ(斑入り「ペインターズ・パレット」)(*Persicaria filiformis* 'Painter's Palette')(40、赤白、斑入り)80
 16636-1 イヌタデ(斑入り)(*Persicaria longiseta*)4

- 16655-1 ポントクタデ(斑入り)(*Persicaria pubescens*)(30-50、淡紅)63
 16666 アイ(通称タデアイ/アイタデ)(*Persicaria tinctoria*)(30、藍染めの染料の原料)63
 16666-2 マルハアイタデ(流通名か)(*Persicaria tinctoria*?)6
 16698 白花ポリゴナム(斑入り)(*Polygonum capitatum*)84

-----【タヌキモ科】-----

- 16768-B ムシトリスミレ(ムカゴ)(*Pinguicula vulgaris* var. *macroceras*)(5-15(花茎)、紫色、北海道から四国、亜高山から高山)[少量]9

-----【ツツジ科】-----

- 16961 ガンコウラン(*Empetrum nigrum* var. *japonicum*)[保湿種子、種子は嫌光、好酸性]23
 16970 サラサドウダン(*Enkianthus campanulatus*)[山形県由来]51
 16970-E サラサドウダン(山形県由来、特農色)(*Enkianthus campanulatus*)51
 17039 ガウテリア ムクロナタ(流通名:真珠の木)(*Gaultheria mucronata*)(=*Pernettya mucronata*)23
 17038 チェッカーベリー(*Gaultheria procumbens*)23
 17072-W (W)ウラジロハナヒリノキ(*Leucothoe grayana* var. *glaucina*)(100~150、白、落葉低木、亜高山から高山)[山形県]51
 17106 ウラジロヨウラク(*Menziesia multiflora*)82
 17130 アオノツガザクラ(*Phyllodoce aleutica*)(10、常緑低木、白、高山の雪田)23
 17150 アセビ(*Pieris japonica*)48
 17163-W (W)ベニバナイチヤクソウ(*Pyrola incarnata*)(15-25、紅、亜高山帯の林床、半寄生植物とも言われている)[長野県]85
 17165-W (W)イチヤクソウ(*Pyrola japonica*)(20花径、白、林内、北海道から九州)[山口県]54
 17190-W (W)キバナシャクナゲ(*Rhododendron aureum*)(60-70、薄黄、低木、北海道から中部、高山帯から亜高山上部)[山梨県]78
 17208-W (W)アズマシャクナゲ(*Rhododendron degronianum*)(200、淡い紅(変異多い)、本州中部から東北)[群馬県]71
 17272 アカヤシオ(*Rhododendron pentaphyllum* var. *nikoense*)(300-500落葉、ピンク、東北南部から中部、太平洋側)85
 17328 ロードデンドロン コーカシクム(*Rhododendron caucasicum*)(白~ピンク、コーカサス)23
 17329 ロードデンドロン マキシマム(*Rhododendron maximum*)(白)23
 17392 オオミツルコケモモ(別名クランベリー)(*Vaccinium macrocarpon*)21
 17408-W (W)クロマメノキ(*Vaccinium uliginosum*)(30-80、白、黒紫実、北海道、中部以北、亜高山帯から高山帯)[クロウズゴが混入恐れ][群馬県]73
 17409-W (W)コケモモ(*Vaccinium vitis-idaea*)(10-40、白、赤実、常緑低木、酸性土壌を好む、高山帯)[群馬県]73

-----【ツツラフジ科】-----

- 17422 アオツツラフジ(*Cocculus trilobus*)(300以上、薄黄~白、白実から変化青紫実、有毒)84
 17422-W (W)アオツツラフジ(*Cocculus trilobus*)(300以上、薄黄~白、白実から変化青紫実、有毒)[愛知県]1
 17422-W1 (W)アオツツラフジ(*Cocculus trilobus*)(300以上、薄黄~白、白実から変化青紫実、有毒)[山口県]54

-----【ツバキ科】-----

- 17510 ヒメシャラ(*Stewartia monadelphica*)(-1500、落葉高木、白、日本特産種、神奈川以西屋久島まで)37

-----【ツククサ科】-----

- 17547 オオボウシバナ(*Commelina communis* var. *hortensis*)(60-100、青紫、ツククサの変異したもの)62
 17552 メガネツククサ(流通名)(*Commelina communis* white fringe fl.)(白の覆輪)62
 17570 ヤブミヨウガ(*Pollia japonica*)(50-60、白小花、関東から九州)1
 17570-W (W)ヤブミヨウガ(*Pollia japonica*)(50-60、白小花、関東から九州)[愛知県]1

-----【ツリフネソウ科】-----

- 17598 ツリフネソウ(*Impatiens textori*)(50-80、赤紫、一年草、日本各地)[冷蔵保管]15
 17601 シロツリフネ(*Impatiens textori* f. *palescens*)(50-80、白、一年草、北海道から九州)[冷蔵保管]15

—————【トウダイグサ科】—————

- 17704 ショウジョウソウ(クサショウジョウ)(*Euphorbia heterophylla*)(30-50(地植)、16(鉢)、橙・緑、頭頂部赤)1
 17800 ナンキンハゼ(*Triadica sebifera*)(600、落葉中木、中国台湾)54

—————【トケイソウ科】—————

- 17844 パッシフロラ カプスラリス(*Passiflora capsularis*)(白花)20
 17843 パッシフロラ スベロサ(*Passiflora suberosa*)20

—————【ナス科】—————

- 17940 オオセンナリ(通称クロホオズキ)(*Nicandra physaloides*)(50-100、薄紫、1年草、南アメリカ、帰化植物)26,54
 17940-1 オオセンナリ(通称クロホオズキ)(斑入り)(*Nicandra physaloides*)(50-100、薄紫、1年草、南アメリカ、帰化植物)76
 17973 トマティーヨ(オオブドウホウズキ)(*Physalis philadelphica*)[交換会注:野菜の種子]20
 18002-W (W)ヒヨドリジョウゴ(*Solanum lyratum*)(ツル、秋に赤い実)[山口県]54
 18008 フユサンゴ(*Solanum pseudocapsicum*)(半耐寒性 小低木、実は有毒)6

—————【ナデシコ科】—————

- 18110 ナンバンハコベ(*Cucubalus baccifera* var. *japonica*)(ツル状に匍匐、白、北海道から九州、山野)62
 18110-W (W)ナンバンハコベ(*Cucubalus baccifera* var. *japonica*)(ツル状に匍匐、白、北海道から九州、山野)[長野県]66
 18190 ハマナデシコ(フジナデシコ)(*Dianthus japonicus*)(15-40、濃桃、本州から沖縄、海岸)1,50,54
 18191 シロバナハマナデシコ(*Dianthus japonicus* f. *albiflorus*)(15-40、白)3,61
 18193 ヒメハマナデシコ(*Dianthus kiusianus*)(15-30、ピンク、和歌山愛媛、沖縄まで、海岸、日本固有種)81,84
 18250 カワラナデシコ(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*)(20-50、桃、萼片の長さは3-4でエゾカワラナデシコより長い、)3,62,82
 18250-7 カワラナデシコ(絞り咲き)(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*)[薄桃色]78
 18254 カワラナデシコ(白)(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus* white fl.)(20-50、白)32,78
 18257 タカネナデシコ(シモフリナデシコ)(*Dianthus superbus* var. *speciosus*)(15、桃、エゾカワラナデシコの高山型、本州以北)8
 18444 スイセンノウ(フランネルソウ)(*Silene (Lychnis) coronaria*)60、淡紅、南ヨーロッパ原産1
 18452 ガンピ(ガンピセンノウ)(*Silene (Lychnis) coronata*)(30-40、朱橙色)62
 18457 カッコウセンノウ(*Silene (Lychnis) flos-cuculi*)(30-40、桃、ヨーロッパアルプス原産)25
 18466 リクニス フルゲンス(エゾセンノウ)(*Silene (Lychnis) fulgens*)62
 18468 センジュガンピ(*Silene (Lychnis) gracillima*)(30-100、白、東北~中部地方以北)3
 18472 フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州)85
 18472-W (W)フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州)[長野県]66
 18478 マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(*Silene (Lychnis) sieboldii*)(30-40、紅、一般に流通するのは葉や茎に赤が混じらないツクシマツモト)5,85
 18484 エンビセンノウ(*Silene (Lychnis) wilfordii*)(40、赤、北海道の一部、埼玉長野、絶滅危惧Ⅱ類)5,23
 18596 ツルビランジ(*Silene keiskei* f. *procumbens*)(這性、濃いピンク、絶滅危惧種ⅠA類)85
 18598 タカネビランジ(*Silene keiskei* var. *akaisialpina*)(10-15、赤紫、中部、高山帯)85
 18601 シロバナビランジ(*Silene keiskei* var. *minor* f. *albescens*)(10-15、白、ビランジの白花種)85
 18627 サクラマンテマ(*Silene pendula*)(60以下、桃、帰化植物、地中海沿岸)2
 18627a サクラマンテマ(*Silene pendula*)(60以下、桃、帰化植物、地中海沿岸)[春の交換会から]3
 18642 アポイマンテマ(*Silene repens* var. *apoiensis*)(10、白)23
 18669 タカネマンテマ(*Silene uralensis*)(白、絶滅危惧ⅠA類)23
 18732 シコタンハコベ(*Stellaria ruscifolia*)(5、白、絶滅危惧Ⅱ類)23

—————【ニシキギ科】—————

- 18772 ニシキギ(*Euonymus alatus*)(200-300、薄緑、落葉低木、赤実)1

- 18776 コマユミ(*Euonymus alatus* f. *stiatu*s)(100-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州)1,48,53
- 18790 アメリカマユミ(別名イガグリマユミ)(*Euonymus hamiltonianus*)(耐寒性あり、北アメリカ)2,47
- 18806 ツリバナ(*Euonymus oxyphyllus*)(100-400、淡緑、赤実、落葉低木、北海道から九州、山地)1,15,82
- 18806-3 ツリバナ「紅奴」(*Euonymus oxyphyllus*)選抜種?33
- 18818 フウリンツリバナマユミ(*Euonymus* sp)(プロペラの様な実がなる)2,46,53
- 18839 ウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *multiseta*)(10-50、白、山地の湿地、北海道から九州)4,5,78
- 18839-1 ウメバチソウ(仮雄蕊22裂)(*Parnassia palustris* var. *multiseta*)(10-50、白、山地の湿地、北海道から九州)23
- 18839-2 ウメバチソウ(仮雄蕊20裂)(*Parnassia palustris* var. *multiseta*)(10-50、白、山地の湿地、北海道から九州)[秋田県由来、中型種]23
- 18839-W (W)ウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *multiseta*)(10-50、白、山地の湿地、北海道から九州)[長野県]67
- 18842 アカバナウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *palustris*)(10-15、薄い紅、耐暑性弱い)5
- 【ヌマハコベ科】-----
- 18932 レウイシア ネバデンシス(*Lewisia nevadensis*)(5-10、白、夏は上の葉が枯れ休眠、アメリカ西部)23
- 18939 レウイシア ピグマエア(*Lewisia pygmaea*)(10、紫紅、多肉型、北米ロッキー)75
- 【ネムノキ科】-----
- 18991 ミモサ ポリカプラ スペガジニ(*Mimosa polycarpa spegazzinii*)(薄紫)20
- 【ハナシノブ科】-----
- 19354 ハナシノブ(*Polemonium kiushianum*)(30-50、濃い紫、特定国内希少種、絶滅危惧 I A 類)22,25,31,62,85
- 19354-E ハナシノブ(阿蘇山由来)(*Polemonium kiushianum*)30-50、濃い紫、特定国内希少種、絶滅危惧 I A 類[親株は阿蘇山由来の株(F2)]85
- 19366 ポレモニウム レプタンス(*Polemonium reptans*)(30、淡青)23
- 【ハマウツボ科】-----
- 19420 ナンバンギセル(*Aeginetia indica*)(20、赤紫、北海道から沖縄、イネ科の他ミョウガなどにも寄生)1,8,45,47,50
- 19420-1 ナンバンギセル(口紅咲き)(*Aeginetia indica*)(20、白)47
- 19560 コシオガマ(*Phtheirospermum japonicum*)(30、桃、低地性、半寄生)6,15
- 【バラ科】-----
- 19612 キンミズヒキ(黄金葉)(*Agrimonia pilosa*)6
- 19613 キンミズヒキ(*Agrimonia pilosa* var. *japonica*)(30-50(地植)、15(鉢)、黄、北海道から九州)49,50,63
- 19613-1 キンミズヒキ(斑入り)(*Agrimonia pilosa* var. *japonica*)6
- 19670 コトネアスター(ベニシタン)(*Cotoneaster horizontalis*)(50-100、半常緑から落葉、白ピンク、赤実、中国原産)[保湿種子]23
- 19673 カマツカコケモモ(コケモモカマツカ)(*Cotoneaster morrisonensis*)(15、盆栽用)、台湾原産[保湿種子]23
- 19681 サンザシ(*Crataegus cuneata*)(200、落葉低木、白花、赤実、中国中部)85
- 19686 セイヨウサンザシ(*Crataegus monogyna*)(落葉低木、白、赤実、サンザシより実は小さい)20
- 19708 チョウノスケソウ(*Dryas octopetala* var. *asiatica*)(5-10、常緑低木、白、高山帯)43
- 19765 エゾクサイチゴ(*Fragaria yezoensis*)23
- 19766 ピンクパンダイチゴ(*Fragaria* x *Potentilla* 'Pink Panda')(属間交配種)23
- 19770 オオダイコンソウ(*Geum aleppicum*)(30、黄)1
- 19789 アルプスダイコンソウ(イワダイコンソウ)(*Geum montanum*)(10-30、黄、アルプス)23
- 19792 チングルマ(*Geum pentapetalum*)(15、白、北海道から中部以北、高山帯から亜高山帯)43
- 19792-E チングルマ(*Geum pentapetalum*)(15、白、北海道から中部以北、高山帯から亜高山帯)[大雪山由来]23
- 19793 ユウバリチングルマ(通称?)(*Geum pentapetalum* var. *serrata*)23

- 19798 ゲウム リバレ(フウリンダイコンソウ)(*Geum rivale*)(10-15、赤花白芯、下向き開花)23
 19799 ゲウム リバレ イスランディクム(*Geum rivale islandicum*)85
 19869 ヒメリンゴ(*Malus prunifolia*)[保湿種子]23
 19902 カマツカ(*Photinia (Pourthiaea) villosa* var. *leavis*)(500-700、白、赤実、本州から九州)28
 19956 ポテンチラ グラキリス ヌタリー(*Potentilla gracilis nuttallii*)(30-60、淡黄)25
 19970 ユウバリキンバイ(*Potentilla matsumurae* var. *yuparensis*)(10-30、黄、絶滅危惧IB類)8,10,21,22
 19971 チシマキンバイ(*Potentilla megalantha*) (10-20、黄、株全体に毛が多い、北海道)2,23
 19975 メアカンキンバイ(*Potentilla miyabei*)(10、黄、北海道固有種、絶滅危惧II類)23
 19994 ポテンティラ ヌッタリー(*Potentilla nuttallii*)(30-50、黄)62
 20090 ウメ(*Prunus mume*)[白、八重咲き、種子交換会注:乾燥種子]13
 20116 マルバノシャリンバイ(*Rhaphiolepis umbellata* var. *integerrima*)(100、白、常緑低木、本州中部以西)49
 20125 シロヤマブキ(*Rhodotypos scandens*)(100、一重白、小作りには多剪定、)1,8,21,45,77
 20134 カカヤンバラ(ヤエヤマノイバラ)(*Rosa bracteata*)(100、白、沖縄(先島諸島) 海岸の草原、荒地)[別名「八重山乙女」紅芯]81
 20136 ロサ カルパチカ(*Rosa carpatica*)20
 20143 サンショウバラ(*Rosa hirtula*)(100-500、ピンク、富士箱根地方、絶滅危惧II類)85
 20152-1 タカネバラ(白)(*Rosa nipponensis*)(100-200、白、日本固有種、中部山岳部から四国剣山など)5
 20157 ハマナス(*Rosa rugosa*)(100-150、ピンク、北海道、南は茨城、島根)45
 20159 シロバナハマナス(*Rosa rugosa* f. *alba*)17
 20264 ワレモコウ(*Sanguisorba officinalis*)(30-100、赤、紫、北海道から九州)1,41
 20264-W (W)ワレモコウ(*Sanguisorba officinalis*)(30-100、赤、紫、北海道から九州)[愛知県]1
 20317 ナンキンナナカマド(*Sorbus gracilis*)(100-300、黄、赤実、東北南部から九州)14
 20330 ミヤマナナカマド(*Sorbus sambucifolia* var. *pseudogracilis*)[保湿種子]23
 -----【ヒガンバナ科】-----
 20450 ステゴビル(*Allium (Caloscordum) inutile*)(20、白、絶滅危惧II類)79
 20571 エゾネギ(*Allium schoenoprasum*)(日当たりの良く、やや湿った草原や傾斜地)20
 20584 アリウム セネスケンス(流通名セツカヤマネギ、タケシマイワラッキョウ)(*Allium senescens*)(20、薄紫、外来種)6
 20592 ミヤマラッキョウ(*Allium splendens*)(薄紫、本州中部以北の高山や北海道の海岸)[夕張山地由来]23
 20599 ヤマラッキョウ(*Allium thunbergii*)(30-50、赤紫、福島から沖縄)62
 20599-1 ヤマラッキョウ(大型種)(*Allium thunbergii*)74
 20600 ヤマラッキョウ(白)(*Allium thunbergii* white fl.)(30-50、白)45,79
 20602 カンカケイニラ(アリウム トガシー)(*Allium togashii*)(白、淡紫、小豆島特産種、絶滅危惧IB類)[小豆島由来2代目]69
 20609 ギョウジャニンニク(*Allium victorialis* var. *platyphyllum*)(40-60、白、北海道から近畿、山地、山菜で食用)[保湿種子]85
 20609-1 樺太アイヌネギ(ギョウジャニンニクの丸葉種)(*Allium victorialis* var. *platyphyllum*)23
 20610 ギョウジャニンニク(斑入り)(*Allium victorialis* var. *platyphyllum*)23
 20611 イトラッキョウ(*Allium virgunculae*)(10-20、ピンク、平戸島のみ産す)83
 20613 キイトラッキョウ(*Allium virgunculae* var. *kiiense*)(10-20、赤紫、和歌山岐阜愛知山口に限定、絶滅危惧II類)37
 20614 コシキイトラッキョウ(*Allium virgunculae* var. *koshikiense*)(絶滅危惧IB類)41,45,81
 20619 タムムラサキ(*Allium pseudojaponicum*)(10-30、紫、鹿児島奄美大島、海岸近く)[長崎県由来]18,81
 20643 キルタンツス パルビフローラ(*Cyrtanthus prviriflora*)(30、朱赤)60
 20670 ハブランツス アンダーソニー(*Habranthus andersonii*)(15-25、橙)4,50
 20694 ハエマンサス アルビフロス(マユハケオモト)(*Haemanthus albiflos*) (白)33
 20711 アマリリス「ルドウィヒス スカーレット」(*Hippeastrum* x '*Ludwing's Scarlet*')(80、赤花、交配種)1
 20756 ショウキズイセン(*Lycoris aurea*)(30-60、鮮黄、橙黄)84
 20776 ナルキスス ブルボコディウム(*Narcissus bulbocodium*)(10-20、黄、地中海沿岸原産)[春の交換会から]85

- 20797 ナルキスス カンタブリクス(*Narcissus cantabricus*)(白、細い葉、冬咲き、スペイン西部から北アフリカ)16
- 20800 ナルキスス カンタブリクス モノフィルス(*Narcissus cantabricus* ssp. *monophyllus*)(石灰岩台地)16
- 20840 ナルキスス セロチヌス(*Narcissus serotinus*)(白、秋咲き)4
- 20903 サフランモドキ(*Zephyranthes carinata* Herb)(30、淡いピンク)1,4
- 20904 ゼフィランテス キトリナ(*Zephyranthes citrina*)(50、黄、半耐寒性)1
- 20915 ゼフィランテス リンドレヤナ(*Zephyranthes lindleyana*)(20、オレンジ?(淡桃))25
- 【ヒノキ科】-----
- 20973 ハイネズ(*Juniperus conferta*)[神津島由来]60
- 【ヒメハギ科】-----
- 21021 ポリガラ アマラ(*Polygala amara*)(5、青紫、ヨーロッパ中東部)[春の交換会から]62
- 【ヒユ科】-----
- 21110 ノゲイトウ(*Celosia argentea*)(50-100、淡紅→白、一年草、熱帯アジア原産、関東以西で野生化)39
- 【ヒルガオ科】-----
- 21200 マルバルコウ(マルバルコウソウ、ツタノハルコウ)(*Ipomoea (Quamoclit) coccinea*)(ツル、濃橙、一年草、中央アメリカ原産、帰化植物)54,78
- 21204 マメアサガオ(*Ipomoea (Quamoclit) lacunosa*)(ツル、白淡紫、帰化植物)36,38
- 21209 アサガオ(茎なし)(*Ipomoea (Quamoclit) nil* very short type)(15、濃ピンク白縁)14,84
- 21212-W (W)ゲンバイヒルガオ(*Ipomoea (Quamoclit) pes-caprae*)[宮崎県]36
- 21213-1 マルバアサガオ(園芸種ミルキーウェイ)(*Ipomoea (Quamoclit) purpurea 'Milky way'*)(白地にピンク)39
- 21216 ホシアサガオ(*Ipomoea (Quamoclit) triloba*)(熱帯アメリカ原産、1年草、帰化植物)54
- 21217 アサガオ(矮性)(*Ipomoea (Quamoclit) nil*)6
- 21218 アサガオ(牡丹咲き、ピンクフラミンゴ)(*Ipomoea (Quamoclit) nil*)(ピンク)54
- 【フウチョウソウ科】-----
- 21260 フウチョウソウ(クレオメ)(*Cleome hassleriana*)(100、紅紫、熱帯アメリカ原産、南西諸島で野生化)76
- 【フウロソウ科】-----
- 21310 ゲラニウム キネレウム サブコウレスケンス(*Geranium cinereum* ssp. *subcaulescens*)(赤紫、)23
- 21319 タカネグンナイフウロ(*Geranium eriostemon* var. *reinii* f. *onoei*)(30-50、青紫、本州中部、亜高山帯から高山帯)85
- 21345 ゲンノショウコ(赤)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*)(30-50、赤、北海道から沖縄)1,15,45
- 21345-1 ゲンノショウコ(絞り咲き)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*)62
- 21345-2 ゲンノショウコ(白)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*)(30-50、白、北海道から沖縄)1
- 21345-3 ゲンノショウコ(白に緑色花)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*)79
- 21411 アサマフウロ(*Geranium soboliferum*)(30-50、赤紫濃い、茎直立する)85
- 【ベンケイソウ科】-----
- 21930 チアストフィルム オポシティブオリウム、ホザキベンケイソウ(通称)(*Chiastophyllum oppositifolium*)(10、コーカサス原産)23
- 21940 ヒダカミセバヤ(*Hylotelephium caucicola*)(5-15、赤、葉はミセバヤより縦長、北海道の固有種)5
- 21942 ベンケイソウ(*Hylotelephium erythrostictum*)48,51
- 21947 ミセバヤ(*Hylotelephium sieboldii*)(40、淡紅、絶滅危惧 I B類)1
- 21990-W (W)ツメレンゲ(*Orostachys erubescens*)(白、開花した株は枯死するが子株が出来る)67
- 22057 セダム カムチャツカム(エゾノキリンソウ)(*Sedum kamtschaticum*)[手稲山由来]23
- 【ホシクサ科】-----
- 22189 シラタマホシクサ(*Eriocaulon nudicuspe*)(15-40、白、1年草、静岡愛知三重、絶滅危惧 II 類)9,37,45
- 22193 クロホシクサ(*Eriocaulon parvum*)(10-20、黒藍、一年草、本州から九州、絶滅危惧 II 類)[少量]9,45

—————【ボタン科】—————

- 22233 ヤマシャクヤク(*Paeonia japonica*)(30-50、白、関東から九州)23,43,62,85
 22233-W (W)ヤマシャクヤク(*Paeonia japonica*)(30-50、白)[長野県]19
 22233-W1 (W)ヤマシャクヤク(*Paeonia japonica*)(30-50、白)[滋賀県]6
 22233-3W ヤマシャクヤク(多重弁)(*Paeonia japonica*)(30-50、白、関東から九州)[滋賀県]6
 22233-5 ヤマシャクヤク(混合、栗駒紅、炎含む)(*Paeonia japonica*)13
 22233-6 ヤマシャクヤク(混合)(*Paeonia japonica*)13
 22234 ヤマシャクヤク(ピンク花)(*Paeonia japonica* pink fl.)28
 22247 ベニバナヤマシャクヤク(*Paeonia obovata*)(40-50、赤 果皮を取って播種、2年目に発芽、絶滅
 危惧Ⅱ類)9,13,23,25,43,54,67,75
 22259 ボタン(*Paeonia suffruticosa*)(赤)[保湿種子]1

—————【マツ科】—————

- 22454 ダイオウマツ(*Pinus palustris*)6

—————【マツブサ科】—————

- 22320-W (W)サネカズラ (ヒナンカズラ)(*Kadsura japonica*)(ツル、木本、常緑、赤実、関東以西)[山口
 県]54

—————【マメ科】—————

- 22548 ゲンゲ(通称:レンゲ、レンゲソウ)(*Astragalus sinicus*)(25、赤、播種は秋の彼岸ごろ(関東標
 準))48
 22549 ゲンゲ白花(通称:レンゲ、レンゲソウ白花)(*Astragalus sinicus* white fl.)(25、白、播種は秋の彼
 岸ごろ(関東標準))4
 22575-W (W)ジャケツイバラ(*Caesalpinia decapetala* var. *japonica*)(100-200、黄、ツル植物、宮城以南か
 ら南西諸島)[山口県]54
 22580 ウナンハギ(通称?)(*Campylotropis polyantha*)(白とピンク、四季咲き、中国原産)63
 22640 ハナズオウ(ハナスオウ)(*Cercis chinensis*)(300、紅、中国原産)1
 22722 タヌキマメ(*Crotalaria sessiliflora*)(40、青、一年草、本州から沖縄)8,15,30,46,49,50,54
 22780 フジカンゾウ(*Desmodium oldhamii*)(50-150、赤、本州から九州)18,54
 22801 ノアズキ(*Dunbaria villosa*)(ツル、黄、本州から九州、日当たり)1
 22884 クロダイズ?(*Glycine max* 'Nigra')[交換会注:かなり小粒、野菜の種子]20
 22884-1 クロダイズ?(*Glycine max* 'Safir')[交換会注:かなり小粒、野菜の種子]20
 22943 コマツナギ(*Indigofera pseudotinctoria*)(80-150、落葉小低木、赤)15,16,22
 22944 コマツナギ(白)(*Indigofera pseudotinctoria* white fl.)(80-150、落葉小低木、白)15,16
 23031-W (W)ヤマハギ(*Lespedeza bicolor*)(100-150、ピンク、北海道から九州)[愛知県]1
 23062 マキエハギ(*Lespedeza virgata*)(40-60、白、本州から沖縄)15,63
 23075 ミヤコグサ(*Lotus corniculatus* var. *japonicus*)(10、黄、北海道から南西諸島、元来は帰化植
 物)[ヒメミヤコグサの名称で提供]23
 23204 レブンソウ(*Oxytropis megalantha*)(10-20、濃赤紫、絶滅危惧ⅠB類)45
 23221 マシケゲンゲ(*Oxytropis shokanbetsuensis*)(8-15、赤紫、北海道増毛山地の固有種、絶滅危
 惧ⅠB類)85
 23320 トキリマメ(*Rhynchosia acuminatifolia*)(ツル、黄、関西以西から九州、タンキリマメに比べて葉
 の下半分の幅が広い)1
 23322 タンキリマメ(*Rhynchosia volubilis*)(ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下
 半分の巾が狭い)15,63
 23322-W (W)タンキリマメ(*Rhynchosia volubilis*)(ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の
 下半分の巾が狭い)[大阪府]37
 23423 センダイハギ(*Thermopsis lupinoides*)(30-80、紫、海岸の砂地や草地、内陸低地の草原などに
 群生)31,78
 23522 アカササゲ(*Vigna vexillata* var. *tsusimensis*)(ツル、薄紫、絶滅危惧種ⅠA類)71
 23530 ヤマフジ(*Wisteria brachybotrys*)45

—————【マンサク科】—————

- 23560 マンサク(*Hamamelis japonica*)(落葉小高木、黄、本州から九州)82

—————【ミカン科】—————

- 23590 マツカゼソウ(*Boenninghausenia japonica*)(40、白)74

- 23590-W (W)マツカゼソウ(*Boenninghausenia japonica*)(40、白)[愛知県]1
 23682 アサクラザンショウ(*Zanthoxylum piperitum* f. *inermis*)(サンショウより、実が大きく刺の少ない変種、雌雄異株) 34
- 【ミズアオイ科】-----
- 23710 ミズアオイ(*Monochoria korsakowii*)(青、一年草、水田・沼地、常時水要)[乾燥種子]34,51
 23710-1 ミズアオイ(白)(*Monochoria korsakowii*)(白、一年草、水田・沼地、常時水要)[播種、育苗方法はメモで同封]83
- 【ミズキ科】-----
- 23730 ヤマボウシ(*Benthamidia japonica*)(500-1000、落葉小高木、薄黄、本州から九州)1
 23741 エゾゴゼンタチバナ(*Chamaepericlymenum suelicum*)(5-20、白紫、大雪山、釧路根室)17
 23754 コルヌス マス(コーネリアンチェリー)(*Cornus* (*Benthamidia*) *mas*)(黄 果実は赤、)20
 23755 サンシュユ(*Cornus* (*Benthamidia*) *officinalis*)(落葉小高木、黄、日本原産ではない中国朝鮮から江戸期に入る)1
- 【ミツバウツギ科】-----
- 23862 ミズネコノオ(*Eustellaris stellata*)62
- 【ムクロジ科】-----
- 24063 ミヤサマカエデ(*Acer buergerianum* var. *formosanum*)(盆栽用)[種子交換会注:乾燥種子]6
 24080 フウセンカズラ(*Cardiospermum halicacabum*)(ツル、白、一年草)1
 24351 ヤマルリソウ(*Omphalodes japonica*)[春の交換会から]1
- 【メギ科】-----
- 24440 サンカヨウ(*Diphylleia grayi*)(30-60、白、北海道から中部、山地)[保湿種子]85
 24491 タツタソウ(*Jeffersonia dubia*)(20-25、淡い紫、早春に咲く、朝鮮半島原産)[種子交換会注:乾燥種子]43,75
 24491-1 タツタソウ(斑入り)(*Jeffersonia dubia*)(20-25、早春に咲く、)[種子交換会注:乾燥種子]75
 24491-2 タツタソウ(白花)(*Jeffersonia dubia*)(20-25、早春に咲く、)[種子交換会注:乾燥種子]75
 24514 斑入りハッカクレン交配種(♂♀どちらも斑入り)(*Podophyllum pleianthum* x *versible*)[♂ *versible*]12
 24515 斑入りハッカクレン交配種(♂♀どちらも斑入り)(*Podophyllum versible* x *pleianthum*)[♂ *pleianthum*]12
 24520 トガクシショウマ(*Ranzania japonica*)(30-60、赤紫、白実、本州中部、北部、多雪地帯)[保湿種子]62
 24520d トガクシショウマ(*Ranzania japonica*)(30-60、赤紫、白実、本州中部、北部、多雪地帯)[種子交換会注:乾燥種子]75
- 【モウセンゴケ科】-----
- 24555 イトバモウセンゴケ(*Drosera filiformis*)(10-40、淡いピンク、北アメリカ原産)[種子交換会注:少量、種子とゴミの分離が困難]9
- 【モクレン科】-----
- 24694 タムシバ(*Magnolia salicifolia*)[種子は干しぶどう状]6
 24695 オオヤマレンゲ(*Magnolia seiboldii* ssp. *japonica*)(200-500、落葉低木、白、関東から九州)85
- 【ヤマゴボウ科】-----
- 25000 ジュズサンゴ(*Rivina humilis*)(30、紅)48
- 【ヤマノイモ科】-----
- 25026-B ヤマノイモ(ムカゴ)(*Dioscorea japonica*)(ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州)1
- 【ユキノシタ科】-----
- 25145 ヒトツバシヨウマ(*Astilbe simplicifolia*)(10-30、白)29
 25209 ネコノメソウ(*Chrysosplenium grayanum*)(5-20、淡黄、本州から北海道)[春の交換会から]1
 25264 チャルメルソウ(*Mitella furusei* var. *subramosa*)(20-40、紅紫、本州中部から九州、湿地)[春の交換会から]1,63
 25266 オオチャルメルソウ(*Mitella japonica*)(20-50、赤紫、近畿四国九州)[春の交換会から]15
 25267 ツクシチャルメルソウ(*Mitella kiusiana*)(20-30、淡い黄緑、九州)[春の交換会から]63
 25272 タキミチャルメルソウ(*Mitella stylosa*)(20-30、紅紫、鈴鹿山脈)[春の交換会から]63

- 25300 ヤワタソウ(*Peltoboykinia tellimoides*)(30、黄)68
 25301 ワタナベソウ(*Peltoboykinia watanabei*)(30、黄緑、四国九州の深山、絶滅危惧Ⅱ類)5,64,85
 25310 タコノアシ(*Penthorum chinense*)(50-70、黄緑)15,74
 25321 ヤグルマソウ(*Rodgersia podophylla*)(80-100、白、矢車に似た葉)85
 25342 キバナシコタンソウ(*Saxifraga bronchialis* subsp. *funstonii* var. *rebunshirensis* f. *flava*)(3-12、薄黄)23
 25361 ジンジソウ(*Saxifraga cortusaefolia*)(20、白、薄桃、関東地方以西から九州まで)15
 25378-W (W)ダイモンジソウ(*Saxifraga fordunei* var. *incislobata*)(10、白、関東以西九州まで)[愛知県]1
 25378 ダイモンジソウ(*Saxifraga fordunei* var. *incislobata*)(10、白、関東以西九州まで)[細弁、小輪、多花性]15
 25380 イズノシマダイモンジソウ(*Saxifraga fortunei* var. *crassifolia*)(20-25、白、伊豆七島、千葉県南部)72
 25482 サキシフラガ ウンブローサ(紅花)(別名ハルサメソウ)(*Saxifraga umbrosa rosea*)(15-30、薄紅)23
 25542 ズダヤクシュ(*Tiarella polyphylla*)(10-20、白、山地や亜高山の林床/林縁)46

-----【ユリ科】-----

- 25841-1 ウバユリ(紅花選抜種)(*Cardiocrinum cordatum*)36
 25841-W (W)ウバユリ(*Cardiocrinum cordatum*)(100-150、淡青白、地植え向き。一回結実型多年草、日本固有種、宮城より九州)[新潟県]78
 25861-W (W)ツバメオモト(*Clintonia udensis*)(30、白、瑠璃色実、北海道から近畿の山地、亜高山)[福井県]31
 25920 フリチラリア アクモペタラ(*Fritillaria acmopetala*)(30-70、花外部/灰色、内部/黄)[春の交換会から]63
 25931 フリチラリア ビシニカ(*Fritillaria bithynica*)4
 25949 フリチラリア グラエカ(*Fritillaria graeca*)4
 26215 ヤマユリ(*Lilium auratum*)(100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿)62,67,82
 26215-E ヤマユリ(山形県由来)(*Lilium auratum*)(100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿)51
 26215-E1 ヤマユリ(*Lilium auratum*)(100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿)[ハヶ岳東麓由来]64
 26215-W (W)ヤマユリ(*Lilium auratum*)(100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿)[宮城県]13
 26215-W1 (W)ヤマユリ(*Lilium auratum*)(100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿)[茨城県]71
 26223 ノヒメユリ(スゲユリ)(*Lilium callosum*)(40、黄赤、絶滅危惧ⅠB類)15,18
 26223-B ノヒメユリ(スゲユリ)(球根)(*Lilium callosum*)(40、黄赤、絶滅危惧ⅠB類)[実生2年(発芽1年後)]5
 26235 ヒメユリ(*Lilium concolor* var. *partheneion*)(40、緋色～橙赤、絶滅危惧ⅠB類)12
 26255-B ササユリ(球根)(*Lilium japonicum*)(50-80、白～ピンク、日本固有種、中部から九州)[実生3年(発芽2年後)]5
 26255 ササユリ(*Lilium japonicum*)(50-80、白～ピンク、日本固有種、中部から九州)62
 26259-B1 オニユリ(ムカゴ)(*Lilium lancifolium*)(40-80、朱、北海道から九州、中国原産)77
 26259-B2 オニユリ(八重咲き)(ムカゴ)(*Lilium lancifolium*)62
 26259-B4 オニユリ(ムカゴ)(*Lilium lancifolium*)[葉が笹葉]11
 26260-B オウゴンオニユリ(黄金鬼百合)(ムカゴ)(*Lilium lancifolium* var. *flaviflorum*)(オニユリの黄花変種。対馬特産)[発芽しています]23
 26264-W (W)コオニユリ(*Lilium leichtlinii*)(80、橙、ムカゴは出来ない、北海道から九州)[長野県]67
 26271-E イワユリ(スカシユリの日本海側個体群)(*Lilium maculatum*)(20-60、橙、日本海側)[新潟県由来]51
 26306 ヒメサユリ(*Lilium rubellum*)(30-80、ピンク、山形福島新潟)17,25,62,75,78
 26306-1 ヒメサユリ(白花種×ピンク普通種)(*Lilium rubellum*)[新潟県下越地方由来×産地不明の白]83
 26306-W (W)ヒメサユリ(*Lilium rubellum*)(30-80、ピンク、山形福島新潟)[山形県]61
 26309 カノコユリ(*Lilium speciosum*)(100-150、白からピンク、四国九州、絶滅危惧Ⅱ類)34
 26309-E カノコユリ(甌島由来)(*Lilium speciosum*)(100-150、白からピンク、四国九州、絶滅危惧Ⅱ類)80
 26310-W (W)タキユリ(*Lilium speciosum* var. *clivorum*)(50、ヤマユリのピンクに近い色、四国のカノコユリ、絶滅危惧Ⅱ類)[高知県]69
 26552-1 シロバナヤママジノホトギス(斑入り素心)(*Tricyrtis affinis* f. *albida*)(30-80、白)[保湿種子]23
 26553 キバナノホトギス(*Tricyrtis flava*)(10、黄、花梗は長い、宮崎のみ、絶滅危惧Ⅱ類)5

- 26556 ホトギス(*Tricyrtis hirta*)(30-50、白地に赤紫斑点、日本固有種、北海道から九州)1
 26556-3 ホトギス(色混合)(*Tricyrtis hirta*)55
 26556-W (W)ホトギス(*Tricyrtis hirta*)(30-50、白地に赤紫斑点、日本固有種、北海道から九州)[愛知県]1
- 26560 ホトギス「紫酔」(*Tricyrtis hirta* 'Shisui')42
 26565 ホトギス(白)(*Tricyrtis hirta* white fl.)(50、白)27
 26566 サガミジョウロウホトギス(*Tricyrtis ishiana*)(30-60、黄、花の内面に赤紫の斑点、絶滅危惧 I B類)83
- 26572 キイジョウロウホトギス(*Tricyrtis macranthopsis*)(40-80、黄、葉は茎を抱き込んでいる、絶滅危惧 II 類)62
 26576 チャボホトギス(*Tricyrtis nana*)(10、黄、東海から屋久島)5,36
 26578 キバナノツキヌキホトギス(*Tricyrtis perfoliata*)(25-30、黄色平開 枝垂れ、絶滅危惧 I B類)5,42
- 26583 ホトギス「妖精」(*Tricyrtis* 'Yosei')(白地に赤紫)45
- 【ラン科】-----
- 26764 シラン(*Bletilla striata*)(30-40、紫、最も丈夫な野生ランの一つ) 1,82
 26764-2 シラン(紫式部)(*Bletilla striata*)[少量]69
 26784 ムギラン(*Bulbophyllum inconspicuum*)(着生ラン)4
 26837 サルメンエビネ(*Calanthe tricarinata*)(40、黄緑一唇弁赤褐色、北海道、本州(亜高山)、絶滅危惧 II 類)13
- 27260 ダイサギソウ(*Habenaria dentata*)(30-70(茎)、白、絶滅危惧 I B類)16
 27352-W (W)コ克蘭(*Liparis nervosa*)(15、黒紫、茨城以南四国九州)[愛知県]1
 27580-3B サギソウ(変異種、側裂片が短い)(球根)(*Pecteilis radiata*)64
 27662-B1 タイリントキソウ交配種「女峰」白覆輪(*Pleione bulbocodioides* 'Nyoho')[ムカゴ]44
- 【リンドウ科】-----
- 27930 コマチリンドウ(ケンタウリウム コンフェルトム)(*Gentiana chloodes*(*confertum*))(5-10、ピンク、ヨーロッパ)4
 27960 ゲンチアナ アコーリス(チャボリンドウ)(*Gentiana acaulis*)(5-10、濃い青、*Gentiana kochiana*の古い名前、ヨーロッパアルプス他)23
- 27969-W (W)トウヤクリンドウ(*Gentiana algida*)(10-30、薄黄、中部以北か北海道、高山帯)[山梨県]78
 28036-W (W)オヤマリンドウ(*Gentiana makinoi*)[長野県]67
 28077 リンドウ(*Gentiana scabra* var. *buergeri*)(20-100、青紫、本州から九州)61
 28077-W (W)リンドウ(*Gentiana scabra* var. *buergeri*)(20-100、青紫、本州から九州)[山口県]54
 28086-W (W)アサマリンドウ(*Gentiana sikokiana*)(20、青、紀伊半島南部、中国、四国、九州)[高知県]36
 28086-W1 (W)アサマリンドウ(*Gentiana sikokiana*)(20、青、紀伊半島南部、中国、四国、九州)[高知県2]81
- 28091 コケリンドウ(*Gentiana squarrosa*)(3-10、薄紫、2年草、北海道から九州)22
 28112 エゾリンドウ(*Gentiana triflora* var. *japonica*)(30-100、青紫、日本原産、北海道から近畿以北、山地の湿地帯)23
 28115 エゾオヤマリンドウ(*Gentiana triflora* var. *japonica* f. *montana*)(30-40、青紫、中部以北から北海道、亜高山)23
- 28180-W (W)ハナイカリ(*Halenia corniculata*)[長野県]67
 28211 アケボノソウ(*Swertia bimaculata*)(40-50、白地に点、越年草、北海道から九州)4,15
 28211-W (W)アケボノソウ(*Swertia bimaculata*)(40-50、白地に点、越年草、北海道から九州)[長野県]67
 28211-W1 (W)アケボノソウ(*Swertia bimaculata*)(40-50、白地に点、越年草、北海道から九州)[茨城県]71
 28215-W1 (W)センブリ(*Swertia japonica*)(10-30、白、越年草、北海道から九州)[茨城県]71
 28215-W2 (W)センブリ(*Swertia japonica*)(10-30、白、越年草、北海道から九州)[東京都]78
 28215-W3 (W)センブリ(*Swertia japonica*)(10-30、白、越年草、北海道から九州)[山口県]54
 28221 ソナレセンブリ(*Swertia noguchiana*)(5-15、白、薄い青の筋、2年草、絶滅危惧 II 類)61
 28227-W (W)ムラサキセンブリ(*Swertia pseudochinensis*)(15、紫)[山口県]54
 28241-W (W)ツルリンドウ(*Tripterospermum japonicum*)(ツル、淡い紫、赤実、北海道から九州)[山形県]51
 28241-W1 (W)ツルリンドウ(*Tripterospermum japonicum*)(ツル、淡い紫、赤実、北海道から九州)[山口県]54

—————【レンブクソウ科】—————

- 28283-1 ガマズミ(黒実)(*Viburnum dilatatum*)[種子は干しぶどう状]6
 28307 フウリンガマズミ(*Viburnum setigerum*)(200-300、白、赤実、中国原産)15
 28314-W (W)ミヤマガマズミ(*Viburnum wrightii*)(200-400、白、赤実、北海道・本州・四国・九州)[保湿種子][長野県]85
 28314-W1 (W)ミヤマガマズミ(*Viburnum wrightii*)(200-400、白、赤実、北海道・本州・四国・九州)[干しぶどう状][山形県]51

—————【ロウバイ科】—————

- 28350 ロウバイ(*Chimonanthus praecox*)(落葉低木、黄、中国原産)50
 28351 マンゲツロウバイ(ロウバイの園芸種)(*Chimonanthus praecox* 'Mangetsu')27