

番号

## -----【アオイ科】-----

- 00001 トロロアオイ(*Abelmoschus manihot*) (150-、薄黄、温暖地では多年草) 3,77  
 00025 カラスノゴマ(*Corchoropsis tomentosa*) (40、黄、1年草) 25,78  
 00031 タイワンツナソ(アラビア名モロヘイヤ)(*Corchorus olitorius*) (野菜) 14  
 00035 ワタ(*Gossypium arboreum*) (70、) 7  
 00036 チャワタ(*Gossypium* ssp.) (キツネ色の綿毛 黄色) 19  
 00051 モミジアオイ(*Hibiscus coccineus*) (100-200、真紅、北米原産) 24  
 00053 ハマボウ(*Hibiscus hamabo*) (200-400、黄、木、実生4年で開花) 93  
 00059 フヨウ(*Hibiscus mutabilis*) (150-300、ピンク、白) 42  
 00060 スイフヨウ(*Hibiscus mutabilis* 'Versicolor') (150-300、白他、フヨウより寒さに弱い) 3  
 00063 ローゼル(*Hibiscus sabdariffa*) (100-200、クリームに暗赤、茎が赤、アフリカ西南部原産、ハーブティーの材料) 3  
 00063-1 白ローゼル(*Hibiscus sabdariffa*) (100-200、クリーム、茎は赤くない、アフリカ西南部原産、ハーブティーの材料) 3  
 00110 ヤノネボンテンカ(タカサゴフヨウ)(*Pavonia hastata*) (30-50、白、赤目、南米原産帰化植物(暖地)) 31

## -----【アカネ科】-----

- 00286 クチナシ(*Gardenia jasminoides*) (100-300、常緑低木、白、静岡以西) 3

## -----【アカバナ科】-----

- 00460s クラーキア ブリュアリー(カリフォルニア フェアリー フェーン)(*Clarkia breweri*) (10-20、ピンク、秋まき越年草(日本)、カリフォルニア固有種)[春の交換会より] 72  
 00503-1 ヒメヤナギラン(細葉タイプ)(*Epilobium latifolium*) (30、赤) 26  
 00509 アカバナ(*Epilobium pyrricholophum*) (15-90、紅紫、北海道から九州) 5  
 00602 キダチキンバイ(*Ludwigia octovalvis* var. *sessiliflora*) (100-200、黄、茎は木質化する、湿地を好む、沖縄) 14  
 00629 マツヨイグサ(*Oenothera stricta*) (北アメリカからの帰化植物) 9  
 00633 オエノテラ テトラプテラ(ツキミソウ)(*Oenothera tetraptera*) (20-60、白、江戸期渡来、繁殖力はそれほど強くない) 14

## -----【アケビ科】-----

- 00660 ムベ(*Stauntonia hexaphylla*) (ツル500以上、常緑木本、耐寒性は強くない) 71

## -----【アサ科】-----

- 00665 エゾエノキ(*Celtis jessoensis*) (落葉高木、20-30m、北海道から九州) 41

## -----【アジサイ科】-----

- 00680-W (W)クサアジサイ(*Cardiandra alternifolia*) (30、桃、本州(宮城県以南)、四国、九州)[愛知県] 3  
 00700-W (W)ウツギ(*Deutzia crenata*) (200-400、白、落葉低木、北海道南部から九州)[長野県] 9  
 00700-W1 (W)ウツギ(*Deutzia crenata*) (200-400、白、落葉低木、北海道南部から九州)[愛知県] 3  
 00751-6 ヤマアジサイ(園芸種、伊予の薄墨のセルフ)(*Hydrangea serrata*) [交換会注:母種と同じ花が咲くとは限らない] 23  
 00751-W (W)ヤマアジサイ(*Hydrangea serrata*) (関東以西四国九州、千島台湾中国南部にも)[愛知県] 3  
 00770 キレンゲシヨウマ(*Kirengeshoma palmata*) (60-100、黄、紀伊、四国、九州の山地に分布、絶滅危惧Ⅱ類) 4,11,84,95

## -----【アブラナ科】-----

- 00941 アラビス カエルレア(*Arabis caerulea*) (5-10、白、ヨーロッパアルプス) 84  
 00953s スズシロソウ(*Arabis flagellosa*) (10-20、白、近畿以西から琉球まで)[春の交換会より] 73  
 00957 ハタザオ(*Arabis glabra* (NET)) (50、白、二年草稀に多年草、北海道から九州) 3  
 00965s ミヤマハタザオ(*Arabis lyrata* ssp. *kamtschatica*) (10-30、白、北海道、本州(中部地方)) (春の交換会より) 73  
 00981 ダイセンハタザオ(*Arabis* sp.) (15-20、白) 73  
 01055-1 ナズナ(薄いピンク花)(*Capsella bursa-pastoris*) (10-50、薄いピンク、越年草、別名ペンペン草、春の七草の1種)[鈴鹿山系] 14

- 01176s シリベシナズナ(通称キリギシナズナ)(*Draba igarashii*)(10-20、白、特定国内希少種、絶滅危惧 I A類)[春の交換会より] 74,95
- 01182s キタダケナズナ(ハクホウナズナ)(*Draba kitadakensis*)(10-20、白、南アルプス、奥秩父、絶滅危惧 I B類)[春の交換会から] 84
- 01215 トガクシナズナ(*Draba sakuraii*)(10、白、本州中部、絶滅危惧 I B類) 14
- 01218 シロウマナズナ(*Draba shiroumana*)(10、白、中部地方の高山、亜高山、絶滅危惧 I B類) 14
- 01218s シロウマナズナ(*Draba shiroumana*)(10、白、中部地方の高山、亜高山、絶滅危惧 I B類)[春の交換会より] 74,84
- 01238 ヒメナズナ(*Draba verna*)(20-25花径、白、ヨーロッパ、帰化植物) 10  
-----【アヤメ科】-----
- 01601 アノマテカ ディバリカタ(*Anomatheca divaricata*)(=ラペイロウシア(*Lapeirousia*)アヤメ科) 38
- 01602 アノマテカ グランデフローラ(*Anomatheca grandiflora*)(10-15、赤、*Freesia grandiflora*ともいう) 38
- 01632 バビアナ ストリクタ(*Babiana stricta*)(10-30、紫、南アフリカ、USDAゾーン8-10) 1
- 01790 ヒメヒオウギ(フリーシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(*Freesia laxa*)(10-15、中央部赤、半耐寒性、南アフリカ) 3,45
- 01790s ヒメヒオウギ(フリーシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(*Freesia laxa*)(10-15、中央部赤、半耐寒性、南アフリカ)[春の交換会より] 7
- 01790-1 ヒメヒオウギ(フリーシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(色混合)(*Freesia laxa*)(10-15、半耐寒性、南アフリカ) 10
- 01791s ヒメヒオウギ白(フリーシア ラクサ アルバ(旧アノマテカ ラクサ アルバ)(*Freesia laxa alba*)(10-15、白、半耐寒性、南アフリカ)[春の交換会より] 7
- 01792 ヒメヒオウギ赤(フリーシア ラクサ レッド(旧アノマテカ ラクサ レッド)(*Freesia laxa red*)(10-15、赤、半耐寒性、南アフリカ) 3
- 01795 フリーシア ムイリー(*Freesia x muiirii*)(白(黄スポット)、10-20、半耐寒性) 1
- 01870 チリアヤメ(*Herbertia amoena*)(10、青紫、耐寒性は強くない、チリ、アルゼンチン) 1,2,10,13,14,38,79
- 01889 ヘスペランサ ラティフォリア(*Hesperantha latifolia*)(20-30、桃) 1
- 01910 ヒオウギ(*Iris (Belamcanda) chinensis*)(50-100、橙・赤点、耐寒性は比較的ある) 35,40,41,76
- 01946 イリス エンサタ(ハナショウブ)(*Iris ensata*)[園芸品種、白、薄紫] 3
- 01946-1 イリス エンサタ(ハナショウブ)(*Iris ensata*)[伊勢系] 24
- 01948 ノハナショウブ(*Iris ensata* var. *spontanea*)(60-90、紫、耐寒性あり、北海道~九州、水辺湿原) 38
- 01950 イリス フォエティディッシマ(*Iris foetidissima*)(灰青、種子は緋色、独得の臭気) 84
- 01964 カキツバタ(*Iris laevigata*)(50-80、青、紫、白他、水を好む) 3
- 01995 アヤメ(*Iris sanguinea*)(50、青紫、日本全土、山野の草地) 3,82
- 01997-W (W)ヒオウギアヤメ(*Iris setosa*)(30-90、青紫、本州中部以北北海道、本州では高山の湿地、北海道では平地の湿地)[長野県] 84
- 02025 イチハツ(*Iris tectorum*)(30-50、青紫、原産地は中国) 3
- 02062 ラペイロウジア ヤククイニー(*Lapeirousia jacquini*)(10、紫、半耐寒性) 1
- 02063 ラペイロウシア オレオゲナ(*Lapeirousia oreogena*)(-10、濃紫) 1
- 02085 メラスフェルラ ラモサ(*Melasphaerula ramosa*)(クリーム白~黄、花(芳香あり)は小さい、夏眠性、南アフリカ) 1
- 02116s モラエア ビローサ(*Moraea villosa*)(30、紫から各色、南アフリカケープ州、半耐寒性)[春の交換会から] 95
- 02171 ロムレア キトリナ(*Romulea citrina*)(10-15、黄) 1
- 02269 シシリンキウム アイダホエンセ(*Sisyrinchium idahoense*)(20-30、青) 43,71
- 02278 シシリンキウム モンタヌム(*Sisyrinchium montanum*)(10-50、青、北アメリカ北部、ロッキー) 95
- 02303s スパラキス バリエガタ(*Sparaxis variegata*)(20-25、紫、半耐寒性、南アフリカ)[=*Synnotia variegata*春の交換会より] 72  
-----【イグサ科】-----
- 02400 ハリコウガイゼキショウ(*Juncus wallichianus*)(-50、低地の湿地、北海道から琉球) 26  
-----【イソマツ科】-----
- 02451 チシマハマカンザシ(*Armeria armeria* ssp. *arctica*)(10-20、白、赤、北千島) 26  
-----【イチイ科】-----
- 02511 ヒダリマキガヤ(*Torreya nucifera* var. *macrosperma*)(カヤの仲間、本種の実についている筋は左巻きが多い) 14

-----【イヌサフラン科】-----

- 02580 キバナチゴユリ(*Disporum lutescens*)(黄、紀伊半島四国九州、落葉樹林下) 31  
 02581 ホウチャクソウ(*Disporum sessile*)(30-60、白薄緑、北海道から奄美諸島)[果皮剥ぎ保湿種子] 95

-----【イネ科】-----

- 02595 パニカム ビルガツム「チョコラータ」(*Panicum virgatum* 'Chocolata')(100-130、原種の出産地は北アメリカ、耐寒性あり) 14  
 02880 ワイルドオーツ(通称)(*Chasmanthium latifolium*)(70、宿根草、北アメリカ原産) 47  
 02960 ジュズダマ(*Coix lachryma-jobi*)(100、一年草、熱帯アジア原産) 3  
 02970 オガルカヤ(*Cymbopogon tortilis* var. *goeringii*)(100、本州～沖縄、山地) 42  
 03078-1 コメシバ(斑入り)(*Digitaria radicata*)(20-30、本州から沖縄)[虎斑] 14  
 03324 ムギクサ(*Hordeum murinum*)(20-50、一年草もしくは越年草、帰化植物、本州以南に分布) 14  
 03643 アオチカラシバ(*Pennisetum alopecuroides* f. *viridescens*)(50、チカラシバの素心) 5,46  
 03863-W (W)ムラサキエノコロ(*Setaria viridis* purple form *misera*)(30-70、紫(花の先端)、1年草、日本各地)[神奈川] 72

-----【イワタバコ科】-----

- 04270 イワタバコ(*Conandron ramondioides*)(10-30、赤紫(花色に変異多い)、本州(福島以南)、四国、九州) 78  
 04270-W (W)イワタバコ(*Conandron ramondioides*)(15-30、青紫、本州(福島以南)、四国、九州)[愛知県] 3  
 04360 シンニンギア レウコトリカ(*Sinningia leucotricha*)(30、橙、塊根植物、断崖の女王とも呼ばれる)[種子交換会注:播種時、覆土はしない、腰水かラップ掛けで保湿] 10  
 04370-B マツムラソウ(ムカゴ)(*Titanotrichum oldhamii*)(15-30、黄、常緑多年草、湿った岩壁、石垣西表、絶滅危惧 I A類) 93

-----【ウコギ科】-----

- 04413 ウド(*Aralia cordata*)(100-150、白、北海道から九州) 9

-----【ウマノスズクサ科】-----

- 04536 フタバアオイ(*Asarum caulescens*)(淡紫(萼の色)、日本固有種(福島以南～九州)、暗い林床に生える)[保湿種子] 3

-----【ウリ科】-----

- 04755 ゴキヅル(*Actinostemma lobatum*)(ツル、白緑、北海道から九州の水辺) 41  
 04775 オキナワズズメウリ(*Diplocyclos palmatus*)(毒瓜)有毒) 14  
 04800 スズメウリ(*Melothria japonica*)(200、白、灰白(果実1-3)) 3,31  
 04822 カラスウリ(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州) 14  
 04822-W<sub>2</sub> (W)カラスウリ(実が丸形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛知県] 3  
 04822-W<sub>3</sub> (W)カラスウリ(実は長い実形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛知県] 3  
 04822-W<sub>4</sub> (W)カラスウリ(実は俵形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛知県] 3

-----【ウルシ科】-----

- 04856-W (W)ヤマハゼ(*Rhus sylvestris*)(500-800、落葉小高木、関東以西から沖縄)[山口県] 11

-----【オオバコ科】-----

- 04937 矮性黄花ジギタリス「カリヨン」(*Digitalis grandiflora* 'Carillion')(20-40、黄白) 38  
 04955 イワカラクサ(*Erinus alpinus*)(5-20、赤紫、ヨーロッパ原産) 48  
 05053 ペンステモン カエスピトスス(*Penstemon caespitosus*)(8、薄紫) 84  
 05226s テンモクジオウ(*Rehmannia piasezkii*)(20-30、赤紫、耐寒性は強くない、中国原産)(春の交換会より) 2  
 05242 エチゴトラノオ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *kiusianum* ssp. *maritimum*)(50-80、白、中部から東北の日本海側、海岸縁の草地) 5  
 05249 サンイントラノオ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *ogurae*)(15-30、青、絶滅危惧 II 類、島根県) 14,17  
 05251 トウテイラン(白花)(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *ornatum* white fl.)(40-50、白、絶滅危惧 II 類)[少量] 20

- 05252 ヤマトラノオ(*Veronica (Pseudolysimachion) rotundum*)(40-90、青紫、本州から九州北部) 95  
 05260 バンダイクワガタ(*Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum ssp. senanense f. bandaiana*) (15-25、薄い紫)[少量] 95  
 05261 ダイセンクワガタ(*Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum ssp. senanense f. daisenense*) (10、青) 84  
 05263 シラガミクワガタ(*Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum ssp. senanense var. shiragamiense*) (10、青、ミヤマクワガタの変種、白神山地) 84  
 05270 ハマトラノオ(*Veronica (Pseudolysimachion) sieboldianum*)(20-40、青、鹿児島、沖縄、絶滅危惧Ⅱ類) 17,30,43,88  
 05272 ルリトラノオ(*Veronica (Pseudolysimachion) subsessile*)(100-120、薄い紫、本州、絶滅危惧Ⅱ類) 24  
 05357 クガイソウ(*Veronicastrum sibiricum ssp. japonicum*)(50、紫、本州、日当たりのよい草地や林の縁) 38  
 05358 ナンゴククガイソウ(*Veronicastrum sibiricum ssp. japonicum var. australe*)(80-130、淡紫、紀伊半島四国九州、絶滅危惧Ⅱ類) 38

-----【オシロイバナ科】-----

- 05435-1 オシロイバナ(赤)(*Mirabilis jalapa*)(20-60、赤) 3  
 05435-2 オシロイバナ(白)(*Mirabilis jalapa*)(20-60、白) 3

-----【オトギリソウ科】-----

- 05440 ヒペリクム アンドロサエムム(コボウズオトギリ(通称))(*Hypericum androsaemum*)(30-100、黄、半落葉小低木、欧州、北米に広く分布) 3  
 05443 トモエソウ(*Hypericum ascyron*)(50-130、黄、北海道から九州、日当たりの良い草地) 75,86,95  
 05455 オトギリソウ(*Hypericum erectum*)(40、黄、北海道から九州、草地) 3  
 05455-W (W)オトギリソウ(*Hypericum erectum*)(40、黄、北海道から九州、草地)[山口県] 11  
 05497 サマニオトギリ(*Hypericum samaniense*)(15-30、黄、アポイ岳) 84  
 05507 ダイセツヒナオトギリ(*Hypericum yojiroanum*)(6、黄、大雪山(地熱のある所)、絶滅危惧Ⅱ類) 74

-----【オミナエシ科】-----

- 05524 オミナエシ(*Patrinia scabiosifolia*)(60-100、黄、日当たりの良い山地、北海道から九州) 3,24  
 05524-W (W)オミナエシ(*Patrinia scabiosifolia*)(40-100、黄)[長野県] 9  
 05532 オトコエシ(*Patrinia villosa*)(50-100、白、厚蒔きにする) 47  
 05532-W (W)オトコエシ(*Patrinia villosa*)(50-100、白、北海道から九州、日当たりの良い草地等、)[山口県] 11  
 05533 オトコオミナエシ(*Patrinia x hybrida*)(60-100、白から黄、オミナエシとオトコエシの自然交雑種)84  
 05542 ツルカノコソウ(*Valeriana flaccidissima*)(20-40、白、花後に細長い走出枝をだす、本州九州、山地の木陰) 13

-----【オモダカ科】-----

- 05560 マルバオモダカ(*Caldesia parnassiifolia*)(白、水生植物、絶滅危惧Ⅱ類) 41  
 05570-B オモダカ(八重咲き)(球根)(*Sagittaria trifolia 'Plena'*)(園芸品種) 3

-----【カタバミ科】-----

- 05593-1 ベニバナヒヨウノセンカタバミ(*Oxalis acetosella var. longicapsula*)(5-20、紅) 1

-----【カヤツリグサ科】-----

- 05741 ジョウロウスゲ(*Carex capricornis*)(30-60、北海道、本州(関東以北)絶滅危惧Ⅱ類) 38  
 05797 イガグリスゲ(*Carex grayi*)(湿生植物、北アメリカ東部原産) 13,38  
 05858 ミタケスゲ(*Carex michauxiana var. asiatica*)(標高の高い高層湿原) 26  
 06013 ヒメクグ(*Cyperus brevifolius subsp. leirolepis*)(10-20、多年草、湿地、北海道から九州) 71  
 06159 オオイヌノハナヒゲ(*Rhynchospora fauriei*)(30-70、北海道から中国、山地亜高山、湿地) 26  
 06173 カンガレイ(*Schoenoplectus triangulatus*)(50-120、湿地、北海道から九州) 41  
 06194s コウキヤガラ(*Scirpus maritimus*)(水田の難防除雑草とされる。栽培に注意)[春の交換会より] 6

-----【キキョウ科】-----

- 06257 ヒメシャジン(*Adenophora nikoensis*)(10-40、青、日本固有種、東北地方南部から中部地方)[少量] 95  
 06264 ヒメイワシャジン(ブコウイワシャジン)(*Adenophora nikoensis var. persicaria*)(10-20、青) 74  
 06265 ミョウギシャジン(*Adenophora nikoensis var. petrophila*)(20-40、淡紫、本州(中部地方以北)から北海道(西南部)) 74  
 06273 ケモイワシャジン(*Adenophora pereskiaefolia var. heterotricha*)(30-60、青みがかった白、葉の裏側に毛) 84

- 06276 シラトリシャジン(ウリュウシャジン)(*Adenophora pereskiaefolia* var. *uryuensis*) (25、青、北海道雨竜山(蛇紋岩地帯)、絶滅危惧Ⅱ類) 26,84
- 06281 オトメシャジン(*Adenophora puellaris*)(20-60、青、四国(東赤石山)蛇紋岩地帯) 18
- 06282-W (W)ソバナ(*Adenophora remotiflora*)(40-50、紫、本州四国九州、林縁など)[山梨県] 77
- 06288 イワシャジン(*Adenophora takedae*)(30-60、青) 44
- 06288-1 イワシャジン(立性)(*Adenophora takedae*)(青、)[少量] 95
- 06289 イワシャジン(白)(*Adenophora takedae alba*)(3-50、白) 95
- 06291 ホウオウシャジン(*Adenophora takedae* var. *howozana*)(10-20、青、絶滅危惧ⅠB類) 4,26
- 06294 シマシャジン(*Adenophora tashiroi*)(10-30、青、長崎県 平戸五島産、絶滅危惧ⅠB類) 4
- 06301 ハクサンシャジン(タカネツリガネニンジン)(*Adenophora triphylla* var. *hakusanensis*)(20-50、青、日本固有種、北海道から中部、亜高山から高山、礫地) 38,76,95
- 06304 ツリガネニンジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica*)(50-100、青) 24
- 06304-W (W)ツリガネニンジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica*)(50-100、青、北海道から九州、山野や土手)[愛知県] 3
- 06306 シラゲシャジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica* f. *canescens*)(40-90、青、全体に白毛が密生) 26,84
- 06309 ハマシャジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica* f. *rotundifolia*)(40、淡青、ツリガネニンジンの海岸型、本州伊豆諸島) 5
- 06350 カンパヌラ バルバタ(*Campanula barbata*)(30花茎、薄い青、「ミヤマツリガネソウ」とも呼ばれる。ヨーロッパアルプスから、カルパチア山脈) 26
- 06437 イワギキョウ(*Campanula lasiocarpa*) (5-15、青、花に繊毛あり(チシマギキョウにはない)、北海道から中部、高山帯) 26
- 06489 ホタルブクロ(*Campanula punctata*)(50、紫) 3,9
- 06489-3 ホタルブクロ(赤)(*Campanula punctata*) 15
- 06490 ホタルブクロ(白)(*Campanula punctata* f. *albiflora*)(-80、白) 3
- 06494 ヤマホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *hondoensis*)(20-60、薄紫、ホタルブクロの変種、ホタルブクロと違って萼と萼の間に付属片がついていない) 3,15
- 06494-2 ヤマホタルブクロ(濃色)(*Campanula punctata* var. *hondoensis*)(濃いピンク) 3
- 06495 イシダテホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *kurokawae*)(20、灰淡赤、石灰岩地帯、徳島石立山) 4
- 06497 シマホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *microdonta*)(30、白、伊豆諸島に多産、海岸に近い斜面、岩場) 30
- 06505 ハタザオギキョウ(カンパヌラ ラプンクロイデス)(*Campanula rapunculoides*)(50-120、青、ヨーロッパ原産) 10,71,95
- 06601 ツルニンジン(*Codonopsis lanceolata*)(ツル性、青、別名ジイソブ、根は滋養強壮とヘルニア特効薬) 31
- 06601-2 ツルニンジン(素心)(*Codonopsis lanceolata*)[準素心、口紅花、山形県由来] 41
- 06602 ミドリツルニンジン(*Codonopsis lanceolata* f. *emaculata*)(ツル、白、ツルニンジンの素心タイプ) 91
- 06617 バアソブ(*Codonopsis ussuriensis*)(釣鐘花(全体に白、花冠の内側上部は紫色) つる性、絶滅危惧Ⅱ類) 41
- 06617-W (W)バアソブ(*Codonopsis ussuriensis*)(釣鐘花(全体に白、花冠の内側上部は紫色) つる性、絶滅危惧Ⅱ類)[長野県] 78
- 06694 ヤシオネ ラエビス(*Jasione laevis*(=*Jasione perennis*))(20-30、青紫、山地、ヨーロッパアルプス) 26
- 06712 ベニバナサワギキョウ(*Lobelia cardinalis*)(30-40、赤、北アメリカ中・東部原産) 71
- 06719-4 白花サワギキョウ(*Lobelia sessilifolia*)(40-80、白) 24
- 06719-W (W)サワギキョウ(*Lobelia sessilifolia*)(40-80、濃青紫、日本各地、湿地)[長野県] 78
- 06780 キキョウ(*Platycodon grandiflorum*)(30-60、青) 3,80
- 06780-4 キキョウ(八重)(*Platycodon grandiflorum double*)(30-60、青) 37
- 06780-11 キキョウ(白)(*Platycodon grandiflorum white*)(30-60、白) 27
- 06780-12 キキョウ(絞り咲き)(*Platycodon grandiflorum white & blue*)(30-60、青・白) 2,73
- 06780-14 キキョウ(八重、白)(*Platycodon grandiflorum white double*)(30-60、白) 2,71
- 06781 アポイギキョウ(アポイ岳系、紫、)(*Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou'*)(20、青紫) 1,76,77
- 06781-4 アポイギキョウ(ピンク、八重)(*Platycodon grandiflorum 'Apoigikyou pink fls. doble'*) 87
- 【キク科】-----
- 07160 ホソバノギク(*Aster sohayakiensis*)(30-60、白、固有種、紀伊半島、絶滅危惧Ⅱ類)[少量] 95
- 07186 オケラ(*Atractylodes japonica*)(70、白、若菜は山菜になる。本州から九州) 95

- 07325 ポンポンアザミ(*Campuloclinium macrocephalum*)(30-130、ピンク、帰化種、愛知県では栽培を規制している、南アメリカ) 11
- 07552-W (W)ノアザミ(*Cirsium japonicum*)(50-100、赤紫、本州九州)[長野県] 9
- 07630 サワアザミ(*Cirsium yezoense*)(80-200、赤紫、日本海側の地域に分布) 41
- 07780 クサヤツデ(ヨシノソウ)(*Diaspananthus uniflorus*)(40-110、紫、ヤツデのような大きな葉、日本特産) 78
- 07841 ルリタマアザミ(*Echinops ritro*)(60、青花、欧州原産) 39
- 07842 ヒゴタイ(タマアザミ)(*Echinops setifer*)(70-100、青、西日本、九州、朝鮮半島南部、絶滅危惧Ⅱ類) 48
- 07862 ウスベニニガナ(*Emilia sonchifolia*)(30、ピンク) 30
- 07929 ユウバリアズマギク(*Erigeron thunbergii* subsp. *glabratus* f. *haruoi*)(夕張岳、蛇紋岩地) 95
- 07952-W (W)ヒヨドリバナ(*Eupatorium chinense* var. *oppositifolium*)(100-200、日本各地)[山口県] 11
- 07960 ハマサワヒヨドリ(*Eupatorium lindleyanum* var. *yasushii*)(20、白-薄紫、絶滅危惧Ⅱ類) 73
- 08159 ウズラバタンポポ(*Hieracium maeculatum*)(20、黄、紫褐色の斑入り葉) 3
- 08164 ヤナギタンポポ(*Hieracium umbellatum*)(30-120、黄、北海道本州四国、山地、湿気た所) 73
- 08206 エゾコウゾリナ(*Hypochaeris crepidioides*)(30、黄、アポイ岳固有種、絶滅危惧ⅠB類) 26
- 08225-W (W)オグルマ(*Inula japonica*)(20-60、黄、湿地、北海道から九州)[長野県] 9
- 08235s コスギニガナ(*Ixeridium yakuinsulare*)(屋久島小杉谷、絶滅危惧Ⅱ類)(春の交換会より) 73
- 08325 センボンヤリ(*Leibnitzia anandria*)(9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花、北海道、本州、東アジア) 20,46,82
- 08354 エゾウスユキソウ(レブンウスユキソウ)(*Leontopodium discolor*)(15、北海道からサハリン、絶滅危惧ⅠB類) 26
- 08364-W (W)ウスユキソウ(*Leontopodium japonicum*)(20-50、白、北海道から九州、亜高山から高山)[群馬県] 85
- 08571 クルマバハグマ(*Pertya rigidula*)(50-100、白、輪生葉、日本固有種、東北から近畿日本海側) 48
- 08572-1 カシワバハグマ(斑入り)(*Pertya robusta*)(40、白)[散斑、種子交換会注:シイナ多い] 87
- 08572-W (W)カシワバハグマ(*Pertya robusta*)(40、白)[埼玉県] 73
- 08735 ヒメヒゴタイ(*Saussurea pulchella*)(100、桃、2年草、北海道~九州、絶滅危惧Ⅱ類) 78
- 08856 タムラソウ(*Serratula coronata* ssp. *insularis*)(60以上、赤紫) 4
- 08887-W (W)アキノキリンソウ(*Solidago virgaurea* subsp. *asiatica*)(50-80、黄、山野、北海道から九州)[長野県] 84
- 08971 キクバヤマボクチ(*Synurus palmatopinnatifidus*)(70-100、淡黄、淡紫、本州から九州) 11
- 09021s シコタンタンポポ(*Taraxacum shikotanense*)(20、黄、外そうほう片がやや細長い)[春の交換会から] 84
- 【キジカクシ、クサスギカズラ科】-----
- 09308 オリヅルラン(*Chlorophytum comosum*)(10-20、白、ランナーを出して増える) 37
- 09315 スズラン(*Convallaria keiskei*)(20-30、白、本州中部以北から北海道) 42
- 09315-W (W)スズラン(*Convallaria keiskei*)(20、白、本州中部以北から北海道)[保湿種子][群馬県] 85
- 09326 カンザシギボウシ(*Hosta capitata*)(60(花茎)、青紫、白、イワギボウシに似る、長崎愛媛徳島三重) 4
- 09326-1 カンザシギボウシ(素心)(*Hosta capitata*)(60(花茎)、白、イワギボウシに似る、長崎愛媛徳島三重) 34
- 09326-E イワギボウシ(カンザシギボウシの徳島変異種)(*Hosta capitata*)(40-50(花茎)、薄紫、カンザシギボウシの徳島地域タイプ) 71
- 09332 サガエギボウシ(通称)(クロナミギボウシ)(*Hosta fluctuans* 'Sagae')[斑入りの出現はほぼない]42
- 09333 ヒメイワギボウシ(*Hosta gracillima*)(10-30、淡い紫、中心部濃い紫、近畿四国) 4
- 09333-E トサヤマギボウシ(ヒメイワギボウシの高知地域変種)(*Hosta gracillima*)(高知県の石灰岩地帯に自生) 34
- 09333-W (W)ヒメイワギボウシ(*Hosta gracillima*)(10-30、淡い紫、中心部濃い紫、近畿四国)[愛媛県] 34
- 09335 ウラジロギボウシ(*Hosta hypoleuca*)(大型、白花多花性、葉裏は粉白、愛知県 希少種、絶滅危惧ⅠB類) 41
- 09337 ウナズキギボウシ(*Hosta kikutii* var. *caput-avis*)(白、中型種、紀伊半島四国の一部) 34
- 09339-2 スダレギボウシ(緑花)(*Hosta kikutii* var. *polyneuron*)(30-60、緑、高知県和歌山県) 34
- 09351 イワギボウシ(*Hosta longipes* var. *longipes*)(20、薄紫、中型種、東北から九州) 3
- 09351-1 イワギボウシ(濃色)(*Hosta longipes* var. *longipes*)(20、中型種、東北から九州) 79
- 09351-W (W)イワギボウシ(*Hosta longipes* var. *longipes*)(20、薄紫、中型種、東北から九州)[愛知県] 3
- 09355-W (W)ミズギボウシ(別名ナガバミズギボウシ)(*Hosta longissima* var. *brevifolia*)(40-70、薄い紫、愛知以西四国九州)[愛知県] 3
- 09358 マルバタマノカンザシ(*Hosta plantaginea*)(30-100、白、夜間開花、中国北部) 19
- 09361 セトウチギボウシ(*Hosta pycnophylla*)(30、淡紫、山口東部、絶滅危惧ⅠB類) 34

- 09376 ブンチョウコウ(白覆輪)(流通名?)(*Hosta sieboldii* cv. Bunchoko)(コバギボウシの斑入り) 48  
 09380 コバギボウシ(*Hosta sieboldii* f. *lancifolia*)(30-50、薄紫、本州から九州) 3,95  
 09380-W (W)コバギボウシ(*Hosta sieboldii* f. *lancifolia*)(30-50、薄紫、本州から九州)[長野県] 9  
 09381 コバギボウシ(白)(*Hosta sieboldii* f. *lancifolia* white fl.)(30-50、白) 7,41  
 09406 オトメギボウシ(*Hosta venusta*)(5、淡桃、済州島) 3,48,84  
 09438 ポリキセナ ロンギツバ(*Lachenalia (Polyxena) longituba*)(-10、白、南アフリカ原産) 1  
 09448 ラケナリア プシラ(*Lachenalia (Polyxena) pusilla*)(5、白、ロゼット状の葉の間に咲く) 1  
 09450s ラケナリア レフレクサ(*Lachenalia (Polyxena) reflexa*)(10-20、黄)[春の交換会から] 95  
 09461 ヤブラン(*Liriope muscari*)(40、淡紫、日本各地) 3  
 09461-W (W)ヤブラン(*Liriope muscari*)(40、淡紫、日本各地)[愛知県] 3  
 09488 マッソニア プスツラタ(*Massonia pustulata*)(10、白、5枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒性、夏休眠する) 79  
 09647 ツルボ(*Scilla scilloides*)(20-30、桃) 3  
 09647-1 ツルボ(花色混合)(*Scilla scilloides*) 47  
 09647-W (W)ツルボ(*Scilla scilloides*)(20-30、桃、北海道から沖縄)[埼玉県] 46  
 09648 ツルボ(ヒメツルボ、矮性種)(*Scilla scilloides* dwarf type)(15、桃) 73  
 09648-E ツルボ(矮性種、四国産)(*Scilla scilloides* dwarf type)(15、桃) 90  
 09648-E1 ツルボ(矮性種、銚子産)(*Scilla scilloides* dwarf type)(10、桃) 79  
 09648-E2 ツルボ(矮性種、青森産)(*Scilla scilloides* dwarf type)(10、桃)[芳香あり] 90  
 09649 シロバナツルボ(*Scilla scilloides* f. *albiflora*)(30-40、白) 79  
 -----【キツネノマゴ科】-----  
 09713 スズムシバナ(*Strobilanthes oligantha*)(30-60、青紫、山地の林下の陰地) 5,11,48  
 09715 スズムシバナ(青白混合)(*Strobilanthes oligantha*, *Strobilanthes oligantha* f. *albiflora*)(30-60、青紫、白、山地の林下の陰地) 73  
 -----【キョウチクトウ科】-----  
 09745 チョウジソウ(*Amsonia elliptica*)(30-50、青紫) 4,9,11,26,39  
 09761 ロクオンソウ(ヒゴビヤクゼン)(*Cynanchum amplexicaule*)(-90、薄い黄、絶滅危惧Ⅱ類) 14,31,48  
 09774 イヨカズラ(*Cynanchum japonicum*)(30-60、白、日本台湾朝鮮中国) 20  
 09778 クサナギオゴケ(*Cynanchum (Vincetoxicum) katoi*)(-100、赤紫、千葉以西四国九州、日本固有種、絶滅危惧種Ⅱ類) 1,20,46,48  
 09792 スズサイコ(*Cynanchum paniculatum*)(100、直立する、緑、茶、山地、北海道から九州) 5  
 09818-W (W)ガガイモ(*Metaplexis japonica*)(ツル、淡紫、北海道から九州)[山形県] 41  
 09868 ビンケトキシクム ニグルム(*Vincetoxicum nigrum*)(50-100、暗茶青) 38  
 -----【キンコウカ科】-----  
 09882-W (W)ノギラン(*Aletris luteoviridis*(*Metanarthecium luteoviride*))(15-30、白 林道脇、やや日照が少ない所、北海道から九州)[愛知県] 3  
 09890 キンコウカ(*Narthecium asiaticum*)(10-20、黄、亜高山高山、中部以北北海道)[下越地方、低山由来] 75  
 -----【キンチャクソウ科】-----  
 09908s カルケオラリア類(*Galceolaria* sp.)(黄)(春の交換会より) 2  
 -----【キンポウゲ科】-----  
 09962 レイジンソウ(*Aconitum loczyanum*)(50、白、山地、近畿以西九州四国) 7  
 10003-W (W)エゾトリカブト(*Aconitum yesoense*)(60-150、青紫、北海道)[北海道] 16  
 10015 サラシナショウマ(銅葉ブルネット)(*Actaea (Cimicifuga) ramosa* 'Brunette')(60-150、白) 95  
 10017 サラシナショウマ(*Actaea (Cimicifuga) simplex*)(40-150、白、北海道から九州) 4  
 10017-W (W)サラシナショウマ(*Actaea (Cimicifuga) simplex*)(40-150、白、北海道から九州)[長野県] 9  
 10018 タンゴサラシナショウマ(*Actaea (Cimicifuga) sp.*)(80-150、白) 95  
 10036 フクジュソウ「秩父紅」(*Adonis ramosa*(= *amurensis*) 'Chichibubeni')20、紅、園芸種[保湿種子、交換会まで冷蔵保管] 41  
 10061 アルプス黄花オキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) alpina sulphrea*)(10-20、黄) 95  
 10072 オキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) cernua*)(30-50、暗赤紫、本州・四国・九州) 9  
 10072-E オキナグサ(新潟県中越由来)(*Anemone (Pulsatilla) cernua*)(30-50、暗赤紫) 75  
 10076s マンシュウオキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) dahurica*)(25-40、明るい藤色、東アジア、シベリア)[春の交換会から] 4,84

- 10155 アネモネ バルデンシス(*Anemone baldensis*)(10、白、ヨーロッパアルプスとユーゴスラビアの山地、日当たりのよい岩礫地、) 20
- 10233 アネモネ シルベトリス→バイカイチゲ(*Anemone sylvestris*)(20-40、白、ヨーロッパからシベリア) 8
- 10260-1 バイカカラマツ(濃色、大輪)(*Anemonella thalictroides*)(10、濃桃) 10
- 10270 レンゲショウマ(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白、僅かに桃) 4,9,11,21,37,78,84,89,95
- 10270-2 レンゲショウマ(青軸)(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白?、)[白花] 21
- 10270-3 レンゲショウマ(白花)(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白?、) 84
- 10270-4 レンゲショウマ(泥軸、白花)(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白、茶褐色の茎) 21
- 10270-5 レンゲショウマ(八重咲き)(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白、僅かに桃、ほぼ二重) 4,21,26
- 10270-7 レンゲショウマ(紫玉、俗称?)(*Anemonopsis macrophylla*)(八重咲き、花卉先端濃紫) 21
- 10280 アクイレギア アルピナ(*Aquilegia alpina*)(15-30、紫、アルプス) 38
- 10293 ヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana*)(30-50、海老茶黄、北海道から九州、草地、林縁)10,15,45
- 10293-W (W)ヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana*)(30-50、海老茶・黄、北海道から九州、草地、林縁)[長野県] 84
- 10296 キバナノヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* f. *flavescens*)(30-60、黄、日本固有種、北海道から九州) 9,15,38,79
- 10296-W (W)キバナノヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* f. *flavescens*)(30-60、黄、日本固有種、北海道から九州)[長野県] 81
- 10298 オオヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* var. *oxysepala*)(50、紫褐と黄、日当たりのよい道端、林縁、草原などにはえる) 13,75
- 10307 カナダオダマキ(*Aquilegia canadensis*)(20-40、赤や黄) 2,10,39,71
- 10308 カナダオダマキ「コルベット」(黄花カナダオダマキ)(*Aquilegia canadensis* 'Corbett')(黄) 10,73
- 10331 アクイレギア エカルカラタ(フウリンオダマキ)(*Aquilegia ecalcarata*)(20-30、白薄い紫、中国、1800-3500m) 38
- 10331s アクイレギア エカルカラタ(フウリンオダマキ)(*Aquilegia ecalcarata*)(20-30、白薄い紫、中国、1800-3500m)[春の交換会より] 74
- 10337 オダマキ(*Aquilegia flabellata*) 42
- 10350 ミヤマオダマキ(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(10-20、紫、葉が3全分裂する。オダマキは完全に分裂しない) 39,42,48,
- 10359 ミヤマオダマキ(白)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* white fl.) 39
- 10361 チシマルリオダマキ(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*(*Aquilegia* sp.))(ミヤマオダマキよりやや矮性、花の色は濃い) 26
- 10410s アクイレギア サキシモンタナ(*Aquilegia saximontana*)(5-10、紫)[春の交換会より] 6
- 10419 アクイレギア セミアクイレギア(シズノオダマキ)(*Aquilegia semiaquilegia*)(白紫、日当たりのよい石混じりの斜面、樺太)[極少量、取り蒔きテストで発芽確認] 70
- 10430 ハヤチネオダマキ(園芸名)(*Aquilegia* sp.) 31
- 10438 クロバナオダマキ(*Aquilegia viridiflora*)(30、暗黒紫) 1,10
- 10441 アクイレギア ブルガリス(*Aquilegia vulgaris*)(10-20、濃紫、リップは白) 10
- 10482 キタダケソウ(*Callianthemum hondoense*)(10-15、白、北岳固有、特定国内希少種) 26
- 10511 ミヤマハンショウヅル(*Clematis alpina* ssp. *ochotensis* var. *fujijamana*)(つる性低木、紅紫、北海道から九州、山地から亜高山) 26
- 10511-3 エゾミヤマハンショウヅル(*Clematis alpina* ssp. *ochotensis* var. *ochotensis*)(つる性低木、濃紅紫、北海道)
- 10536 クレマチス ヘラクレイフォリア(*Clematis heracleifolia*)(50-100、青、中国北部、朝鮮半島) 95
- 10579 カザグルマ(*Clematis patens*)(ツル性、薄い紫、秋田から九州) 4,33,95
- 10580 カザグルマ(白)(*Clematis patens* white fl.)(ツル性、白、秋田から九州) 78
- 10602 センニンソウ(*Clematis terniflora*)(ツル、白、山野、北海道から九州) 9
- 10622 コセリバオウレン(*Coptis japonica* var. *major*)(10-30、白、3回3出複葉、本州太平洋側) 13
- 10625 バイカオウレン(*Coptis quinquefolia*)(15、白) 43
- 10744 セツブンソウ(*Eranthis pinnatifida*)(5-15、白、関東以西本州、主に太平洋側)[保湿種子] 41
- 10750 シラネアオイ(*Glaucidium palmatum*)(40、淡赤紫、亜高山から高山帯、中部以北北海道) 4,78,84,95
- 10753 シラネアオイ(白)(*Glaucidium palmatum* var. *leucanthum*)(40、白、亜高山から高山帯、中部以北北海道) 26,84
- 10753-W (W)シラネアオイ(白)(*Glaucidium palmatum* var. *leucanthum*)(40、白、亜高山から高山帯、中部以北北海道)[新潟県] 77
- 10896 ミヤマキンポウゲ(*Ranunculus acris* var. *nipponicus*)(10-50、黄、高山の草地) 26



- 10923 ランクルス グラキアリス(*Ranunculus glacialis*)(雪解けのガレ場や、岩の斜面、岩の裂け目など高山の湿った場所) 38
- 10923s ランクルス グラキアリス(*Ranunculus glacialis*)(雪解けのガレ場や、岩の斜面、岩の裂け目など高山の湿った場所)春の交換会より 77
- 11010 シギンカラマツ(*Thalictrum actaeifolium*)(30、白、関東南部から九州) 3,26
- 11020s コハスバカラマツ(*Thalictrum coreanum* var. *minor*)(15-30、薄紫、朝鮮半島)[春の交換会より] 74,95
- 11023 タリクトルム デラバイ(ヘンシカラマツソウ)(*Thalictrum delavayi*)(60-120、ピンク、草原、傾斜面、岩場、灌木の間、明るい林床) 95
- 11033 キバナカラマツソウ(*Thalictrum flavum*)(120、白~黄、ユーラシア) 38,39
- 11036 イトハカラマツ(通称)(*Thalictrum foeniculatum*)(10-80、薄いピンク、中国中部から東北部) 87
- 11041-3 タイカカラマツ(通称)(白)(*Thalictrum grandiflorum*)(白) 90
- 11052 アキカラマツ(*Thalictrum minus* var. *hypoleucum*)(60-130、淡黄白、北海道から南西諸島) 3,20
- 11066 シギンカラマツ(*Thalictrum rochebrunianum*)(60、淡桃、長野、群馬、福島) 26
- 11077 ヒレフリカラマツ(*Thalictrum toyamae*)(10、淡い紅紫、宮崎県、絶滅危惧 I B類) 10,48
- 11079s ムラサキカラマツ(*Thalictrum uchiyamae*)(50、薄紫、対馬と済州島のみ分布、特定国内希少種、絶滅危惧 I B類)[春の交換会より] 74,75,84
- 11081 タカサゴカラマツ(台湾ンバイカカラマツ)(*Thalictrum urbainii*)20、白(口紅赤)、台湾原産 2,10
- 11081-1 タカサゴカラマツ(台湾ンバイカカラマツ)(*Thalictrum urbainii*)20、白(口紅赤、萼花弁あり)、台湾原産 10
- 11081s タカサゴカラマツ(台湾ンバイカカラマツ)(*Thalictrum urbainii*)20、白(口紅赤)、台湾原産[春の交換会から] 76
- 11109s トロリウス ラクサス(*Trollius laxus*)(クリーム、ロッキー山脈)[春の交換会から] 95
- 【クマツズラ科】-----
- 11282 ヤマブドウ(*Vitis coignetiae*)(ツル、落葉、雌雄異株)[保湿種子] 84
- 【クロウメモドキ科】-----
- 11445 ナツメ(*Zizyphus jujuba*)(落葉高木、果実は食用) 14
- 【ケシ科】-----
- 11552 ジロボウエンゴサク(*Corydalis decumbens*)(10-20、薄い紫、実は線形のさく果、熟すると自然に散布される。関東地方から九州) 12
- 11577s ミヤマキケマン(*Corydalis pallida* var. *tenuis*)(20-50、黄、低山地にも分布、近畿以東)[春の交換会より] 71
- 11630 ケマンソウ(*Dicentra spectabilis*)(別名タイツリソウ、薄ピンク、中国朝鮮) 39
- 11631 ケマンソウ(白)(*Dicentra spectabilis* 'alba')(白) 39
- 11761 パパベル アルピヌム(ミヤマヒナゲシ)(*Papaver alpinum*)(5-20、白、一稔性、ヨーロッパアルプス、日当たりのよい草原やガレ場、石の多い場所)[保湿種子] 26
- 11771 リシリヒナゲシ(*Papaver fauriei*)(20、黄、利尻山固有種、絶滅危惧 I B類、市中に流布している種は栽培ヒナゲシの可能性大、栽培ヒナゲシとリシリヒナゲシは酷似) 4,9,16
- 11791 パパベル オリエンターレ(オニゲシ)(*Papaver orientale*)(100、朱(中心部黒)が基本種、多くの園芸種がある、英名オリエンタルポピー) 26
- 11850 サンギナリア カナデンシス(*Sanguinaria canadensis*)(20-30、白、一重、多弁、八重咲きがある。山地の林床、林縁)[保湿種子] 26
- 11850d サンギナリア カナデンシス(*Sanguinaria canadensis*)(20-30、白、一重、多弁、八重咲きがある。山地の林床、林縁)[乾燥種子] 38
- 【ゴマノハグサ科】-----
- 12026 オオアブノメ(*Gratiola japonica*)(10-25、白、湿地、一年草、本州から九州、絶滅危惧 II 類) 41
- 12100 シソクサ(*Limnophila chinensis* ssp. *aromatica*)(15-25、白、湿地、本州から沖縄) 84
- 12252 エゾヒナノウスツボ(*Scrophularia grayana*)(90-150、赤紫、南千島、北海道、青森岩手) 5,31,84,92
- 12281 エサシソウ(シロバナモウズイカ)(*Verbascum blattaria* f. *albiflora*)(50-80、白、2年草、帰化植物) 38
- 【サクラソウ科】-----
- 12465 アンドロサケ セプトントリオナリス(*Androsace septentrionalis*)(10-20、白、1年草) 26
- 12471 リュウキュウコザクラ(*Androsace umbellata*)(5-10、白、1年草、中国地方から沖縄、海近くの草地) 1
- 12471s リュウキュウコザクラ(*Androsace umbellata*)(5-10、白、1年草、中国地方から沖縄、海近くの草地)[春の交換会より] 74
- 12491-1 マンリョウ(斑入り)(*Ardisia crenata*) 34

- 12502 ビロードヤブコウジ(*Ardisia mamillata*)(葉がビロード状、赤実、耐寒性弱い、中国南部) 19,42  
 12561 シクラメン グラエカム(*Cyclamen graecum*)(10、ピンク、地中海の島々、標高1200m、乾燥地) 48  
 12567 シクラメン ヘデリフォリウム(*Cyclamen hederifolium*)(10-20、ピンク、耐寒性あり) 48  
 12567s シクラメン ヘデリフォリウム(*Cyclamen hederifolium*)(10-20、ピンク、耐寒性あり)[春の交換会より] 5  
 12570 シクラメン ヘデリフォリウム(白)(*Cyclamen hederifolium* 'Album') 95  
 12596 シクラメン インタミナツム(*Cyclamen intaminatum*)(花は小さい灰白色。葉は*C.coum*に似る。)[暗発芽、30-40°Cお湯に中性洗剤一滴添加に48時間浸漬後播種のこと] 72  
 12605s シクラメン ペルシウム(*Cyclamen persicum*)(濃ピンク、春咲き、要霜除け、原種)[春の交換会から] 95  
 12605-1s シクラメン ペルシウム(銀葉、園芸種)(*Cyclamen persicum*)(ピンク、春咲き、要霜除け、)[春の交換会から、少量] 95  
 12608s シクラメン ペルシウム(白)(*Cyclamen persicum* white fl.)(白花、春咲き、要霜除け、原種)[春の交換会から] 95  
 12694 オカトラノオ(*Lysimachia clethroides*)(60-100、白、北海道から九州、朝鮮、中国) 9  
 12700-E コナスビ(アポイ岳由来か)(*Lysimachia japonica* var. *subsessilis*)(這性、黄、北海道から琉球) 31  
 12713 クサレダマ(*Lysimachia vulgaris* var. *davurica*)(80、黄色、北海道から九州) 3,14  
 12805 プリムラ カンデラブラ ハイブリッド(*Primula candelabra* hybrs)(交配種)[黄] 95  
 12842s プリムラ デンティクラタ(*Primula denticulata*)(30、バラ白 濃淡、タマザキサクラソウの別名、ヒマラヤ、耐暑性弱い)[春の交換会から] 95  
 12846s プリムラ デンティクラタ(白)(*Primula denticulata* white fl.)(30、白、濃淡)[春の交換会から] 95  
 12879 プリムラ「ゴールドレースグループ」(*Primula* 'Gold Laced Gp')(15-20、花弁は臙脂色に黄色の覆輪) 10  
 12900 クリンソウ(*Primula japonica*)(20-50、赤、北海道から四国、湿地) 3,9,38,81,84  
 12900-1 クリンソウ(ピンク)(*Primula japonica*) 38  
 12900-2 クリンソウ(絞り咲)(*Primula japonica*) 8  
 12944-E1 エサヌキワリコザクラ(通称)(*Primula modesta* var. *fauriei*)(恵山産) 26  
 12947 ウリュウコザクラ(*Primula modesta* var. *matsumurae* ex Uryu)(レブンコザクラの雨竜地域種) 26  
 12949 サマニユキワリ(*Primula modesta* var. *samanimontana*)(アポイ岳周辺の日高地方南部に特産する) 26  
 13014 サクラソウ(*Primula sieboldii*)(10-20、ピンク、北海道南部から九州)[少量] 95  
 13067 プリムラ プベスケンス(*Primula x pubescens*)(10、赤紫、アウリクラ種(*P. auricula*)とヒル スタ種(*P. hirsuta*)との自然交雑種、ヨーロッパアルプス) 12

-----【サトイモ科】-----

- 13143-W (W)ヒロハテンナンショウ(*Arisaema amurense* ssp. *robustum*)(50、茶、山地、中部以北北海道)[保湿種子][長野県] 84  
 13160-B アリサエマ ファゲンシー(小球)(*Arisaema fargesii*)(40-50、耐寒性は強くない、ヒマラヤ、モモイロテンナンショウに似る) 70  
 13169 オキナワテンナンショウ(*Arisaema heterocephalum* ssp. *okinawaense*)(特定国内希少種、絶滅危惧 I A類) 75  
 13170-B マイヅルテンナンショウ(小~中球)(*Arisaema heterophyllum*)(60-100、雄性個体と両性個体のみ存在、岩手から鹿児島、川沿いの草地、絶滅危惧 II 類) 19,75  
 13171-B イナヒロハテンナンショウ(*Arisaema inaense*)(15-25、固有種、長野岐阜の一部、特定国内希少種、絶滅危惧 I A類)[交換会注:提供者自身が特定事業者の認可を受けています] 86  
 13175-W (W)テンナンショウ不明種(*Arisaema iyoanum*か*Arisaema iyoanum* ssp. *Nakaiianum*)[オモゴウテンナンショウかシコクテンナンショウのどちらか][愛媛県] 34  
 13179-B1 ヒメウラシマソウ(小球)(*Arisaema kiushianum*)(20、黒紫(白筋)、山口九州) 19,70  
 13179-3B ヒメウラシマソウ(亀甲葉)(小球)(*Arisaema kiushianum*) 70,86  
 13180-B2 ヒメウラシマソウ♀ × ウラシマソウ素心(小球)(F-1のセルフ、F2)(*Arisaema kiushianum* x *thunbergii* ssp. *urashima*) 75  
 13201-E コウライテンナンショウ(葉模様、美種)(*Arisaema peninsulae*)(80、緑、広義のマムシグサに含める見解もある)[中越由来] 75  
 13203 ムサシアブミ(*Arisaema ringens*)(40、関東以西、四国九州) 11,71  
 13203-3 ムサシアブミ(二頭竜)(*Arisaema ringens*)(40、関東以西、四国九州) 18,34  
 13209 マムシグサ(*Arisaema serratum*)(50-100、緑、北海道から九州) 11  
 13209-W (W)マムシグサ(*Arisaema serratum*)(50-100、緑、北海道から九州)[長野県] 9  
 13209-W1 (W)マムシグサ(*Arisaema serratum*)(50-100、緑、北海道から九州)[愛知県] 3

- 13220-B1 ウラシマソウ(素心)(小球)(*Arisaema thunbergii* ssp. *urashima* 'Green form')(40、緑) 70,75  
 13226-W (W)アオテンナンショウ(*Arisaema tosaense*)(20-130、薄緑、山地・林床・溪谷)[愛媛県] 34  
 13300-B ニオイハンゲ(ムカゴ)(*Pinellia cordata*)(赤花大葉) 12  
 13305-2 オオハンゲ(斑入り)(*Pinellia tripartita*)(20-50) 33  
 13305-4 オオハンゲ(斑入、花にも入る)(*Pinellia tripartita* ex. 'Variegata') 87  
 13305-B オオハンゲ(小球)(*Pinellia tripartita*)(20-50、緑に帯紫、本州中部から沖縄) 3  
 13327-1 ヒメザゼンソウ(黄覆輪の実)(*Symplocarpus nipponicus*)(10-20、黒紫、本州から北海道の日本海側、やや湿ったところ)[保湿種子、実生の斑の発現は殆どない、上越由来] 75
- 【サラセニア科】-----
- 13361 アミメヘイシソウ(サラセニア レウコフィラ)(*Sarracenia leucophylla*)(25-80、海老茶色、多年生食虫植物、北アメリカ南部) 41
- 【シオデ、サルトリイバラ科】-----
- 13386-W (W)シオデ(*Smilax riparia* var. *ussuriensis*)(ツル、黄緑、雌雄異株、北海道から九州、種子は休眠するので、秋に播いても発芽は翌々年の春)[山口県] 11
- 【シソ科】-----
- 13431 カワミドリ(*Agastache rugosa*)(40-100、淡青紫穂状花、山地の草原、北海道から九州) 42,95  
 13493 コムラサキ(*Callicarpa dichotoma*)(50-200、紫実、葉柄と花柄の位置がわずかずれている) 3  
 14201 カリガネソウ(*Caryopteris divaricata*)(30-100、青紫、全草に特有の臭気、北海道から九州) 3,15,25,42,78,84  
 14201-1 カリガネソウ(濃色)(*Caryopteris divaricata*)(30-100、濃い青紫、全草に特有の臭気、) 88,95  
 14202 カリガネソウ(桃)(*Caryopteris divaricata* pink)(30-100、桃) 5,95  
 14204 ダンギク(*Caryopteris incana*)(70-80、白、青、紫、絶滅危惧Ⅱ類) 3,13,24,30  
 14204-1 ダンギク(ピンク)(*Caryopteris incana*)(70-80、ピンク) 3  
 14221 ジャコウソウ(*Chelonopsis moschata*)(60-100、赤紫、北海道から九州) 11  
 14270 シモバシラ(*Collinsonia* (*Keiskea*) *japonica*)(40-70、白、初冬、立ち枯れた茎の根元に霜柱状の水柱が出来る。) 3,5  
 14305 フトボナギナタコウジュ(*Elsholtzia argi-nipponica*)(30-80、薄紫、一年草、日本固有種、福島以西) 84  
 14306 ナギナタコウジュ(*Elsholtzia ciliata*)(80、淡紫、一年草、北海道から九州) 11  
 14370 セキヤノアキチヨウジ(*Isodon effusa*)(30-90、青紫、関東中部) 42  
 14370-1 ベニバナセキヤノアキチヨウジ(仮称)(*Isodon effusa*?) 42  
 14373 ヒキオコシ(*Isodon japonicus*)(30-70、薄い紫、北海道南西部から九州) 3  
 14374 アキチヨウジ(*Isodon longitubus*)(60-90、青、長野以西) 82,95  
 14440 メハジキ(*Leonurus japonicus*)(50-100、淡紅紫、2年草) 42,92  
 14441 キセワタ(*Leonurus macranthus*)(60-100、淡紅紫、絶滅危惧Ⅱ類) 39,92  
 14525 タイマツバナ(*Monarda didyma*)(100、赤紫、北アメリカ、ベルガモット、園芸品種が多い) 3  
 14633 タテヤマウツボグサ(*Prunella prunelliformis*)(15、紫、東北地方から中部地方、亜高山、高山の草地) 15
- 14635 ミヤマウツボグサ(チシマウツボグサ?)(*Prunella vulgaris* f. *aleutica*)(20-30、青紫、匍匐枝は出さない、中部以北から北海道) 26  
 14636 ウツボグサ(*Prunella vulgaris* ssp. *asiatica*)(20、青、北海道から沖縄) 3,9  
 14638 ウツボグサ(白)(*Prunella vulgaris* ssp. *asiatica* white fl.)(20、白、北海道から沖縄) 38  
 14688 アキノタムラソウ(*Salvia japonica*)(20-50、青紫、山形から九州) 3  
 14695 ナツノタムラソウ(*Salvia lutescens* var. *intermedia*)(20-70、薄い青、日本固有種、神奈川東海近畿) 14
- 14700-W (W)キバナアキギリ(*Salvia nipponica*)(20-30、黄、本州から九州)[東京都] 77  
 14704 タジマタムラソウ(*Salvia omerocalyx*)(小型種、近畿北部、絶滅危惧Ⅱ類) 33  
 14709 ヒメタムラソウ(*Salvia pygmaea*)(10-30、白、山地の溪流沿い、奄美から沖縄) 14  
 14759 タツナミソウ(*Scutellaria indica*)(20-30、紫、東北地方南部から九州、低山) 10,14,71  
 14759-1 タツナミソウ(濃色、矮性)(*Scutellaria indica*) 14  
 14759-2 タツナミソウ(赤)(*Scutellaria indica*) 2  
 14775 トウゴクシソバツナミ(*Scutellaria maekawae* f. *abbreviate*)(紫、白、シソバツナミの変種、上部の葉が大きい)[上越由来] 75  
 14791 アカボシタツナミソウ(*Scutellaria rubropunctata*)(20-50、淡紫、奄美大島～沖縄諸島) 73  
 14791-1 アカボシタツナミソウ(濃色タイプ)(*Scutellaria rubropunctata*)(20-50、青紫、奄美大島～沖縄諸島) 95

- 14871 ニンジンボク(*Vitex cannabifolia*)(100-300灌木、薄い紫 原産地は中国、切花に良い) 31  
 -----【シュウカイドウ科】-----
- 14911-B シュウカイドウ(ムカゴ)(*Begonia grandis*)(70、赤、耐寒性ある、野生化している、中国大陸、マレー半島) 89  
 -----【シュロソウ科】-----
- 14920 アズマシライトソウ(*Chionographis hisauchiana* subsp. *hisauchiana*)(30-35、白、関東、絶滅危惧Ⅱ類) 75
- 14921-1 コシキジマシライトソウ(通称)(*Chionographis japonica*)(鹿児島島の甑(こしき)島の林床に自生 普通のシライトソウより葉がしっかりしていて花付も良い) 5,31
- 14921-W (W)シライトソウ(*Chionographis japonica*)(20-40、白、秋田から九州、山地)[愛知県] 3
- 14926 サイシュウトウシライトソウ(通称)(*Chionographis* sp.)(10-20、白) 7,48
- 14942-1 ショウジョウバカマ(♀シロバナ×♂タマスタレ)(*Helonias* (*Heloniopsis*) *orientalis*)(10-20、北海道から九州)[保湿種子、交換会まで冷蔵保管] 41
- 15015-B エンレイソウ(実生1年苗)(*Trillium smalii*)(褐紫色、谷川沿いなど湿潤なところ) 75
- 15040 シュロソウ(*Veratrum maackii* var. *japonicum*)(20-30(葉)、50-100(茎)、暗紫、暗褐、関東以西) 43
- 15040-1 シュロソウ(縞斑)(*Veratrum maackii* var. *japonicum*)(20-30(葉)、50-100(茎)、暗紫、暗褐、関東以西) 87  
 -----【ショウガ科】-----
- 15070-W (W)ハナミョウガ(*Alpinia japonica*)(40-60、白赤、関東以西四国九州、暖地)[愛知県] 3  
 -----【スイカズラ科】-----
- 15267-W (W)ツクバネウツギ(*Abelia spathulata*)(-200、白、落葉低木、東北から九州、山地丘陵地)[長野県] 9
- 15294 クナウティア アルベンシス(*Knautia arvensis*)(50-80、青紫) 26
- 15325 クロミノウゲイスカグラ(*Lonicera caerulea* ssp. *edulis* var. *emphylocalyx*)(別名ハスカップ) 26
- 15415 ヒメマツムシソウ(通称)(*Scabiosa columbaria* var. *alpina*)(10、青、ヨーロッパ) 26
- 15420-W (W)マツムシソウ(*Scabiosa japonica*)(50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原)[長野県] 84
- 15421 エゾマツムシソウ(*Scabiosa japonica* var. *acutiloba*)(20-50、青紫、東北北部から北海道) 29
- 15424 ソナレマツムシソウ(*Scabiosa japonica* var. *littoralis*)(10-30、青紫、多年草、関東、海岸、絶滅危惧Ⅱ類) 5,92  
 -----【スイレン科】-----
- 15535 コウホネ(*Nuphar japonicum*)(20-60、黄、水生、北海道から九州)[保湿種子] 3  
 -----【スグリ科】-----
- 15550 ヤシャビシャク(*Ribes ambiguum*)(-50位、落葉低木、本州・四国・九州、ブナなどの樹幹上に着生する) 1  
 -----【ススキノキ科】-----
- 15611 ユウスゲ(キスゲ)(*Hemerocallis citrina* var. *vespertina*)(100-150、橙黄、本州から九州、山地の草原) 15,31
- 15615 ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)(エゾカンゾウ)(*Hemerocallis dumortieri* var. *esculenta*)(50-70、黄、北海道から中部、山地、亜高山) 95  
 -----【スベリヒユ科】-----
- 15695 タリヌム・カリキヌム(クサハナビ)(*Talinum calycinum*)(15-20、紫、耐寒性多年草(多肉植物)、北米、ハマミズナ科のサンジソウと混同されている) 20
- 15696 ハゼラン(サンジソウ、ハナビグサ)(*Talinum crassifolium*)(15-30、桃小花、1年草、野生化、南米原産) 37  
 -----【スミレ科】-----
- 15732-W (W)アリアケスミレ(*Viola betonicifolia* var. *albescens*)(白地に紅紫、紫の紫状、本州から九州、朝鮮・中国)[山形県] 41
- 15767 ヒゴスミレ(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana*)(12、普通は白、九州産には紅がかかる)30,42
- 15770 ヒラツカスミレ(ヒゴ×エイザン、濃紅)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana* x *eizanensis*)(濃淡の紅が入る。有香) 73
- 15798 ヤマツクシスミレ(*Viola diffusa* ssp. *tenuis*) 19

- 15799s ツクシスミレ(*Viola diffusa* var. *glabella*)(淡い薄紫、開花株の寿命は短い、九州南部から南西諸島)(春の交換会より) 73
- 15803 エイザンスミレ(*Viola eizanensis*)(10-20、淡紅から濃紅紫、芳香、葉は深く切れ込む、本州・四国・九州) 3,19,30
- 15817s テリハナガハシスミレ(*Viola faurieana* x *rostrata*)(自然交雑種)(春の交換会より) 73
- 15823s イソスミレ(セナミスミレ)(*Viola grayi*)(15、濃い紫から薄い紫、北海道から鳥取(日本海側に多い)絶滅危惧Ⅱ類)[春の交換会より] 75
- 15825-12 タチツボスミレ(斑入り)(*Viola grypoceras*)(春の交換会より) 73
- 15825-13 タチツボスミレ(八重咲き)(*Viola grypoceras*) 19
- 15826 シロバナタチツボスミレ(*Viola grypoceras* f. *albiflora*)(10、白) 19
- 15837-2 コタチツボスミレ(斑入り)(*Viola grypoceras* var. *exilis*) 19
- 15871 ケマルバスミレ(マルバスミレと呼ばれる)(*Viola keiskei* f. *glabra*)(白、唇弁に紫条が入る、青森から屋久島) 19
- 15890-1 スミレ(絞り)(*Viola mandshurica*) 19
- 15903 コモロスミレ(*Viola mandshurica* f. *plena*)(10、薄い紫、重弁) 78
- 15904-1 スミレ ひむれ(*Viola mandshurica* 'Himure')(ワインレッド、選抜種) 19
- 15905 ミョウジンスミレ(俗称)(スミレ濃色)(*Viola mandshurica* 'Myoujin type')(スミレより濃紅紫、葉も赤み。) 19
- 15908 アツバスミレ(*Viola mandshurica* var. *triangularis*) 73
- 15909 アツバスミレ「二色アツバスミレ」(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *bicolor*)(10、白・紫) 30
- 15917-1s ホソバキリガミネスミレ(*Viola mandshurica* x *Viola patrinii*)(白地に青紫のぼかし、スミレとシロスミレとの交配種、霧ヶ峰で発見)(春の交換会より) 73
- 15951 クワガタスミレ(*Viola palmate*)(10、青紫、葉に深い切れ込み、帰化植物、北米) 73
- 15975 ビオラ プベスケンス(*Viola pubescens*)(レモン黄、暑さに強いが、夏は休眠し易い、北米東部) 19
- 15979 タチスミレ(*Viola raddeana*)(5-10、白淡紫の唇弁に赤紫条が入る、絶滅危惧Ⅱ類) 73
- 16032 ビオラ チバウディエリ(タデスミレ)(*Viola thibaudieri*)(特定国内希少種、絶滅危惧ⅠB類) 78
- 16054 ゲンジスミレ(*Viola variegata* var. *nipponica*)(淡紫、裏面の方が色が濃い、花弁に紫の条が入る、東北関東中部) 30
- 16064 シハイスミレ(*Viola violacea*)(5-10、紅紫、西日本におおい) 19
- 16087 タカオスミレ(*Viola yezoensis* f. *discolor*)(春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる) 19,79
- 16089 アソヒカゲスミレ(*Viola yezoensis* var. *asoana*)(15、春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる) 19
- 【セリ科】-----
- 16141-W (W)ノダケ(*Angelica decursiva*)(80-150、暗紫、関東以西九州)[埼玉県] 73
- 16233 ミシマサイコ(*Bupleurum scorzoneraefolium* var. *stenophyllum*)(30-50、黄、葉草、本州四国九州、絶滅危惧Ⅱ類) 73,78
- 16250 セントウソウ(*Chamaele decumbens*)(10-25、白、林内林縁、北海道から九州) 48
- 【センリョウ科】-----
- 16500 キビヒトリシズカ(*Chloranthus fortunei*)(白、花は糸状、岡山香川九州北部、絶滅危惧Ⅱ類)[乾燥種子] 15
- 16503 フタリシズカ(*Chloranthus serratus*)(30-50、白、実は深い緑に熟する。(水分多い)北海道から九州)[保湿種子] 3
- 16510 センリョウ(*Sarcandra glabra*)(50-100、赤実、関東地方から沖縄) 3
- 16510-1 センリョウ(黄実)(*Sarcandra glabra*)(50-100、黄実、関東地方から沖縄) 3
- 16510-W (W)センリョウ(*Sarcandra glabra*)(50-100、黄、赤実、関東地方から沖縄)[愛知県] 3
- 【タコノアシ科】-----
- 16515 タコノアシ(*Penthorum chinense*)(50-70、黄緑。湿地、関東以西九州) 88
- 【タデ科】-----
- 16571-1 ソバ(赤)(*Fagopyrum esculentum*) 45
- 16617 ヒメタデ(*Persicaria erecto-minor*)(5-15、淡紅、草地川岸、絶滅危惧Ⅱ類) 14
- 16618 アオヒメタデ(ヒメタデの白花種)(*Persicaria erecto-minor* f. *viridiflora*)(5-15、花は緑白) 90
- 16620 ミズヒキ(*Persicaria filiforme*)(30-50(地植え)、赤白、北海道から南西諸島) 3
- 16620-1 ミズヒキ(混合、赤、白、桃)(*Persicaria filiforme*) 14
- 16620-1W (W)ミズヒキ(赤花)(*Persicaria filiforme*)(30-50(地植え)、赤白、北海道から南西諸島)[長野県] 9
- 16620-4 ミズヒキ(白花)(*Persicaria filiforme*)(30-50(地植え)、白) 73

- 16621 ミズヒキ(斑入り)(*Persicaria filiforme* 'Variegata')[白花] 13  
 16621-2 ミズヒキ(斑入り、矢印マークの斑ではない)、白花(*Persicaria filiforme* 'Variegata') 14  
 16622 ギンミズヒキ(*Persicaria filiformis* f. *albiflora*)(30-50(地植)、15(鉢)、白、多年草) 3  
 16624 ミズヒキ(斑入り「ペインターズ・パレット」)(*Persicaria filiformis* 'Painter's Palette')(40、赤白、斑入り) 71
- 16640 シロバナイヌタデ(*Persicaria longiseta* f. *albiflora*)(20-50、白、一年草、北海道から沖縄) 5  
 16642 イザリイヌタデ(業者流通名:ヒメタデ、ヤクシマタデ)(*Persicaria longiseta* f. *diuricatoamosa*)(10-15、赤、ヒメタデと混同される) 5
- 16653-W (W)イシミカワ(*Persicaria perfoliata*)(つる性の一年草 藍色の実が美しい)[愛知県] 3  
 16656-1 ポントクタデ(斑入り)(*Persicaria pubescens*)(30-50、淡紅) 90  
 16667 アイ(通称タデアイ/アイタデ)(*Persicaria tinctoria*)(30、藍染めの染料の原料) 27  
 16667-2 マルバアイタデ(俗称、流通名か)(*Persicaria tinctoria*?) 13,14  
 -----【タヌキモ科】-----
- 16783 ミミカキグサ(*Utricularia bifida*)(黄、食虫植物、南方では多年草、貧栄養な湿地)[交換会で精製、保湿管理] 18  
 -----【チシマゼキショウ科】-----
- 16811 チャボゼキショウ(アポイゼキショウ)(*Tofieldia coccinea* var. *kondoi*)(5-15、白、亜高山帯の石灰岩地や蛇紋岩地、アポイ岳大平山) 26  
 16816 ハナゼキショウ(*Tofieldia nuda* var. *nuda*)(20、白) 43  
 -----【ツツジ科】-----
- 17034 シラタマノキ(*Gaultheria miqueliana*)(10-30、白実、小低木、中部以北、亜高山帯、草地) 26  
 17142-W (W)ツガザクラ(*Phyllodoce nipponica*)(10-20、薄いピンク、本州から四国、高山の岩場)[群馬県] 85  
 17163-W (W)ベニバナイチヤクソウ(*Pyrola incarnata*)(15-25、紅、亜高山帯の林床、半寄生植物とも言われている)[長野県] 95  
 17165-W (W)イチヤクソウ(*Pyrola japonica*)(20花径、白、林内、北海道から九州)[山口県] 11  
 17181 ムラサキヤシオツツジ(*Rhododendron albrechtii*)(100-200、赤紫、中部以北から北海道日本海側) 95  
 17201 エゾツツジ(*Rhododendron camtschaticum*)(10-30、桃、小低木、高山帯) 26  
 17206 エゾムラサキツツジ(*Rhododendron dauricum*)(100-200、ピンク、低木、絶滅危惧Ⅱ類) 21  
 17241 ヒカゲツツジ(*Rhododendron keiskei*)(200、淡い黄、関東以西) 34  
 17287 ジングウツツジ(*Rhododendron sanctum*)(落葉なし半落葉低木、赤、東海三重、絶滅危惧Ⅱ類) 34  
 17383 ヤドリコケモモ(*Vaccinium amamianum*)(国内希少種、絶滅危惧ⅠA類、) 87  
 17409 クロマメノキ(*Vaccinium uliginosum*)(30-80、白、黒紫実、北海道、中部以北、亜高山帯から高山帯) 44  
 -----【ツツラフジ科】-----
- 17422-W (W)アオツツラフジ(*Cocculus trilobus*)(300以上、薄黄~白、白実から変化青紫実、有毒、北海道から沖縄)[埼玉県] 73  
 -----【ツバキ科】-----
- 17491 ツバキ「玉之浦」(*Camellia japonica* 'Tama-no-ura')(赤に白のふちのある花卉、ヤブツバキの突然変異種、昭和21年、長崎玉之浦町で発見) 2  
 -----【ツユクサ科】-----
- 17549 ツユクサ(斑入、)(*Commelina communis* variegated leaf)(60、) 36  
 17552 メガネツユクサ(流通名)(*Commelina communis* white fringe fl.)(白の覆輪) 2  
 17555 ツユクサ エレクタ(*Commelina erecta*)(30-50、水色、花びらは大きめ、多年草、アメリカ東南部~中南部) 2
- 17570 ヤブミョウガ(*Pollia japonica*)(50-60、白小花、関東から九州) 3,20,47,90  
 17570-1 ヤブミョウガ(斑入り)(*Pollia japonica*)(50-60、白小花、関東から九州) 40  
 17570-W (W)ヤブミョウガ(*Pollia japonica*)(50-60、白小花、関東から九州)[愛知県] 3  
 -----【ツリフネソウ科】-----
- 17594 キツリフネ(*Impatiens noli-tangere*)(40-80、黄、一年草、北海道から九州) 3,11  
 17594-W (W)キツリフネ(*Impatiens noli-tangere*)(40-80、黄、一年草、北海道から九州)[長野県] 84  
 17598 ツリフネソウ(*Impatiens textori*)(50-80、赤紫、一年草、日本各地) 3,5,11  
 17599-1 ツリフネソウ(純白)(*Impatiens textori* 'Alba')(30、白) 11  
 17599-2 ツリフネソウ(白花、紅紫斑点)(*Impatiens textori* 'Alba')(30、白) 11

- 17598-4 ツリフネソウ(赤)(*Impatiens textori*)(50-80、赤、一年草、) 11  
 17598-W (W)ツリフネソウ(*Impatiens textori*)(50-80、赤紫、一年草、日本各地)[長野県] 9  
 17599 ツリフネソウ(白)(*Impatiens textori* 'Alba')(30、白) 14  
 17599-W (W)ツリフネソウ(白)(*Impatiens textori* 'Alba')(30、白)[新潟県] 77  
 17601 シロツリフネ(*Impatiens textori* f. *pallescens*)(50-80、白、一年草、北海道から九州) 3,5  
 -----【トウダイグサ科】-----
- 17704 ショウジョウソウ(クサショウジョウ)(*Euphorbia heterophylla*)(30-50(地植)、16(鉢)、橙・緑、頭頂部赤) 3,11  
 17708 ホルトソウ(*Euphorbia lathyris*)(緑黄、1-2年草、ヨーロッパ原産) 5  
 17800 ナンキンハゼ(*Triadica sebifera*)(600、落葉中木、中国台湾) 11  
 -----【トチカガミ科】-----
- 17843 クロモ(*Hydrilla verticillata*)(水草、湖沼、川) 41  
 -----【ナス科】-----
- 17940 オオセンナリ(通称クロホオズキ)(*Nicandra physaloides*)(50-100、薄紫、1年草、南アメリカ、帰化植物) 90  
 17970 ホオズキ(*Physalis alkekengi* var. *frachetii*)(60、白) 3  
 18002 ヒヨドリジョウゴ(*Solanum lyratum*)(ツル、秋に赤い実、山野、全国) 11,32  
 -----【ナデシコ科】-----
- 18055 カトウハコベ(*Arenaria katoana*)(10-15、白、東北から北海道、高山帯、蛇紋岩地域、絶滅危惧Ⅱ類) 26  
 18190 ハマナデシコ(フジナデシコ)(*Dianthus japonicus*)(15-40、濃桃、本州から沖縄、海岸) 3,20,76  
 18193 ヒメハマナデシコ(*Dianthus kiusianus*)(15-30、ピンク、和歌山愛媛、沖縄まで、海岸、日本固有種) 82  
 18194 ヒメハマナデシコ(白)(*Dianthus kiusianus* white fl.)(15-30、白) 15  
 18215 ディアンツス パボニウス(*Dianthus pavonius*)(10-25、ピンク、アルプスからピレネー) 26  
 18232 シナノナデシコ(*Dianthus shinanensis*)(20、赤紫、本州中部、荒地) 27,74,83  
 18246 エゾカワラナデシコ(*Dianthus superbus* )(30-50、ピンク、苞は2対、萼片の長さは2-3でカワラナデシコより短い、本州以北) 26,29  
 18250 クモイナデシコ(白)(*Dianthus superbus* var. *amoenus* white fl.)(10-20、白、タカネナデシコの変種) 87  
 18251 カワラナデシコ(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*)(20-50、桃、萼片の長さは3-4でエゾカワラナデシコより長い、本州から九州沖縄) 39,42,90  
 18251-7 カワラナデシコ(白、赤、桃混合)(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*) 3,74  
 18251-W (W)カワラナデシコ(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*)(20-50、桃、萼片の長さは3-4でエゾカワラナデシコより長い、本州から九州沖縄)[長野県] 84  
 18252 カワライセナデシコ(カワラナデシコ × イセナデシコ)(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus* × *Dianthus isensis*) 38  
 18255 カワラナデシコ(白)(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus* white fl.)(20-50、白) 39  
 18258 タカネナデシコ(シモフリナデシコ)(*Dianthus superbus* var. *speciosus*)(15、桃、エゾカワラナデシコの高山型、本州以北) 83  
 18275 イセナデシコ(*Dianthus x isensis*)(ピンク(花弁が細裂して垂れ下がる)、セキチクとサツマナデシコの交配選抜種)[赤白混合] 26  
 18294-1 八重咲きヒメカスミソウ(*Gypsophila repens*)(10-15、白、ヨーロッパ、地中海沿岸) 26  
 18412 シャボンソウ(サボンソウ)(*Saponaria officinalis*)(40、ピンク) 1  
 18431 リクニス アルピナ(*Silene (Lychnis) alpina*)(10、淡桃、アルプス) 26  
 18436 リクニス カルケドニカ(*Silene (Lychnis) chalcidonica*)(60-90、赤(ピンク、オレンジ、白もあり)、別名アメリカセンノウ、耐暑性弱い、中央アジア原産) 26  
 18444 スイセンノウ(フランネルソウ)(*Silene (Lychnis) coronaria*)(60、淡紅、南ヨーロッパ原産) 3,25  
 18454 アケボノセンノウ(*Silene (Lychnis) dioica*)(マット状、ヨーロッパ原産) 83  
 18459 ヒメカッコウセンノウ(流通名)→リクニス フロスクリ ナナ(*Silene (Lychnis) flos-cuculi nana*)(10、ピンク、ヨーロッパ、シベリア) 26  
 18462 リクニス フロス-ジョビス(*Silene (Lychnis) flos-jovis*)(20-60、ピンク、ヨーロッパ中央アルプス)80  
 18468 センジュガンピ(*Silene (Lychnis) gracillima*)(30-100、白、東北~中部地方以北) 84  
 18472 フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州) 13  
 18472-W (W)フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州)[長野県] 81

- 18472-W1(W)フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州)[山梨県] 77
- 18472 フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州) 78,91,95
- 18475 センノウ(*Silene (Lychnis) senno*)(30、赤) 4
- 18478 マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(*Silene (Lychnis) sieboldii*)(30-40、紅、一般に流通するのは葉や茎に赤が混じらないツクシマツモト) 3,9,84,95
- 18478-5 マツモトセンノウ(ツクシマツモト、桃花)(*Silene (Lychnis) sieboldii*) 84
- 18484 エンビセンノウ(*Silene (Lychnis) wilfordii*)(40、赤、北海道の一部、埼玉長野、絶滅危惧Ⅱ類) 26,29,84
- 18485 カラフトエンビセンノウ(*Silene (Lychnis) wilfordii* 'Karafuto-enbisennou')(20、朱、樺太原産) 82
- 18520 アオモリマンテマ(*Silene aomorenensis*)(5-20、白、青森県と秋田県の固有種、絶滅危惧Ⅱ類) 87
- 18522 ヒメケフシグロ(*Silene aprica*)(20-60、ピンク、2年草、中国九州北部) 84
- 18525 ムシトリナデシコ(*Silene armeria*)(40-70、桃、南ヨーロッパ原産、北海道から九州) 3
- 18595 オオビランジ(*Silene keiskei*)(10-15、赤紫、関東) 74,87
- 18628 サクラマンテマ(*Silene pendula*)(60以下、桃、帰化植物、地中海沿岸) 8,82
- 18631s サクラマンテマ(白)(*Silene pendula* white fl.)(60以下、白、帰化植物、地中海沿岸)[春の交換会より] 6
- 18642 カラフトマンテマ(*Silene repens*)(10-20、白、絶滅危惧ⅠB類) 26
- 18670 タカネマンテマ(*Silene uralensis*)(10-20、白、南アルプス高山帯、絶滅危惧ⅠA類) 26
- 【ニシキギ科】-----
- 18772 ニシキギ(*Euonymus alatus*)(200-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州) 3
- 18776 コマユミ(*Euonymus alatus* f. *stiatius*)(100-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州) 3,33
- 18790 アメリカマユミ(別名イガグリマユミ)(*Euonymus hamiltonianus*)(100-300、落葉低木、耐寒性あり、北アメリカ) 20
- 18806 ツリバナ(*Euonymus oxyphyllus*)(100-400、淡緑、赤実、落葉低木、北海道から九州、山地) 3,28,38
- 18818 フウリンツリバナマユミ(*Euonymus* sp)(プロペラの様な実がなる) 37
- 18839 ウメバチソウ(*Parnassia palustris*)(10-50、白、山地の湿地、北海道から九州) 26
- 18839-W (W)ウメバチソウ(*Parnassia palustris*)(10-50、白、山地の湿地、北海道から九州)[山口県] 11
- 18841 コウズウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *multisetata*)(10-50、白、神津島地域種) 26
- 18841-1 赤花コウズウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *multisetata*)(10-50、ピンク、神津島地域種) 26
- 18836 エゾウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *palustris*)(日当たりがよく、やや湿った草地や雪解け水が流れる小川の縁などに生育する) 26
- 18843 コウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *tenuis*)(5-20、白、ウメバチソウの高山変種)[秋田県由来] 26
- 【ヌマハコベ科】-----
- 18933 レウイシア ネバデンシス(*Lewisia nevadensis*)(5-10、白、夏は上の葉が枯れ休眠、アメリカ西部) 26
- 【ノウゼンカズラ科】-----
- 19022 インカルビレア デラバイ(*Incarvillea delavayi*)(30-50、濃いピンク、雲南省、亜高山の岩場や草原) 26
- 【ハエドクソウ科】-----
- 19203 ミゾホオズキ(*Mimulus nepalensis*)(10-30、黄、北海道から九州、水辺) 14
- 【ハス科】-----
- 19235-3 矮性ハス(チャワンハス)「碧翠蓮」(*Nelumbo nucifera*)(薄いピンク) 28
- 【ハナイカダ科】-----
- 19241 ハナイカダ(*Helwingia japonica*)(100-200、白、黒実、雌雄異株、北海道南部から九州) 9
- 【ハナシノブ科】-----
- 19311 オイランソウ(流通名?)(*Phlox paniculata*)(15-20、赤、アメリカ原産) 47
- 19337 エゾハナシノブ(*Polemonium caeruleum* ssp. *yezoense*)(30-80、青、北海道から本州北部(日本海側)、絶滅危惧Ⅱ類) 84
- 19354 ハナシノブ(*Polemonium kiushianum*)(30-50、濃い紫、特定国内希少種、絶滅危惧ⅠA類) 31,38,39,74,95
- 19366 ポレモニウム レプトランス(*Polemonium reptans*)(30、淡青)[遅咲き] 26
- 【ハマウツボ科】-----
- 19420 ナンバンギセル(*Aeginetia indica*)(20、赤紫、北海道から沖縄、イネ科の他ミョウガなどにも寄生) 2,3,48
- 19420-2 ナンバンギセル(口紅咲き)(*Aeginetia indica*)(20、白) 10
- 19420-4 ナンバンギセル(赤花白軸)(*Aeginetia indica*) 19



- 19420-5 ナンバンギセル(赤花赤軸)(*Aeginetia indica*)[軸の色は変化することがある] 19  
 19560 コシオガマ(*Phtheirospermum japonicum*)(30、桃、低地性、半寄生(特定の植物はない)、北海道から九州) 14

-----【バラ科】-----

- 19612 キンミズヒキ(黄金葉)(*Agrimonia pilosa*) 14  
 19613 キンミズヒキ(*Agrimonia pilosa* var. *japonica*)(30-50(地植)、15(鉢)、黄、北海道から九州) 47  
 19613-2 キンミズヒキ(斑入り)(*Agrimonia pilosa* var. *japonica*) 14  
 19613-E キンミズヒキ(*Agrimonia pilosa* var. *japonica*)(30-50(地植)、15(鉢)、黄、北海道から九州)[屋久島由来] 80
- 19653 チョウジュバイ(長寿梅)(*Chaenomeles speciosa* 'Chojubai')(20、赤、ボケの矮性種四季咲き) 38  
 19681 サンザシ(*Crataegus cuneata*)(200、落葉低木、白花、赤実、中国中部)[果皮剥ぎ保湿種子] 95  
 19740 コシジシモツケソウ(*Filipendula auriculata*)(30-100、ピンク、日本海側(富山長野新潟山形他) 33  
 19770 オオダイコンソウ(*Geum aleppicum*)(30、黄、中部以北北海道、山地) 3  
 19782-1 ダイコンソウ(斑入り)(*Geum japonicum*)(30-50、濃黄、花径3) 80  
 19789 アルプスダイコンソウ(イワダイコンソウ)(*Geum montanum*)(10-30、黄、アルプス) 26  
 19820 ホソバミツバシモツケ(*Gillenia stipulata*)(60-100、白、ミツバシモツケより葉が細い、北アメリカ原産) 26
- 19902 カマツカ(*Photinia* (*Pourthiaea*) *villosa* var. *leavis*)(500-700、白、赤実、本州から九州)[果皮剥ぎ保湿種子] 95  
 19940 ツチグリ(*Potentilla discolor*)(5-10、黄、西日本の山地、絶滅危惧Ⅱ類) 13  
 19940s ツチグリ(*Potentilla discolor*)(5-10、黄、西日本の山地、絶滅危惧Ⅱ類)[春の交換会から] 3  
 19956 ポテンティラ グラキリス スタリー(*Potentilla gracilis nuttallii*)(30-60、淡黄) 38,71  
 19970 ユウバリキンバイ(*Potentilla matsumurae* var. *yuparensis*)(10-30、黄、絶滅危惧IB類、交換会に提供される種は別種の可能性) 12,38  
 19971 チシマキンバイ(*Potentilla megalantha*) (10-20、黄、株全体に毛が多い、北海道) 26  
 19971-1 チシマキンバイ(斑入)(*Potentilla megalantha*)(10-20、黄) 87  
 20125 シロヤマブキ(*Rhodotypos scandens*)(100、一重白、小作りには多剪定、) 48  
 20132 ロサ バルカリカ(*Rosa balcarica*)(ピンク、中央コーカサス) 26  
 20134 カカヤンバラ(ヤエヤマノイバラ)(*Rosa bracteata*)(100、白、沖縄(先島諸島) 海岸の草原、荒地) 26  
 20137 カラフトイバラ(*Rosa davurica*)(150-200、ピンク、北海道長野群馬) 36  
 20143 サンショウバラ(*Rosa hirtula*)(100-500、ピンク、富士箱根地方、絶滅危惧Ⅱ類)[保湿種子] 95  
 20149-W (W)ノイバラ(*Rosa multiflora*)(-200、落葉つる低木、白、刺あり、沖縄を除く日本各地)[長野県] 9  
 20152 タカネバラ(*Rosa nipponensis*)(100-200、赤、日本固有種、中部山岳部から四国剣山など) 36  
 20157 ハマナス(*Rosa rugosa*)(100-150、ピンク、北海道、南は茨城、島根) 42  
 20265 ワレモコウ(*Sanguisorba officinalis*)(30-100、赤、紫、北海道から九州) 9,47  
 20265-W (W)ワレモコウ(*Sanguisorba officinalis*)(30-100、赤、紫、北海道から九州)[愛知県] 3

-----【ヒガンバナ科】-----

- 20450 ステゴビル(*Allium* (*Caloscordum*) *inutile*)(20、白、絶滅危惧Ⅱ類) 73  
 20450-1 ステゴビル(薄いピンク花)(*Allium* (*Caloscordum*) *inutile*)(20、薄ピンク、絶滅危惧Ⅱ類) 41  
 20591 スズフリラッキョウ(*Allium* sp)(10-20、ピンク、イトラッキョウに似るが正確な情報なし) 42  
 20599 アリウム タングチクム(*Allium tanguticum*)(20、青紫、中国南西部) 84  
 20600 ヤマラッキョウ(*Allium thunbergii*)(30-50、赤紫、福島から沖縄) 42,76  
 20603 カンカケイニラ(アリウム トガシー)(*Allium togashii*)(白、淡紫、小豆島特産種、絶滅危惧ⅠB類) 24,87  
 20613 イトラッキョウ(*Allium virgunculae*)(10-20、ピンク、平戸島のみ産す) 3  
 20640 キルタンツス ブラキスキフス(*Cyrtanthus brachyscyphus*)(30、輝赤) 1  
 20642 キルタンツス マッケニイ(*Cyrtanthus mackenii*)(30、白) 1  
 20670 ハブランツス アンダーソニー(*Habranthus andersonii*)(15-25、橙) 47,73,79  
 20711 アマリリス「ルドウィヒス スカーレット」(*Hippeastrum* x 'Ludwing's Scarlet')(80、赤花、交配種) 3  
 20741 レウコユム アウツムナレ(*Leucojum autumnale*)(20、白、アキザキスノーフレークとも呼ばれる) 79  
 20759 キツネノカミソリ(*Lycoris sanguinea*)(30-50、橙、北海道から九州) 79  
 20760 オオキツネノカミソリ(*Lycoris sanguinea* var. *kiushiana*)(30-50、オレンジ、関東から九州) 41  
 20761 ムジナノカミソリ(*Lycoris sanguinea* var. *koreana*)(30-50、オレンジ、対馬九州、絶滅危惧ⅠA類) 41  
 20763 ショウキズイセン(*Lycoris traubii*) (60、黄、四国沖縄台湾、暖地の山地) 34  
 20776s ナルキスス ブルボコディウム(*Narcissus bulbocodium*)(10-20、黄、地中海沿岸原産)[春の交換会より] 71

- 20797s ナルキスス カンタブリクス(*Narcissus cantabricus*)(白、細い葉、冬咲き、スペイン西部から北アフリカ)[春の交換会より] 70
- 20828s ナルキスス ロミエウキシー(*Narcissus romieuxii*)(15-25、黄、やや上向きに咲く)[春の交換会より] 71
- 20841 ナルキスス セロチヌス(*Narcissus serotinus*)(白、秋咲き) 95
- 20848-B ナルキスス ワティエリイ(小球)(*Narcissus watieri*)(白、半耐寒性) 72
- 20903 サフランモドキ(*Zephyranthes carinata* Herb)(30、淡いピンク) 3,10
- 20904 ゼフィランテス キトリナ(*Zephyranthes citrina*)(50、黄、半耐寒性) 3
- 20915 ゼフィランテス リンドレヤナ(*Zephyranthes lindleyana*)(20、オレンジ?(淡桃)) 38
- 20930 ゼフィランテス テキサナ(*Zephyranthes texana*)(20、黄からオレンジ、一日花) 72
- 【ヒシ科】-----
- 20940 ヒメビシ(*Trapa incisa*)(浮葉植物、白ないし淡い紅、一年草、湖沼やため池、北海道から九州、絶滅危惧Ⅱ類)[保湿種子] 3
- 【ヒノキ科】-----
- 20960 コウヨウザン(*Cunninghamia lanceolata*)(樹高30m以上、常緑針葉樹、非常に成長が早い、中国南部) 41
- 20985 メタセコイア(*Metasequoia glyptostroboides*)(落葉高木、雌雄同株、中国で発見された当時生きた化石と言われた) 27
- 【ヒメハギ科】-----
- 21026-W (W)ヒメハギ(*Polygala japonica*)(10-30、紫、北海道から沖縄)[山形県] 41
- 【ヒユ科】-----
- 21110 ホウキギ(*Bassia scoparia*)(コキア、一年草) 11
- 【ヒルガオ科】-----
- 21199 ヨルガオ(*Ipomoea (Quamoclit) alba*)(白、熱帯北アメリカ原産) 24
- 21200 マルバルコウ(マルバルコウソウ、ツタノハルコウ)(*Ipomoea (Quamoclit) coccinea*)(ツル、濃橙、一年草、中央アメリカ原産、帰化植物) 11,77
- 21207 アサガオ(茎なし)(*Ipomoea (Quamoclit) nil very short type*)(15、濃ピンク白縁) 3
- 21208 ルコウソウ(*Ipomoea (Quamoclit) pennata*)(40-50、赤、耐寒性なし(1年草扱い)、熱帯アメリカ) 24
- 21208-1 ルコウソウ(赤白混合)(*Ipomoea (Quamoclit) pennata*)(40-50、赤白、耐寒性なし(1年草扱い)、熱帯アメリカ) 40
- 21214 ホシアサガオ(*Ipomoea (Quamoclit) triloba*)(熱帯アメリカ原産、1年草、帰化植物) 34
- 【フウロソウ科】-----
- 21314 チシマフウロ(*Geranium erianthum*)(薄い青紫、本州北部から北海道) 84
- 21316-W (W)トカチフウロ(*Geranium erianthum* f. *pallescens*)(20-50、淡青紫、チシマフウロの変種)[北海道] 84
- 21345 ゲンノショウコ(赤)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*)(30-50、赤、北海道から沖縄) 3
- 21345-1 ゲンノショウコ(白)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*)(30-50、白、北海道から沖縄) 3,27
- 21345-2 ゲンノショウコ(絞り咲き)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*)(30-50、赤白、北海道から沖縄) 5
- 21345-3W (W)ゲンノショウコ(混合)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*)(30-50、赤白、北海道から沖縄)[長野県] 9
- 21382 ヒメフウロ(*Geranium robertianum*)(赤紫、一年草もしくは越年草) 73
- 21386 アケボノフウロ(ゲラニウム サンギネウム)(*Geranium sanguineum*)(20-50、桃、ヨーロッパ、トルコ、コーカサス原産) 71
- 21410 アサマフウロ(*Geranium soboliferum*)(30-50、赤紫濃い、茎直立する) 4,9
- 【ブドウ科】-----
- 21802-1 アメリカヅタ(バージニアヅタ)(斑入り)(*Parthenocissus quinquefolia* 'Variegatus')(落葉低木、ツル、アメリカ~メキシコ原産) 28
- 【ベンケイソウ科】-----
- 21947 ミセバヤ(*Hylotelephium sieboldii*)(40、淡紅、絶滅危惧ⅠB類) 3
- 21948 エッチュウミセバヤ(*Hylotelephium sieboldii* var. *ettyuense*)(10-20、紅、富山県特産)[少量] 95
- 21952 ツガルミセバヤ(*Hylotelephium tsugaruense*)(5-10、白、白神山地、絶滅危惧Ⅱ類) 92
- 21955-W (W)アオベンケイ(*Hylotelephium viride*)(20-50、淡黄緑、岩上樹上に生育、日本固有種、中部以西九州)[大分県] 20
- 21990 ツメレンゲ(*Orostachys erubescens*)(白、開花した株は枯死するが子株が出来る、関東以西四国九州) 78

- 22017 イワベンケイ(ロディオラ ロセア)(*Rhodiola rosea*)(30、黄、中部以北から北海道、日当たりの良い岩礫地や小石混じりの草地) 42
- 22029 テカリダケキリンソウ(*Sedum aizoon* var. *floribundum* f. *tekaridake*)(10、黄、テカリソウの地域変異種とされる) 95
- 22108 セダム ‘バートラムアンダーソン’ (*Sedum 'Bertram Anderson'*)(15、赤紫、低温期葉は黒紫色に、ミセバヤの改良種)[少量] 95
- 【**ホウライシダ科**】-----
- 22150 ヒメウラジロ(*Cheilanthes argentea*)(胞子、ワラビ科で記載されることもある) 5
- 【**ホシクサ科**】-----
- 22189 シラタマホシクサ(*Eriocaulon nudicuspe*)(15-40、白、1年草、静岡愛知三重、絶滅危惧Ⅱ類)[交換会で精製済み] 7,18,48
- 22193 クロホシクサ(*Eriocaulon parvum*)(10-20、黒藍、一年草、本州から九州、絶滅危惧Ⅱ類)[交換会で精製済み] 3,48
- 【**ボタン科**】-----
- 22233 ヤマシャクヤク(*Paeonia japonica*)(30-50、白、関東から九州) 4,14,26,28,84
- 22233-1 ヤマシャクヤク(赤花)(*Paeonia japonica*) 28
- 22233-4 ヤマシャクヤク(多重弁)(*Paeonia japonica*)(30-50、白、関東から九州)[肥培すると多弁になる]87
- 22233-8 ヤマシャクヤク(緋宝、赤花)(*Paeonia japonica*)(ワインレッド) 21
- 22233-E ヤマシャクヤク(*Paeonia japonica*)(30-50、白、関東から九州)[9月採種、交換会で保湿] 3
- 22248 ベニバナヤマシャクヤク(*Paeonia obovata*)(40-50、赤 果皮を取って播種、2年目に発芽、北海道から九州、絶滅危惧Ⅱ類) 4,11,20,38,71,78,84,86
- 22260-1 ボタン(園芸種のセルフ1)(*Paeonia suffruticosa*)[親株の花色:牡丹色] 44
- 【**マツブサ科**】-----
- 22420 サネカズラ (ビナンカズラ)(*Kadsura japonica*)(ツル、木本、常緑、赤実、関東以西) 11
- 【**マメ科**】-----
- 22505 ホドイモ(*Apios fortunei*)(ツル、白緑、日当たりの良い林縁、北海道から九州、地下の塊茎は食用になる) 41
- 22543 シュミットソウ(*Astragalus sachalinensis*)(ピンク、樺太) 95
- 22549 ゲンゲ白花(通称:レンゲ、レンゲソウ白花)(*Astragalus sinicus* white fl.)(25、白、播種は秋の彼岸ごろ(関東標準))[白花の交雑種] 14
- 22640 ハナズオウ(ハナスオウ)(*Cercis chinensis*)(300、紅、中国原産) 3
- 22695 クリトリア(チョウマメ)(*Clitoria ternatea*)(ツル、青紫、熱帯性) 2,3,11
- 22722 タヌキマメ(*Crotalaria sessiliflora*)(40、青、一年草、本州から沖縄) 5,20,25,27,32,45
- 22770 フジカンゾウ(*Desmodium oldhamii*)(50-150、赤、本州から九州) 11,41
- 22943 コマツナギ(*Indigofera pseudotinctoria*)(80-150、落葉小低木、赤) 5
- 22944 コマツナギ(白)(*Indigofera pseudotinctoria* white fl.)(80-150、落葉小低木、白) 5
- 22965 キングサリ(*Laburnum anagyroides*)(500-700、黄、別名キンレイカ、ヨーロッパ南部原産) 14
- 22984 ハマエンドウ(*Lathyrus japonicus* ssp. *japnicus*)(ツル、濃い紫、海浜植物、北海道から九州) 71
- 23062 マキエハギ(*Lespedeza virgata*)(40-60、白、本州から沖縄) 73
- 23080 ミヤコグサ(*Lotus corniculatus* var. *japonicus*)(10、黄、北海道から南西諸島、元来は帰化植物) 71
- 23206 レブンソウ(濃赤紫)(*Oxytropis megalantha* 'Red-Violet flower')(10-20、濃赤紫、絶滅危惧ⅠB類) 22
- 23213 コダマソウ(*Oxytropis retusa*)(10-20、赤紫、ヒダカミヤマエンドウとは別種、千島色丹島) 70
- 23320 トキリマメ(*Rhynchosia acuminatifolia*)(ツル、黄、関西以西から九州、タンキリマメに比べて葉の下半分の幅が広い) 5
- 23322 タンキリマメ(*Rhynchosia volubilis*)(ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下半分の巾が狭い) 3,5
- 23322-W (W)タンキリマメ(*Rhynchosia volubilis*)(ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下半分の巾が狭い)[愛知県] 3
- 23500 ナンテンハギ(*Vicia unijuga*) (30-50、赤紫) 73
- 【**マンサク科**】-----
- 23545 トサミズキ(*Corylopsis spicata*)(落葉低木、薄黄) 3

-----【ミカン科】-----

- 23590-1 マツカゼソウ(斑入り)(*Boeninghausenia japonica*)(40、白、宮城以南から九州) 14  
23590-W (W)マツカゼソウ(*Boeninghausenia japonica*)(40、白、宮城以南から九州)[愛知県] 3

-----【ミクリ科】-----

- 23701 ナガエミクリ(*Sparganium japonicum*)(30-100、抽水～浮葉植物、準絶滅危惧種) 41

-----【ミズアオイ科】-----

- 23710 ミズアオイ(*Monochoria korsakowii*)(青、一年草、水田・沼地、常時水要)[保湿種子] 84

-----【ミズキ科】-----

- 23730 ヤマボウシ(*Benthamidia japonica*)(500-1000、落葉小高木、薄黄、本州から九州)[保湿種子] 3

- 23753-W (W)クマノミズキ(*Cornus (Benthamidia) macrophylla*)(落葉高木、白、本州から九州、丘陵地)[山口県] 11

- 23755 サンシュユ(*Cornus (Benthamidia) officinalis*)(落葉小高木、黄、日本原産ではない中国朝鮮から江戸期に入る) 3

-----【ミツガシワ科】-----

- 23859 ガガブタ(*Nymphoides indica*)(白、水生植物、本州以西) 41

-----【ミツバウツギ科】-----

- 23867 ミズネコノオ(*Eustellaris stellata*)(10-50、白淡紫、一年草、湿生植物) 84

- 23875 ミツバウツギ(*Staphylea bumalda*)(300-400、白、若葉は山菜になる) 41

-----【ムクロジ科】-----

- 24080 フウセンカズラ(*Cardiospermum halicacabum*)(ツル、白、一年草) 3,47

-----【ムラサキ科】-----

- 24271 ムラサキ(*Lithospermum erythrorhizon*)(40-70、白、北海道から九州、交雑種に注意、日本ムラサキは、花が白、大きさが1cmと大きい、根は全て赤い。絶滅危惧 I B類) 3

- 24271-W (W)ムラサキ(*Lithospermum erythrorhizon*)(40-70、白、北海道から九州、紫色の染料を取る。絶滅危惧 I B類)[山梨家] 77

-----【メギ科】-----

- 24425 ヒロハノヘビノボラズ(*Berberis amurensis* var. *japonica*)(100-300、黄、赤実北海道から九州)16

- 24491 タツタソウ(*Jeffersonia dubia*)(20-25、淡い紫、早春に咲く、朝鮮半島原産)[乾燥種子] 87

- 24500-1 ナンテン(白、黄実)(*Nandina domestica*)(200-500、白、白、黄実、中国原産) 40

- 24513-3 ハッカクレン(ミヤオソウ)(斑入り)(*Podophyllum pleianthum*)[保湿種子、斑入り発現率30-40%] 12

- 24520 トガクシシヨウマ(*Ranzania japonica*)(30-60、赤紫、白実、本州中部、北部、多雪地帯)[保湿種子] 95

-----【モウセンゴケ科】-----

- 24563-W (W)モウセンゴケ(*Drosera rotundifolia*)(2、白、高山寒地、北海道から九州)[群馬県] 85

- 24566 トウカイコモウセンゴケ(*Drosera tokaiensis*)(5以下、赤(花柄は10-20)、冬季も赤い葉、東海地方から近畿地方) 7

- 24566-W (W)トウカイコモウセンゴケ(*Drosera tokaiensis*)(5以下、赤(花柄は10-20)、冬季も赤い葉、東海地方から近畿地方)[愛知県] 3

-----【モクレン科】-----

- 24697 ベニコブシ(*Magnolia stellata* var. *keisukei*)(落葉小高木、紅、シデコブシの変種) 41

-----【ヤマゴボウ科】-----

- 25000 ジュズサンゴ(*Rivina humilis*)(30、紅、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリカ) 19

- 25000-1 ジュズサンゴ(モモタマ)(*Rivina humilis*)(30、ピンク実、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリカ) 19

- 25000-2 ジュズサンゴ(斑入り)(*Rivina humilis*)(30、紅、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリカ) 11

-----【ヤマノイモ科】-----

- 25026-B2 ヤマノイモ(斑入葉)(ムカゴ)(*Dioscorea japonica*)(ツル) 19

- 25026-W (W)ヤマノイモ(*Dioscorea japonica*)(ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州)[愛知県] 3

-----【ユキノシタ科】-----

- 25138 チダケサシ(*Astilbe microphylla*)(100花茎、白、本州から九州) 3  
 25145 ヒトツバシヨウマ(*Astilbe simplicifolia*)(10-30、白、神奈川静岡) 33  
 25147 タンナチダケサシ(*Astilbe taquetii*)(20-30、白、朝鮮半島原産) 20  
 25301 ワタナベソウ(*Peltoboykinia watanabei*)(30、黄緑、四国九州の深山、絶滅危惧Ⅱ類) 38,95  
 25379 ダイモンジソウ(*Saxifraga fordunei* var. *incislobata*)(10、白、関東以西九州まで) 3,37,95  
 25379-W (W)ダイモンジソウ(*Saxifraga fordunei* var. *incislobata*)(10、白、関東以西九州まで)[愛知県] 3  
 25542 ズダヤクシュ(*Tiarella polyphylla*)(10-20、白、山地や亜高山の林床/林縁) 2  
 25542s ズダヤクシュ(*Tiarella polyphylla*)(10-20、白、山地や亜高山の林床/林縁)[春の交換会から] 3,6

-----【ユリ科】-----

- 25841-1 ウバユリ(紅花選抜種)(*Cardiocrinum cordatum*) 19,87,92  
 25841-W (W)ウバユリ(*Cardiocrinum cordatum*)(100-150、淡青白、地植え向き。一回結実型多年草、日本固有種、宮城より九州)[長野県] 95  
 25841-W1 (W)ウバユリ(*Cardiocrinum cordatum*)(100-150、淡青白、地植え向き。一回結実型多年草、日本固有種、宮城より九州)[愛知県] 3  
 25842-W (W)オオウバユリ(*Cardiocrinum cordatum* var. *glehnii*)(150-200、白、北海道から中部)[北海道] 26  
 25920s フリチラリア アクモペタラ(*Fritillaria acmopetala*)(30-70、花外部/灰色、内部/黄)[春の交換会より] 75  
 25979 ミノコバイモ(*Fritillaria japonica*)(10-20、淡茶、花は広い釣鐘型、美濃～近畿岡山、絶滅危惧Ⅱ類)[保湿種子、交換会まで冷蔵保管] 41  
 25996s フリチラリア メレアグリス ウニコロル アルバ(*Fritillaria meleagris unicolor alba*)[春の交換会より] 75  
 26215 ヤマユリ(*Lilium auratum*)(100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿) 78,84  
 26215-W (W)ヤマユリ(*Lilium auratum*)(100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿)[埼玉県] 73  
 26218 ヤマユリ(紅筋)(*Lilium auratum* var. *rubrovittatum*)(100、) 91  
 26223 ノヒメユリ(スゲユリ)(*Lilium callosum*)(40、黄赤、絶滅危惧ⅠB類) 34  
 26229 リリウム ケルヌウム(マツバユリ)(*Lilium cernuum*)(50、ピンク) 95  
 26229-B リリウム ケルヌウム(マツバユリ)木子(*Lilium cernuum*)(50、ピンク)[少量] 95  
 26235 ヒメユリ(*Lilium concolor* var. *partheneion*)(40、緋色～橙赤、東北南部から沖縄、絶滅危惧ⅠB類) 4  
 26235-E ヒメユリ(阿蘇山系)(*Lilium concolor* var. *partheneion*)(40、) 91  
 26235-E1 ヒメユリ(トサヒメユリ、木子)(*Lilium concolor* var. *partheneion*)[少量] 95  
 26237 キバナヒメユリ(キヒメユリ)(*Lilium concolor* var. *partheneion* f. *coridion*)(60-100、黄～橙黄、) 4,91,92  
 26255 ササユリ(*Lilium japonicum*)(50-80、白～ピンク、日本固有種、中部から九州) 78,84  
 26256-B ササユリ(球根)(*Lilium japonicum*)(50-80、白～ピンク、日本固有種、中部から九州)[2019年播種、小球] 86  
 26257 ジンリョウユリ(*Lilium japonicum* var. *abeanum*)(薄いピンク、絶滅危惧ⅠB類) 86  
 26260-3B オニユリ(葉が笹葉)(ムカゴ)(*Lilium lancifolium*) 95  
 26260-4B オニユリ(八重咲き)(ムカゴ)(小球)(*Lilium lancifolium*) 95  
 26272-1 キイワトユリ(*Lilium maculatum*)(20-60、黄、イワトユリの色変種) 92  
 26274 ミヤマスカシユリ(*Lilium maculatum* var. *bukosanense*)(20-60、オレンジ、岩手茨城埼玉、絶滅危惧ⅠB類) 72  
 26297 リリウム フィリップネンセ(*Lilium philipinense*)(40-80、白、芳香、フィリピン台湾) 73  
 26307 ヒメサユリ(*Lilium rubellum*)(30-80、ピンク、山形福島新潟) 38  
 26307-W (W)ヒメサユリ(*Lilium rubellum*)(30-80、ピンク、山形福島新潟)[新潟県] 77  
 26310 カノコユリ(*Lilium speciosum*)(100-150、白からピンク、四国九州、絶滅危惧Ⅱ類) 43,95  
 26310-1 カノコユリ(交配種白花♂×並花♀)(*Lilium speciosum*) 91  
 26310-2 カノコユリ(白花)(*Lilium speciosum*) 92  
 26430 ノモカリス アペルタ(*Nomocharis aperta*)(40-60、ピンクに濃紅斑) 21  
 26520 オオバタケシマラン(*Streptopus amplexifolius* var. *papillatus*)(50-100、白緑、中部以北から北海道)[保湿種子、殆ど発芽] 26  
 26553 キバナノホトギス(*Tricyrtis flava*)(10、黄、花梗は長い、宮崎のみ、絶滅危惧Ⅱ類) 4,84,90  
 26556 ホトギス(*Tricyrtis hirta*)(30-50、白地に赤紫斑点、日本固有種、北海道から九州) 3,37  
 26556-1 ホトギス(色混合)(*Tricyrtis hirta*) 78  
 26558 ホトギス「松風」(*Tricyrtis hirta* 'Matsukaze')(白地に小豆色の斑点) 42  
 26560 ホトギス「紫酔」(*Tricyrtis hirta* 'Shisui')(白地に紫、サツマホトギスの色変わり?) 19  
 26561 シロホトギス(*Tricyrtis hirta* var. *albescens*)(20-50、白)園芸種 4,19,82  
 26562 シロホトギス「白楽天」(*Tricyrtis hirta* var. *albescens* 'Hakurakuten')(白)園芸種 73

- 26572 キイジョウロウホトギス(*Tricyrtis macranthopsis*)(40-80、黄、葉は茎を抱き込んでいる、絶滅危惧Ⅱ類) 95
- 26576 チャボホトギス(*Tricyrtis nana*)(10、黄、東海から屋久島) 4,34
- 【ラン科】-----
- 26764 シラン(*Bletilla striata*)(30-40、紫、最も丈夫な野生ランの一つ) 3
- 26764-1 シラン(紫式部)(*Bletilla striata*) 93
- 26766 シラン(ピンク)(*Bletilla striata* pink fl.)(40、) 93
- 26767 シラン(ブルー)(*Bletilla striata* var. *coerulea*) 93
- 26837 キエビネ(*Calanthe striata*)(絶滅危惧ⅠB類) 47
- 26974 キンリョウヘン(*Cymbidium floribundum*)(20-30、黄緑、ニホンミツバチを引き寄せる、中国原産) 2
- 27040 ハクサンチドリ(*Dactylorhiza aristata*)(10-40、赤紫、中部以北北海道高山帯) 26
- 27149-3 ヤクシマカキラン(小型種)(*Epipactis thunbergii*)(20-30、黄、屋久島) 34
- 27151 イソマカキラン(*Epipactis thunbergii* f. *subconformis*)(30、茶、カキランの六弁花、湿地の野生ラン) 34,75
- 27236-W (W)ミヤマウズラ(*Goodyera schlechtendaliana*)(10-30花茎、薄いピンク、冷温帯から亜熱帯の林下)[山形県] 41
- 27245 ノビネチドリ(*Gymnadenia camtschatica*)30-60、淡紅紫、中部以北北海道) 28
- 27247-W (W)ミヤマモジズリ(*Gymnadenia cucullata*)(10-20、薄いピンク、中部地方以北、四国、樹林帯)[長野県] 84
- 27353-W (W)コ克蘭(*Liparis nervosa*)(15、黒紫、茨城以南四国九州)[愛知県] 3
- 27440 フウラン(*Neofinetia falcata*)(10、白、本州中部以南、琉球、絶滅危惧Ⅱ類) 3
- 27678-B プレイオネ交配種「国師」(*P. limprichtii* x *P. spacious*)[小球] 21
- 27658-1B タイリントキソウ交配種「女峰」斑入り(*Pleione bulbocodioides* 'Nyoho')[小球] 21
- 27659-B プレイオネ ブルボコディオイデス「パピロン」(*Pleione bulbocodioides* 'Papillon')(赤)[小球] 21
- 27660-B プレイオネ ブルボコディオイデス「ユンナン」(*Pleione formosana* 'Yunnan')(交配種)[小球] 21
- 27661-B プレイオネ ブルボコディオイデス(小球)(*Pleione bulbocodioides*)(松林の林床や、日当たりのよい小石混じりの草原に咲く)[小球] 21
- 27662-B プレイオネ キャプテン フック(*Pleione* 'Captein Hook')(白、濃ピンク)[小球] 21
- 27663-B プレイオネ アイガー「スノーフレーク」(*Pleione* 'Eiger Snowflake')(白花弁黄、交配種)[小球] 21
- 27664-B タイリントキソウ(*Pleione formosana*)(10-15、ピンク白、台湾中国南部)[小球] 21
- 27664-1B プレイオネ フォルモサナ 斑入り(*Pleione formosana*)[小球] 21
- 27665-B プレイオネ フォルモサナ アルバ(*Pleione formosana* *alba*)(白)[小球] 21
- 27666-B プレイオネ フォルモサナ「ケアンゴーム」(*Pleione formosana* 'Cairngorm')(白花弁ピンク、原種系)[小球] 21
- 27667-B プレイオネ フォルモサナ「クレア」(*Pleione formosana* 'Clare')(白)[小球] 21
- 27668-B プレイオネ フォルモサナ セルレア選抜個体(*Pleione formosana* *Coerulea*)(薄い青)[小球] 21
- 27669-B プレイオネ フォルモサナ「オリエンタルグレス」(*Pleione formosana* 'Oriental Grace')(原種系)[小球] 21
- 27671-B プレイオネ フラン ケイ(*Pleione* *Frank kerr*)(交配種)[小球] 21
- 27672-B プレイオネ グレーシア ピーク(*Pleione* *Glacier Peak*)(白花弁やや黄、交配種)[小球] 21
- 27676-B プレイオネ ジョルロー「ハーレクイン」(*Pleione* *Jorullo* 'Harlequin')(交配種)[小球] 21
- 27677-B プレイオネ リムプリヒチー(*Pleione* *limprichtii*)(暑さに弱い、中国、ビルマ北部、→ブルボコディオイデス(*bulbocodioides*)の濃赤型)[小球] 21
- 27681-B プレイオネ プレイオノイデス「神濃架」(*Pleione* *pleionoides* 'Shinnoka')(原種系)[小球] 21
- 27683-B プレイオネ ラカタ「キャメロット」(*Pleione* *Rakata* 'Camelot')(交配種)[小球] 21
- 27687-B プレイオネ ストロンボリア「ロビン」(*Pleione* *Stromboli* 'Robin')(交配種)[小球] 21
- 27688-B プレイオネ ストロンボリア(斑入り)(*Pleione* *Stromboli*)[小球] 21
- 27689-B プレイオネ トリマ「ムーヘン」(*Pleione* *Tolima* 'Moorhen')(交配種)[小球] 21
- 27691-B プレイオネ 交配種「薄雲」(*Pleione* 'Usugumo')(交配種、薄青～白花系)[小球] 21
- 27692-B プレイオネ ボルトイニイ(*Pleione* *Voltolinii*)(ピンク紅)[小球] 21
- 27694-B プレイオネ ラゲナリア(*Pleione* x *lagenaria*)(秋咲き、薄いピンク、リップに濃い赤紫、自然交配種 *P. maculata* x *P. praecox* 熱帯アジア)[小球] 21
- 27695-B プレイオネ タリエンセ(*Pleione* x *taliense*)(*bulbocodioides*と *yunnanensis*の交配種)[小球] 21
- 27760 スピランテス ケルヌア(流通名アキザキネジバナ、アメリカモジズリ、オオバナネジバナ)(*Spiranthes cernua*)(20-30、白。秋に開花の大型のネジバナの仲間。) 44,90
- 27762 ネジバナ(*Spiranthes sinensis* var. *amoena*)(10-40、ピンク、日本全土) 3

-----【リンドウ科】-----

- 27930 コマチリンドウ(ケンタウリウム コンフェルツム)(*Centaurium chloodes*(*confertum*))(5-10、ピンク、ヨーロッパ) 10
- 27969-W (W)トウヤクリンドウ(*Gentiana algida*)(10-30、薄黄、中部以北か北海道、高山帯)[山梨県] 77
- 28037 オヤマリンドウ(*Gentiana makinoi*)(30-60、青紫、東北南部から近畿四国) 26
- 28079 リンドウ(ササリンドウ)(*Gentiana scabra* var. *buergeri*)(20-100、青紫、本州から九州) 91,95
- 28088 アサマリンドウ(*Gentiana sikokiana*)(20、青、紀伊半島南部、中国、四国、九州) 95
- 28088-W (W)アサマリンドウ(*Gentiana sikokiana*)(20、青、紀伊半島南部、中国、四国、九州)[愛媛県] 34
- 28095 コケリンドウ(白花)(*Gentiana squarrosa* white fl.)(3-10、白、2年草) 26
- 28115-W (W)エゾリンドウ(*Gentiana triflora* var. *japonica*)(30-100、青紫、日本原産、北海道から近畿以北、山地の湿地帯)[山形県] 41
- 28180-W (W)ハナイカリ(*Halenia corniculata*)(20-60、緑(萼)、一年草もしくは越年草、北海道から九州)[長野県] 33
- 28211 アケボノソウ(*Swertia bimaculata*)(40-50、白地に点、越年草、北海道から九州) 5,92
- 28211-W (W)アケボノソウ(*Swertia bimaculata*)(40-50、白地に点、越年草、北海道から九州)[長野県] 78
- 28211-W1(W)アケボノソウ(*Swertia bimaculata*)(40-50、白地に点、越年草、北海道から九州)[山口県] 11
- 28227-W (W)ムラサキセンブリ(*Swertia pseudochinensis*)(15、紫、関東以西四国九州)[山口県] 11
- 28241-W (W)ツルリンドウ(*Tripterospermum japonicum*)(ツル、淡い紫、赤実、北海道から九州)[山口県] 11

-----【レンブクソウ科】-----

- 28307 フウリンガマズミ(*Viburnum setigerum*)(200-300、白、赤実、中国原産) 5,27

-----【ロウバイ科】-----

- 28345 クロバナロウバイ(*Calycanthus floridus* var. *glaucus*)(落葉低木、暗紫、北アメリカ東部原産) 14
- 28351 マンゲツロウバイ(ロウバイの園芸種)(*Chimonanthus praecox* 'Mangetsu')(落葉低木、黄、花の中心に紫褐色の輪) 14